

ss

d

33




M Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

14-30-A-9

~~55.4.33~~
~~55.4.33~~
~~55.4.33~~

V. 84.





*Uniuersa nobis Trinitas in suis operibus intimatur.
S. Aug. L. ii. de Ciuit. c. 24.*

tauole appartenenti a questo libro, et al suo
uso stanno dentro il 2. Tomo del Arcano del
di. O Roberto Dubbo. poco per tutti i giorni.

PLANISPHERIUM
VERSATILE,
Præmissâ Sphæræ Mundi,
quam representat,
PARTIUM & CIRCULORUM
Non minùs utili, quàm curiosâ de-
scriptione,
Quoad sui facilitatem ac uni-
versalitatem,

Per plusquàm 200. Problemata Astro-
nomica Solaria, ac Lunaria, Horo-
graphica item, Geographica & Geometrica,
arque etiam Trigonometrica priorum demonstra-
siva, tam Logarithmicè, quàm ex ipso

Planisphærio resolvenda,

DECLARATUM,

ET

Nondiscentium solummodò utilitati,
sed exercitatorum quoque commoditati
CONSECRATUM

P. M. JOANNE BAPTISTA
ININGER Ordinis Eremit.

S. AUGUSTINI.

Cum Privilegio S. C. M. & Facultate
Superiorum.

MONACHII,

Sumptibus JO: JACOBI REMY Bibliopolæ.

Typis Mathiz Riedl, 1718.



in quello posto d'onestano; ms del R. Obis

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION
500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION
500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION
500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1892

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION
500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

D E

PLANISPHERIO.

Proœmium.

PLANISPHERIUM, ut ex
 etymologia Nominis constat,
 nihil aliud est, quàm Sphæra
 in Plano descripta, seu Instrumentum
 planum, totam in se Primi Mobilis doctri-
 nam continens, ac Mundi Centrum, Axin,
 Polos, Circulos, Parallelos, Ascensiones,
 Descensiones, Amplitudinem ortivam &
 occiduam, Azimuth, Almucantarath, Cre-
 puscula, aliâque plurima oculis exhibens.

Minimè me latet, prima nota Viros, ac de
 Mathesi optimè meritos, diversa Astrola-
 bia, Planiglobia, & Planisphæria orbi scien-
 tifico proposuisse, eâque more suo eruditissi-
 mè explanâsse; attamen quia aliqua minùs
 universalis esse, alia verò magis laboriosa,
 & magno nimis Regularum, Cursorum, Ho-
 rizontium ac Suppedaneorum apparatu in-
 digere videntur, ideo præsens nostrum

A a

Pla-



Planispharium, orbe versatili instructum, ac unicâ Regulâ contentum, tanquam universalius, simplicius, ac intellectu facilius, præsentî Opusculo explicandum elegimus.

Ut autem Sphæræ Mundi, quam Planispharium representat, aliqualis saltem notitia habeatur, in Prima opusculi Parte brevem Sphæræ Partium, & Circulorum descriptionem damus, à Sphæra Elementari ad Cælestem progrediendo; aliorum verò opiniones referimus potius, quàm examinamus, & quæ in alijs rara vel curiosa hinc inde dispersim inveniuntur, occasionaliter hîc in compendio inserimus.

Descriptioni Sphæræ Mundi sub finem Primæ Partis etiam Modum construendi ac delineandi Planispharij nostri subnectimus, ad plures alios usus ac divisiones faciendas applicabilem.

In Secunda Parte utilitatem, facilitatem, ac universalitatem Planispharij per 200. Problemata Astronomi.

mica Solaria ac Lunaria, Horographica item, & Geographica, tam theorica, quàm practica, tam Logarithmicè, quàm ex ipso Planisphærio resolvenda commonstramus.

Quòd autem pro una, eadèmq; v. g. Altitudine Solis, Horâ diei, Declinatione, aut Elevatione Poli &c. inveniendâ 8. 10. veletiam plura ponantur Problemata, nec mirum cuipiam videri, nec absque speciali utilitate & commoditate factum censi debet; cùm idem Inventum ex diversis fundamentis & capitibus eruat, ut siquidem similia calculare volens uno vel altero necessario præsciendo destitutus sit, ex alio fonte desiderata haurire possit.

Operationes longiores, siquæ subinde afferantur, abstertere neminem debent, cùm Dij laboribus omnia vendant; imò dummodò quis rem aggredi tentet, & ab uno Log.^{mo} ad alium juxta ductum Regularum præscriptarum progrediatur, nullam insuperabilem difficultatem, sed magnam etiam facilitatem subesse deprehen-

det, quam quisque longè majorem expectetur, sicut, quæ de usu Tabularum Sinuum & Logarithmorum præviè ad Problemata dicemus, non solum attentè legat, sed & relegendo, ac practicando sibi magis familiaria reddat.

In fine Libelli Tabulas etiam diversas pro rei exigentia & utentium commoditate non tantum subministrabimus, sed insuper modum eas conficiendi singulis præponemus, ut qui vis pro quocunq; exemplo sibi proposito, & pro cujusvis Loci Latitudine gradus ac minuta supputare sciat.

Ceterum sicut hic non pro Doctis, sed pro Tyronibus, ac in Mathematicis proficere cupientibus scribere cogitamus, ita fore confidimus, ut his ritè perceptis ad altiora dein viam & animum parent.

Denique indignum Authoris Nomen tenui huic Opusculo non ipse, sed inviolabilis Superiorum voluntas præfixit. Tu verò, Lector amice, humanis defectibus admissis clementer indulge, & hic diutissimè, tunc verò, super Astra vectus, æternum vabe.

PARS

PARS I.

De Sphæra Mundi, ac inibi contentis

CAPUT I.

De Sphæra Mundi Elementari.

Nomine *Sphæra Mundi*, quam *Planisphæ-*
rium explicat, ac repræsentat, intel-
ligitur visibilis hæc totius Mundi Ma-
china, ex Cælesti, ac Elementari compa-
ginata. In *Sphæra Elementari* locum infimum,
seu medium occupat *Terra*, utpote Elemen-
tum omnium gravissimum, ita ut, si per di-
vinam Potentiam extra Mundi centrum po-
neretur, ea suæ denuò permixta libertati, il-
lud, sicut omnia gravia, sponte repeteret.
Circa quam hîc obiter noto sequentia.

Primò. Figuram ipsius, saltem communi
hominum æstimatione, rotundam esse, pro-
ut contra veteres Philosophos, eam Colum-
næ, Cylindro, Tympano, Cono, Disco ca-
vo, vel etiam Menlæ planæ similem con-
tendentes, dudum demonstratum est, tum
ex umbra Eclipsis Lunarîs, per Terræ inter-
positionem causatâ, ac semper rotundâ obser-
vatâ; tum quia accedentibus ad alterutrum
Polorum, Stellæ circum-Polares ordinatè

semper magis elevari, recedentibus verò deprimi visæ sunt; tum quia 15. gradibus v. g. procedentibus versùs ortum Sol ac Sidera unâ horâ citiùs, sicut ad Occasum tendentibus tardiùs oriuntur, ita ut, qui totam circuiret Terram versùs Ortum, jam integrum diem lucraretur, versùs Occasum verò integrum diem perderet. Hinc autem facillè solvitur Problema, quomodò si tres homines eâdem horâ nati essent, fieri posset, ut unus v. g. cum veritate diceret: *heri complevi 30. annos*, alter: *ego hodie*, & tertius: *cras ego complebo*; si enim primus peragrâsset totum Orbem Terræ versùs ortum, jam in ætate sua proficeret integro die, tertius verò, qui idipsum præstitisset versùs occasum, numeraret integro die minùs, ac denique medius intereâ domû commorans, teneret ætatem inter utrumque mediam, ut cogitanti facillè patebit. Utrùm autem ille primus, si ob dictam anticipationem jam numeraret diem Dominicam, posset domû suæ, ubi primùm ageretur dies Sabbati, carnibus vesci, vel cum alijs teneretur ad abstinentiam? Item utrùm is ipse Primus taliter uno die senior factus altero quopiam ex sua familia, qui tamen ipsum nativitate unâ horâ præcederet, v. g. Majoratu gauderet? Theologis ac Jurisperitis decidendum relinquimus. Interim dicerem quoad 1.^{um} talem debere se alijs

alijs accommodare quoad observantiam legis, præsertim universalis, ac tali diei affixæ, nec ipsi patrocinari hanc suam anticipationem penitus extraordinariam, quæ proinde respectu legis communis meritò censetur habere se merè per accidens. Quoad alterum prior nativitate esset potior jure, cum reverà sic natu major; nam ille primus quidem Solem vidit sæpiùs, sed alter citiùs.

Ex hæctenùs dictis autem constat, quòd quandocunque unus locus 15. gradibus est Orientalior altero, is jam unâ horâ diem anticipet, si 30. aut 45. gradibus, etiam anticipatio fiat 2. vel 3. horis; si autem unus locus est Occidentalior altero, tantò seriùs etiam horas diei numerare incipiat. Sic enim quando hîc Monachij est hora 12.^{ma}, in Polonia jam erit hora 1.^{ma}, in Palæstina 2.^{da}, in Arabia felice 3.^{ia}, &c. Econtrà versùs Occasum in Anglia primùm erit hora 11.^{ma}, in Islandia 10.^{ma}, in Grœnlandia verò 9.^{na}, &c. Unde haud difficile erit Horologium universale construere, quod mediante horologio rotatili, vel etiam indice simplici, ad quamvis horam datam versatili, quora ubivis locorum per universum terrarum Orbem hora sit, demonstrer; locus enim indici substans semper habebit Meridiem, locus verò diametraliter oppositus mediam noctem, unde

& reliquæ horæ diei (numerando eas à dextra sinistram versùs) facile erui & computari poterunt, cuius proinde schema hîc apponendum censui.



Quòd si aliquis independentè ab omni indice tantùm scire cupiat, quæ alibi sit hora, dum nos habemus Meridiem, inuerso modo instrui debet Horologium, & Regiones

nes illæ , quæ hic adscriptæ sunt horæ 1.^{ma} ;
attribui horæ XI.^{ma} & vicissim , ordine qui
sequitur.




Secundò. Licet S. P. Aug. l. 20. de Civia
Dei c. 16. de inferno dicat : Quis ignis cuius-
modi , & in qua mundi vel rerum parte futurus
sit , hominem scire arbitror neminem , nisi fortè
cui Spiritus Divinus ostendit. Unanimi tamen
ferè

ferè omnium SS. PP.^{rum} consensu traditur , infernum in infimo terræ loco , seu centro constitutum esse , ut qui se ab ultimo fine per peccatum avertunt , ultimum etiam in sensibili natura locum occupent ; unde haud improbabile est , quod ex natura centri inferit Kircherus in Mund. subterraneo l. 1. c. 3. Parad. 2. in fine, corpora damnatorum post resurrectionem, halecum instar , in unam superficiem sphæricam conglobanda , ac tantò acerbius mulctanda fore, quò centro fuerint propinquiora , tamdiu quidem , quamdiu erit Deus , nimirum in omnem æternitatem. Cæterum si Infernus amplitudine sua adæquaret sphæram , undique ad unum milliare Germanicum extensam , & uni corpori humano concederetur spatium 12. pedum cubicorum , caperet is 348888888333. si ergo singulis diebus 100000. damnarentur , prædictus numerus non exhauriretur , nisi 9312. annis.

Tertiò. Tellus , quemadmodum totus mundus, congenitâ sibi innumerabilium rerum Panspermia , seu materia seminali pollet, quæ caloris obstetricantis virtute innumerabiles rerum fœtus producere possit. Hinc terræ moles non est undique constipata , ac solida per totum , sed à superficie extrinseca, usque

usque ad ipsum Centrum, ingentibus canalibus, & cryptis igne, aquâ, aëre, ventoque refertis instructa, quibus mediantibus naturæ fermen digeritur, digestum per innumeros canales, porosque, vapore, atque exhalatione terrestri vestitum egeritur, ut, ubicunque aptè dispositam materiam invenit, ibi varias rerum formas fixatione, coagulatione, calcinatione, putrefactione, aliisque similibus operationibus inducat, ac Mineralium quoque varietatem in terræ visceribus producat. In exteriori quoque sua superficie, per occultissimos meatus, quibus scater, plures hîc aquæ ductus panspermia quadam referti, virtutum occultarum egestores, illic Vulcanij camini, quasi fuliginum exhalatores, alibi anfractus Æolij ventorum efflatores, ita sapienter sunt ordinati, ut Geocosmos cum Megacosmo perfectam in omnibus analogiam servet. Habet ergò Tellus abdita intra se elementorum receptacula, ac veluti custodias, tam particularibus, quàm universalibus usibus reservatas. Et quidem, quia elemento Ignis proprium est, ab infimo ad suprema tendere, ideo connaturale erat in Centro mundi principalem Ignis sedem statuere, ut ex hoc per pyragogos meatus, ceu ramos in universum Telluris corpus undique diffusos, ac diversa ignis receptacula usque
ad

Interior Telluris Facies.

ad ipsam terræ superficiem continuata, junctis semper hydrophylaciis, ac aërophylaciis, individuò sese contortio juvantibus, ac con-temperantibus, denique per apertos caminos suas efflent fuligines, ut ex adjecto schemate colligere licebit.

Quartò denique, sicut in microcosmo, seu homine mirabilis ossium compactura corpori

pori humano dat firmitatem , & consistentiam , ita in Geocosmo saxeorum montium undequaque concatenatorum structura globo terrestri non ex unius generis gleba , sed diversis Mineralibus , pulveribus , cineribus , & arenis , &c. de se facile solubilibus compacto , contra tantam aquarum alluviam , & commixtionem , perfectam largitur consistentiam , eumque hac suâ quasi ossaturâ firmiter continet , & constringit.

Telluri partim infusa , & partim circumfusa est *Aqua* , maribus , fluminibus , lacubus , ac fontibus distincta , & cum Terra unum *Globum terraqueum* , seu *Terraquam* constituens. Unicus autem in toto Terrarum Orbe est Oceanus , circa quatuor mundi partes ita continuatus , ut nullus sit Oceanus , aut mare , quod non eidem in aliqua mundi parte , sive per freta , sive per occultos terræ cuniculos cohæreat , prout inferiùs c. 3. de immensa illa voragine aquarum in Terra Suppolari Arctica , ejusdémque regurgitatione in parte extremè opposita Antartica pluribus ostendemus.

Licet autem unus & idem sit Oceanus , ratione tamen diversarum Regionum , quas alluit , diversa sortitur nomina , ita ut unus Oceanus ab Atlante monte dicatur Atlanticus , alius Hybernicus , Germanicus , Æthio-
picus ,

picus, Americus, &c. Nullum tamen mare adedè diversis gaudet nominibus, quàm Mediterraneum, ob Regionum scilicet littora, quæ allambit. Mare *Rubrum* quod attinet, testantur Lusitani, qui illud pervagati sunt, apud Barrium Hist. Ind. decad. 2. l. 8. c. 1. aquas ejus esse limpidas, & omnis ruboris expertes, colorem autem rubrum provenire ex arenis rubris transparentibus, quibus fundus maris illius scater. Diversissimas *ætiæ* in diversis tractibus induit colorum apparentias; sic enim mare *Mortuum* à lentore, & *Asphalticum* à bitumine sic dictum, Josepho teste, manè atrum, sub meridiem cæruleum, ac vesperti rubeum conspicitur; mare, quod Bandinas Insulas triginta milliaribus versùs Orientem distans circumfluit, Julio & Augusto nivis instar candescit, & tunc noxiò quodam humore infici creditur. Ad certam quandam Insulam Americanam non procul à celebri Insula Cuba, Nierenbergio teste, ad triginta propè milliaria in circuitu mare instar lactis albescit, vel potiùs argenteo colore resplendet; sic etiam, qui marinis tempestatibus frequenter sunt jactati, testantur, mare per tempestatem commotam apparere velut metallum ignitum, ac fusum, sicut & manus eodem tinctæ, quod haud dubiè, ut plura alia taceamus,

ceamus, magnum naturæ miraculum cense-
ri debet.

Magnitudo Maris nondum satis detecta est, dum aliqui duas eidem partes totius globi Terraquei, alij verò potiores Terræ, ac alij denique pares utrique attribuunt. Salsedo Maris, quæ ipsum, sicut omnia alia, à virulenta putredine conservare debet, probabilius à salinis particulis, sive sint mari coævæ, sive aliunde decisæ, atque aquis marinis commixtæ, adeoque à submarinis salifodinis continuo renascentibus dissolutæ, provenire censenda est; quamvis etiam Solis ardor ad eam multum contribuere possit.

Motus Maris generalis, directus, seu naturalis fieri solet ab Oriente in Occidentem; unde qui ex India Occidentem versùs in Africam, aut ex Lusitania, vel Hispania in Americam solvunt, longè citiùs iter suum conficiunt, quàm econtrà. Causa autem principalis hujus motus marini videtur esse Sol cum sua ab Ortù in Occasum devolutione, ac præsertim hujus cum Luna oppositio-
ne, vel conjunctione; constanter enim à nautis observatum est, in istis motum prædictum longè concitatiorem esse, quàm in quadraturis. Cujus ratio esse potest, quòd maxima Oceani pars Zonæ Torridæ subda-
tur, & consequenter alicubi à Solis radijs

normaliter feriatur, sicque ingens aquarum moles (& quidem juxta computationem Societatis Oxon.^{sis} ex solo mari mediterraneo, tempore æstivo ad minimum 5280. miliones doliorum) quoridie à Sole attrahatur, & attenuata in aërem aut vapores convertatur; unde necesse est, ut in attractarum, & consumptarum aquarum locum aliæ ab Orru, vel utroque latere juxta motum Solis & Lunæ (in quadraturis non ita perfectè Oceanum respicientium) continuò succedant. Hoc tamen non obstante mare subinde procurrentium impedimentorum constitutione nonnihil deflectere, vel etiam circulari fluxu, imò aliter, & concitatori motu per maris angustias, quàm in fundo plano procedere solet.

Alius Oceani motus componitur ex motibus contrarijs, & dicitur communiter *Æstus*, sive *Fluxus*, ac *Refluxus Maris*, estque nihil aliud, quàm intumescencia, & detumescencia Maris, quæ magis ad littora, quàm in alto Mari observari solet, quamvis in tota Oceani massa à fundo usque ad superficiem contingat, prout ex ingenti strepitu, & fragore per agitationem Maris collisorum lapillorum, conchyliorum, aliarumque rerum aliàs in fundo jacentium colligitur. Et hic quidem *Æstus Maris* usque adeò à Lunari corpore, hujus-

hujusque moru dependet, ut experientiâ recte, ad Ortum ejusdem inchoët tumor, cre-
scatque continuò, usquedam Lunâ in Meri-
diano constitutâ, fiat summum Æstus incre-
mentum; postea verò detumescat usque ad
ejus Occasum; inde iterum inchoët tumor,
fiatque summus Lunâ in Imo cœli existente,
& tunc denuò decrescat usque ad Ortum Lu-
næ, sicque mare intra 25. horas ad idem lit-
tus bis accedat, ac inde bis recedat. In
Novi-ac Plenilunijs etiam Æstus est longissi-
mè major, quàm in quadraturis, sicut etiam
in Æquinoctijs, ut adeò non solum Luna,
sed etiam Sol, præsertim in opposizione,
vel conjunctione cum Luna multum contri-
buat ad particulas salis, nitri, vitrioli, &c.
quibus mare scæter, taliter concitandas, &
agitandas, uti constat experientiâ; si enim
catinus latior aquâ nitrosâ cum sale commu-
ni mixtâ impleatur, & nocte serena radijs
Lunaribus exponatur, protinus incipiet e-
bullire. Hic tamen Æstus, licet regulari-
ter dictò modò crescat, & decrescat, diver-
sis tamen temporibus, ac locis variari, im-
pediri, retardari, aut accelerari solet, ob
ventorum nimirum, fundi, fluminum in
Oceanum irruentium, ac ipsius Maris disposi-
tionem inæqualem; sic enim in Mari Balthico,
in sinu Mexicano, Insulis Moluccis, & Philip-

pinis hic Æstus ferè est insensibilis, in Mari *Del Zur* Æstus tam excessivo recessu deficere notatur, ut in littore stantibus penitus disparuisse videatur, in incremento verò tam imperuosus est, ut omnes obvias Insulas fluctibus congregat primò, tum verò domos ipsas, ac arbores in littore stantes obruat; dum econtrà eodem tempore in opposito Mari *Del Nord* vix sensibilis sit Maris motus. Plura de hac re qui volet, consulat Kircheri Mundum subterraneum tom. 1. l. 3. item Oeconomiam mundi mirabilem Joannis Zahn tom. 2. scrutin. 4.

Terraquam ambit *Aër*, communiter in tres Regiones distingui solitus, nimirum infimam, mediam, & supremam. *Regio infima Aëris*, ubi ros, & pruina generantur, verosimilius ultra quingentos passus, seu medium milliare Italicum (quousque scilicet *Aër* ex reflexione radiorum solarium incalescere potest) non extenditur. Sic autem hæc incalescentia, ac rarefactio *Aëris* pro magis recta, vel obliqua radiorum incidentia, subinde major est, subinde minor, ut patet in Zona Torrida respectu Frigidæ, & Temperatæ, & in æstate, vel meridie respectu hyemis, vel temporis matutini, aut vespertini; ita etiam altitudo hujus Regionis Infimæ varia est, & inconstans.



Regio Aeris

Suprema

Media

Infima



Media Aëris Regio, ubi Imbres, Nives, Graines, ac cætera Meteora ortum habent, ultra quatuor Milliaria Italica, seu unum Germanicum commune (quemadmodum & Nubes) à terra non attollitur, adeoque sublimiorum montium vertices non assequitur, uti præter alios pluribus ostendit Schottus in *Physica Curiosa* l. II. c. 2. Descendit autem, quousque Nubes descendere comprobantur; nempe ad dictos quingentos passus circiter, sive medium Milliare Italicum: sunt tamen hæ altitudines penitus incertæ, & inconstantes, ut ex dictis pater. Frigida verò est *media Aëris Regio*, tum quia calor radij solaris reflexi eò non pertingit, tum quia vapores eò delati, utpotè aqueæ naturæ, in absentia caloris extrinseci, qui calorem eorum adscititium conserveat, sponte suâ redeunt ad frigus sibi connaturale, sicque Regionem hanc magis infrigidant. Dicitur hæc Regio ab aliquibus etiam *Tenebrosa*, non quòd fortè talis sit, sed quòd à Dæmonibus inhabitetur, ut docet S. P. Augustinus in nova editione Parisiensi prima parte Tom. 3. fol. 540. Imò S. Hieronymus in illud Ephes. 7. v. 12. *adversus mundi Rectores tenebrarum harum &c.* ait, hanc esse omnium Doctorum opinionem, quòd Aër iste caliginosus plenus sit huiusmodi spiritibus malis, quibus, cum Lucis Principes esse noluerint, datum est, ut
sint

sint Rectores tenebrarum, in pœnam, vel exercitationem hominum excitando ibidem imbres, coruscationes, tonitrua &c.

Suprema Aëris Regio I. calida est, propter exhalationes terrestres calidas eò subeuntes, ac ibidem stabulantes. II. Ultra 52. milliaria Italica, seu 13. Germanica à terra sursum non extenditur, quia vapor, & exhalatio, quæ sunt materia Meteororum sublunarium, plerumque altius à terra non ascendunt, quod Argolus, Clavius, & alij colligunt ex crepusculis, quæ incipiunt, & finiuntur, quando halitus supremi in Aëre, qui Solis radios aliquammodo ad nos reflectere possunt, incipiunt, vel desinunt illuminari à Sole, infra Horizontem ortivum, vel occiduum existente, qui proinde altiores plerumque non esse deprehenduntur.

III. Licet cælum Planetarum sit fluidum, ac plenum exhalationibus, è quibus Cometæ superlunares gignuntur, exhalationes tamen terrestres eò probabiliter non pertinent; vel si violenter fuerint illuc impulsæ, pondere, & inclinatione sua naturali denudè tendent, ac relabentur deorsum versùs Terram, rariquàm centrum omnium gravium sublunarium, quales absolutè etiam sunt exhalationes è terra elevatæ; imò Æther supra concavum Lunæ existens, utpote levissimus non esset aptus sustentare exhalationes terrestres segra-

viores. Sicut autem Terra est Centrum exhalationum Terreſtrium, ita Lunarium erit Luna, Solarium Sol, ac reliquorum Planetarum reliqui Planetæ, ut habet Schottus cit. c. 5. IV. Credibile est, motu Primi Mobilis, ac Siderum rapi quoque, & agitari etiam Aërem, licet non tanta velocitate, quantâ rapiuntur Sphæræ superiores, prout communiter colligunt ex motu Cometarum ibi consistentium, præsertim sub Zona Torrida, ubi motus est omnium velocissimus, ut cogitanti facile parebit. Denique Aër naturâ suâ tenuis, ac fluidus facilè se accommodat figuræ rotundæ Telluris sibi contiguæ.

Circa Aërem constituunt aliqui *Sphæram Ignis*, tanquam in loco sibi connaturali, quem volunt esse tenuissimum, ac Aëre longissimè puriorem; & hinc dicunt, eum nec lucere, nec urere, nec pabulo indigere, sed manere penitus quietum, quia nullum habet ibi contrarium. Alij tamen melius dicunt, illum esse solummodò Ignem putatitium, cum nec luceat, nec ardeat, adeoque potius defæcatum Aërem, seu Ætherem dicendum fore. Ignis autem verus, ac realis, necessitate rerum ita exigente, hinc inde dispersus invenitur partim subtus Terram in meatibus subterraneis ac ipso Inferno, partim supra Terram, ut quotidianâ patet experienciâ, partim in ipso Sole, aliisque igneæ naturæ corporibus. Ca-

CAPUT II.

De Sphæra Cælesti.

Nomine *Sphæra Cælestis* intelligitur totum illud Mundi spatium, Stellæ omnes cum suis motibus complectens, quod est inter Sphæram Elementarem, & *Aquas supercælestes*, quæ commemorantur Psal. 148. sed ad intentum nostrum non faciunt. Sphæram hanc celestem esse compositum quoddam materiale naturâ suâ corruptibile, præter claros Scripturæ textus in Apocal. & Isaïæ c. 65. de interitu Cæli & Terræ loquentes, satis convincunt Stellæ novæ ibidem generatæ, ac denuò evanescentes; sicut & Atmo-sphæra corporum Cælestium, ex eorum continuis evaporationibus obortæ, uti pluribus probat Kircherus.

Totum hoc *Cælum Sidereum* aliqui cum Aristotele contendunt esse solidum, ac instar crystalli durum; alij hoc admittunt saltem de cælo Stellarum Fixarum, seu *Firmamenta*. Probabilius tamen videtur, totum Cælum esse fluidum, ac permeabile, velut Aër ab avibus. I. quia inter ipsa Sidera Fixa visæ sunt novæ Stellæ, & supra Lunam Cometæ, uti notus ille 1618. qui ab Asterismo Lyræ transijt per Æquatorem, & Tropicum Cancræ versus Polum Arcticum, ubi extinctus est. II. Pla-

netæ, ut Venus, & Mercurius, diversissimis motibus nunc sunt supra, nunc infra Solem, nunc ad se invicem accedunt, nunc recedunt; imò Mars ipsam Orbitam Solis profundè intersectat, quæ omnia suppositâ soliditate Cælorum non nisi difficillimè explicantur. Sed de his videantur Authores communiter. Stellæ tamè juxta leges à Deo sibi præscriptas in Cælo liquido non minùs ordinatè moventur, quàm si orbi solido affixæ essent, sive deinde à solo Deo tanquam supremo omnium directore, uti cum quibusdam vult Lessius, sive ab intrinseco, vel, quod Kircherus & Schottus cum Dechales & alijs, probabilius judicant, ab Intelligentijs, qui posterior L. 1. Astron. propos. 6. id ipsum ex S. Scriptura confirmat exemplo Josue sistentis, & Achaz retrahentis Solem: atque etiam Lunæ in morte Christi à partibus orientalibus motu incitatissimo retrò actæ, ut Soli in illa admiranda Eclipsi (de qua infra redibit sermo) per tres horas supponeretur, quæ omnia Angelorum ministerio, sicut custodia hominum ac Provinciarum, ita etiam quoad tam ordinatam Siderum directionem convenientissimè tribuuntur. Accedit, quòd soliditatis Cælorum Assertores tot ferè cælos, eosque excentricos, & Epicyclos realiter inter se distinctos admittere debeant, quot motus in Stellis observantur; unde communiter 10. vel

11. statuunt, alij plures, Fricastorius verò omnino 70. admittit, quos omnes distinctè enumerat Hieronymus Vitalis in suo Lexico Mathematico, verbo: *Cælum*.

Nos econtrà *Cælum* fluidum asserentes, conformiter Scripturæ tres universim admittimus *Cælos*, nimirum *Cælum Aeræum*, quò spectant *volatilia Cæli* Gen. 1. v. 26. & 28. Alterum *Cælum sidereum*, & quidem realiter unicum, in quo Scriptura collocat *Lunam, & omnia Astra Cæli*. Deut. 4. v. 19. ac denique *Cælum Empyreum*, illam sedem Beatorum, seu *Paradisum Cœlestem*, quò raptus est S. Paulus 2. ad Corinth. 12. Interim tamen *Cælum sidereum*, licet reipsa unicum, mente dividimus in varia spacia, ac *Regiones*, seu *Cælos partiales*, quorum septem inferiores Planetis attribuimus, octavum verò, omnes in se *Stellas Fixas* complectens, licet reipsa, ac per se loquendo non moveatur, nisi quatenus scinditur, secundum partes protruditur, ac ponètrahitur à *Stellis* in eo motis, concipimus tamen tanquam *Firmamentum*, utpote in quo *Stellæ* ita *firmiter* & *constanter* eandem semper servant inter se, & ab *Ecliptica* distantiam, ac si tanquam *clavi aurei*, aut *Pyropi lucivi*, mi eidem infixæ essent; unde etiam doctrinæ causâ illud nobis imaginamur, circa *Axin*, & *Polos* unà cum *Astris*, & omnibus *circulis*, in

eo pariter sola mente conceptis, 24. horarum spatio perpetuò moveri ab Oriente in Occidentem, sicque tanquam Primum, supremum, ac velocissimum Mobile, simul secum rapere inferiores Orbitas, seu Cœlos Planetarum; ferè sicut Sphæram, seu Globum materialem Cælestè, cum Stellis, & circulis eidem appictis (Meridiano, & Horizonte exceptis) circa suum Centrum, Axim, & Polos ab ortu per Meridiem in Occasum, & inde denuò per mediam noctem ad Orientem moveri conspiciamus. Similiter ut motus diversissimos Planetarum (cum modò sint *Apogei*, seu remotiores à Terra, modò *Perigei*, seu eidem propinquiores) explicare, ac pro quovis tempore calculare possimus, varios concipimus, si non Orbis, saltem Circulos.

Præterea duplex potissimum Stellarum motus (reliquos enim extraordinarios hîc examinare non vacat) ab Astronomis agnoscitur: unus dicitur *Motus Primus*, èstque omnibus Stellaris communis nimirum ab Oriente in Occasum, de quo paulò antè dictum est; non tamen est perfecte sphæricus, sed nonnihil spiralis, nec servant Stellæ idem punctum Orrûs, vel Occasûs in Horizonte, nec eandem altitudinem meridianam, sed quotidie mutant, Sol, & Planetæ inferiores quidem valde sensibilibiter,

mi-

minùs ſenſibiliter ſuperiores , inſenſibiliter
verò Stellæ Fixæ.

Motus Secundus, ſeu *Proprius* Stellarum fit ab
Occaſu in Ortum ; obſervatum enim eſt, non
tantùm Solem, & Lunam (quod omnibus patet)
ſed & reliquos Planetas non ſervare eandem
inter ſe, vel à certa Stella Fixa, aut gradu ali-
cujus Signi Zodiaci diſtantiã, ſed alio die
jam inde diſceſſiſſe verſùs partes orientales ;
imò notatum eſt de ipliſ Stellis Fixis, ſeu Signo-
rum conſtellationibus, eas à tempore Hippar-
chi, primi Aſtronicorum Inſtrumentorum
Inventoris, ad hæc uſque tempora plusquàm
28. gradibus, adeoque integro ſerè Signo ver-
ſùs Orientem retroceſſiſſe, quod magis decla-
rabitur, ubi de Zodiaco agemus. *Motus* au-
tem ſtellarum *Secundus*, ac *Proprius*, & quaſi
retrogradus non eſt realis, ſed apparens prop-
ter retardationem, quatenùs ſcilicet non om-
nes Stellæ intra 24. horas ſimul integrum cir-
culum, ſeu ſpiram perficiunt, ſed quando
Sol v. g. ſuam jam perfecit, Luna nondum
abſolvit ſuam, ſed retrò manet, ſicquæ retro-
gredi nobis videtur ab Occidente in Orientem.
Hoc ipſo ergò, quod Aſtra lentius moveantur
circa Terram motu reali, ac vero, quàm puncta
Cœli, motu imaginario diurno, in quibus exi-
ſtebant in principio motùs, ideò retardantur,
& propter hanc retardationem motu retrogra-

do reptare creduntur à Cœli solidi assertoribus; ferè sicut limax violentiâ motûs rotæ cum hac raperetur per plurimas revolutiones, quousque nisu, ac motu suo contrario, & retrogrado successivè abolveret totam rotæ circumferentiam; quod tamen nos reipsa ita fieri negamus, sed solummodò doctrinæ causâ ita à nobis concipi contendimus, prout plurimi explicant tam Antiqui, quàm Recentiores.

Stellæ autem in Cœlo sidereo contentæ, aliæ dicuntur *Fixæ*, seu Firmamenti, eò quod firmiter semper eandem inter se, & ab Ecliptica distantiam servant, ac si eidem affixæ essent; aliæ *Errantes*, nimirum *Planetæ*, qui ordinem suum (non tamen sine ordine) sistunt, ac distantiam tam inter se, quàm à Stellaribus Fixis, & ab Ecliptica continuò mutant.

Quoad numerum Stellarum Fixarum (quarum aliquæ alijs altiores sunt, seu Cœlo sidereo profundius immersæ) licèt Antiquiores cum Ptolomæo solummodò 1022. visibiles numeraverint, Recentiores tamen longè plures assignant; imò Rheita in solo Orione 2000. tubò se observâsse testatur, ut adeò Ricciolius in *Almagesto* dicere non dubitârit: *Si quis Stellas ultra vicies centena millia putet, mihi quidem nihil inopinabile finxerit. Solus ergò Deus est, qui Psal. 146. numerat multitudinem stel-*

Stellarum, & omnibus eis nomina vocat. Perio-
dum suam juxta Tychonem Brahe, quem eti-
am sequitur Argolus l. 1. Astron. c. 16. intra
annos circiter 25411. conficiunt, intra annum
verò 51. min. sec. alijs aliter, adeoque in in-
certum sentientibus.

Planetæ sunt septem sequentes, videlicet :
Saturnus, Jupiter, Mars, Sol, Venus,
♄ ♃ ♂ ☉ ♀
Mercurius, Luna.

☿ ☽ memoriae causâ, ordine ta-
men retrogrado his versibus comprehensi :

Cynthia, Mercurius, Venus, & Sol, Mars, Iovis astrû.

Postremò tardus graditur Saturnus in Orbem.

♄. ♃. ♂. dicuntur *Planetae superiores*, ☉ *Me-
dius*, ♀. ☿. ☽. ☾. verò *Inferiores*. Tanta au-
rem est Authôrum circa distantiam, ac solidi-
tatem seu magnitudinem Stellarum ac Plane-
tarum discrepantia, ut quivis computum su-
um aliter, ac subinde idem Authôr non satis
cohærenter faciat, quod electionem certè dif-
ficilem reddit. Ego in hoc puncto inter An-
tiquiores ex Tychone, quem plerique olim se-
cuti sunt, inter Recentiores verò ex Astronomia
Carolina, ut differentia opinionum tantò ma-
gis elucescat, de singulis Planetis sequentia
supputavi. Quoniam verò distantias eorun-
dem, ac soliditates in ordine ad diametrum
vel semidiametrum Terræ metiri solemus,

ideò

ideò de his pro faciliore dicendorum intelligencia præmittendum est, *diametrum Terræ* continere 1720. ferè Milliaria Germanica; *semidiametrum* verò 860. Mill. Germ. *circumferentia Terræ* est 5400. Mill. Germ. tota verò illius superficies convexa 9288000. ac denique tota ejus soliditas 2662560000. Mill. cubica,

Ut autem quivis similia computare, & per consequens etiam corporibus Planetarum applicare queat, sciendum est, de facto satis convenire inter Geographos & Astronomos, præsertim Germanos, uni gradui Circuli Maximi convenire 15. Mill. Germ. communia, si ergò 15. ducas in 360. gradus, prodibunt pro circumferentia Terræ 5400. Mill. Hinc autem crues ejus *diametrum*, si dicas: sicut se habet 314. ad 100. ita dicta peripheria ad ejus *diametrum*, & invenies $1719\frac{2}{3}\frac{1}{4}$ seu proximè, non attendendo ad fractiones, 1720. consequenter hujus dimidium, nempe 860. erit *semidiameter Terræ*. Jam verò superficiem convexam habebis, si dictam circumferentiam 5400. multiplices cum diametro 1720. prodibunt enim 9288000. Denique soliditatem Terræ in Milliariibus Cubicis habebis, si tertiam dictæ superficiæ convexæ partem, nimirum 3096000. ducas in *semidiametrum Terræ*, invenies enim pro soliditate illius 2662560000. Mill.

Mill. Cubica. Hac ipsa occasione etiam de Milliaribus Italicis, Leucis Gallicis, Hispanicis, Belgicis, ac universim de Mensuris apud Geometras ac Mathematicos magis usitatis breviter dicemus. Itaque *Granum* omnium Mensurarum minima, est latitudo grani hordeacei, quorum 4. faciunt *Digitum*, *Palmus* æquivaler 4. digitis, *Pes*, qui non est æqualis ubique magnitudinis, & subinde in 16. digitos, communius autem in 12. Pollices dividitur, constat 4. palmis, *Cubitus* continet sesquipedem, *Passus communis* $2\frac{1}{2}$ pedes, *Passus Geometricus* 5. pedes, *Stadium* 125. passus, *Milliare Italicum* 8. stadia, seu 1000. passus, unde Milliaria vocantur, quæ Romani Cippi seu Lapidibus notârunt; unde *quarto ab Urbe Lapide*, idem sonat, ac *quarto ab Urbe Milliari*. Sic Lucæ 24. Castellum Emmaus dicitur distare 60. stadijs ab Ierusalem, id est $7\frac{1}{2}$ Mill. Ital. seu $2\frac{1}{2}$ Leucis, sive $2\frac{1}{2}$ circiter horis. Quatuor Italica, seu 4000. passus dant unum *Germanicum commune*, 5000. passus verò *Germanicum majus*. *Leuca Gallica communis* est horaria, quarum 25. tribuuntur uni gradui, *Leuca Marina*, prout in Tabulis Geographicis communiter accipi solent, 20. congruunt uni gradui. Mensuræ autem communes his versibus comprehenduntur:

Quattuor ex Granis Digitus componitur unus :

C

Est

Est quater in Palmo digitus, quater in Pede Palmus: Quinque pedes Passum faciunt, Passus quoque centum

Viginti quinque Stadium dant: sed Miliare (nim. Italicum)

Octo dabunt Stadia: duplicatum dat tibi Leucam. Ubi tamen singulariter notandum est, uni gradui Circuli Maximi competere $7\frac{1}{2}$ Milliaria Danica, 12. Suecica, 15. Germanica communia, $17\frac{1}{2}$ Hispanica, 18. Livonica, 20. Hollandica, & 20. Leucas Marinas Gallicas, prout in Tabulis Geographicis communiter accipi solent; 25. Leucas Gallicas communes; præterea 27. Milliaria Anglica majora, 45. Hybernica, 50. Anglica communia, 60. Italica, & 80. Moscovitica. Dixi autem, tot Milliaria competere uni gradui Circuli Maximi, loquendo nimirum de gradibus Latitudinis in Meridiano versus Polum, vel de gradibus Longitudinis in ipso Æquatore; nam Circuli Paralleli extra Æquatorem, sicut tantò magis decrescunt, quantò magis ab hoc recedunt versus Polum, ita etiam numerum Milliarium uni gradui competentium decrescere necesse est, uti exhibet Tabula I. & II. in fine Opusculi ponenda.

Si ergò duo loca sola Latitudine differunt, adeoque sub eodem sunt Meridiano, sed in diversis Parallelis, Latitudine minori subtractâ

tractâ à majore, habetur differentia Latitudinis in gradibus & minutis; gradibus ergò multiplicatis per 15. & minutis divisus per 4. habetur numerus Milliarium, quibus unus locus distat ab altero. Si Latitudo unius loci est Borealis, alterius verò Australis, summa utriusque Latitudinis dabit distantiam eorundem in gradibus multiplicandis per 15. ut suprà.

Si duo loca *sola Longitudine* differunt, & ambo sunt sub *Æquatore*, gradus differentiae denuò multiplicandi erunt per 15. & minuta dividenda per 4. Quòd si sint sub eodem *Parallelo* extra *Æquatorem*, sed sub diversis *Meridianis*, adeoque eandem communem Latitudinem habeant, quærat in Tabula, quor Milliariorum huic communi Latitudini respondeant, & gradus differentiae Longitudinis utriusque loci per illum numerum Milliarium multiplicentur. In exemplo sit communis utriusque Latitudo 21. gr. differentia verò Longitudinis utriusque sit 9. graduum; quære ergò in Tab. quis numerus Milliariorum correspondeat gradui Latitudinis 21. & invenes Milliariorum 14. quæ multiplicata per 9. dabunt 126. Milliariorum, nim. distantiam utriusque loci dati. Vel dicatur hoc modo: 60. minuta (seu unus gradus Paralleli dati) juxta Tabulam dant 14. Milliariorum; dabunt ergò no-

vem gradus distantiae 126. Milliaria per Regulam Trium.

Denique si hujusmodi duo loca & *Longitudine & Latitudine* differunt, laboriosius quidem est invenire Milliaria distantiae utriusque, operandum tamen hoc modo. I. Indaganda est differentia Longitudinis & Latitudinis subtrahendo minorem à majori. II. Differentia Latitudinis convertenda est in Milliaria modo suprà dicto, & numerus Milliarium inventus à parte notandus est. III. Quæritur dimidium differentiae Latitudinis, & additur Latitudini minori, ut eruatur Latitudo utrique loco communis. IV. Quærat in Tabula, quot Milliaria illi Latitudini communi respondeant. V. Per hunc numerum Milliarium inventorum multiplicetur differentia Longitudinis. VI. Hic numerus productus ex multiplicatione Milliarium, & differentiae Longitudinis; Item numerus Milliarium, in quem suprà n. 2. differentia Latitudinis fuit conversa, uterque, inquam, iste numerus ducendus est in seipsum, seu quadrandus, & ambo isti numeri quadrati ad se invicem addendi. VII. Ex hoc aggregato denique extrahitur radix quadrata, & dabit locorum distantiam quaesitam. Exemplum, quia longius esset hic apponere, quisque sibi ipsi formare poterit. Alium modum idipsum inveniendi tam Geome-

me-

metricum, quàm Trigonometricum invenire eſt apud Ozanam in 2. parte ſuæ Geographiæ c. 1. Et hic quidem operoſior modus adhibendus eſt, quando ſoli gradus Longitudinis & Latitudinis locorum noti ſunt. In Globo autem vel Mappis ſumitur Circino diſtancia duorum locorum, & applicatur gradibus Latitudinis; intercapedo enim facilè monſtrabit numerum Milliarium, computando integrum gradum pro 15. Milliaribus, & 4. minuta pro uno Milliari, ut dictum. Hæc de Menſuris; jam ad Planetas redeamus.

Saturnus eſt plumbei coloris, nec ſcintillans, nec nimis ſplendens, ſubinde occulta-
tur à love. Solem habet pro centro, à quo etiam illuminatur, ſicut omnes alij Planetæ. Diſtat à Terra ex mente Antiquiorum, diſtantiâ maximâ 12340. ſemid. Terræ, mediâ 10550. minimâ 8760. eâdem major eſt 22. vicibus. Diameter ipſius apparens in media à Ter-

//

ra diſtancia eſt 1. 50. Vera diameter ejusdem continet 2 $\frac{2}{11}$ Diametros Terræ; Latitudo Orbitæ ejusdem eſt 3580. Semid. iuxta RR. Excentricitas h. eſt 7524. Semid. Terræ, cujus duplum dat Latitudinem Orbitæ illius, nim. 15048. Diſtancia maxima illius à Sole eſt 138720. media 131195. minima 123672. Diſtancia ejus à Terra maxima eſt 152713. me-

Phases

Saturni




dia 131196. minima 109679. Semidiameter h.

// ///

apparens in media distantia 10. 30. vera 6. Semid. Terræ cum $\frac{2}{3}$ proximè, adeoque major est Terrâ 298. vicibus. Periodum suam in Zodiaco absolvit 29. annis, 161. diebus, 22. hor.

/ //

28. 3. atque adeò 30. circiter annis. Insuper observatæ sunt  stellæ, quæ ipsum quasi quidam *Satellites* continuò ac diversissimè ambiunt, eúmque pro diversa eorum ad Saturnum ante-vel postpositione, aut ab eodem separatione, accedente præsertim Saturni atmosphærâ, radios visuales variè refringente, modò triformem, modò enormiter oblongum, & ansatum faciunt, modò rotuncum relinquunt, prout ex adjecto schemate liquet. Planeta iste Astrologis audit maleficus, & ideò ab ipsis vocatur *Infortuna major*, frigidus & siccus, adeoque complexione Melancholicus, ac naturæ humanæ inimicus, nisi salubritate Jovis, calore Solis, ac Lunæ humiditate temperaretur.





Huius proximus est *Jupiter*, apparenter paulò minor Venere, & minùs splendens, habens pro centro Solem, singulis annis unum Signum Zodiaci, adeoque annis ferè

12. nim 11. annis, 315 dieb. 15. hor. 2. min.

C 4

rotum

*Jupiter cum suis
fascijs.*



totum suum cursum absolvit; maxima ejus distantia à Terra est 5416. Semidiam. Terræ, media 3990. & minima 2564. Latitudo Orbitæ ejusdem 2852. Semidiam. Diameter apparens in media distantia est $2\frac{1}{2}$ minut. Vera autem se habet ad Diametrum Terræ, ut 12. ad 5. Terrâ major est 14. vicibus. Juxta RR.^{as} Excentricitas \mathcal{Z} . est 3445. cujus duplum 6890. dat Latitudinem Orbitæ illius. Distantia maxima ejus à Sole 74987. media 71542. minima 68097. Distantia ipsius à Terra maxima est 88980. media 71542. & minima 54104. Semid.

// //


\mathcal{Z} . apparens in media distantia est 24. o. Vera 8. semid. Terræ cum $\frac{3}{4}$ sicque major est Terra 577. vicibus Quatuor habet *Comites*, qui omnes in Epicyclo moventur, circa Jovem tanquam suum centrum, sed inæqualiter pro majori vel minori ab eo distantia; proximus enim teste Argolo c. 12. dicitur suum circulum complere uno die & 18. circiter horis; 2.^{us} tribus diebus cum $13\frac{1}{3}$ horis; tertius 7. diebus, & 4. horis; quartus denique 16. diebus cum 18. horis. Omnes illuminantur à Sole, unde quando Jupiter interponitur, eclipsantur, & absconduntur. Cingitur diversis *Fascijs*, seu strijs nigricantibus, nunc paucioribus, nunc pluribus, modò sur-

C 5

sum

Figuræ

Martis.



sum, modò deorsùm arcuatis, ac modò re-
ctis; ut ex apposita Figura videre est. Sunt
autem hæ maculæ in partibus lucis recipien-
dæ, vel ad nos reflectendæ, minùs capaci-
bus orræ, quæ, si Axis Jovis ad Æquinoctia-
lem rectus fuerit, & ipsæ erunt rectæ, cur-
væ verò Axe Jovis in alterutram partem nu-
tante. Est Planeta temperatè humidus &
calidus, naturæ humanæ beneficus, & ideo
Fortuna major appellatus.

Dictis duobus Planetis, quos subinde occul-
tat, inferior est *Mars*, ignei coloris, ac
subobscurè rutilans; pro centro habens So-
lem, Perjodum suam intra biennium ferè,


/ //

nim. 686. diebus, 22. hor. 19. 49. consum-
mat. In Apogæo distat à Terra 3080. in Pe-
rigæo 410. in distantia media 1745. Lati-
tudo Orbitæ illius est 2670. Diameter ejus-
dem apparens in media distantia est 2. mi-
nut. Vera se habet ad Diametrum Terræ,
ut 25. ad 60. Mars est minor Terrâ 13. vicibus.
Secundùm RR. es Excentricitas σ est 1939.
semid. Terræ, cujus duplum, scil. 3878. dat
Latitudinem Orbitæ. Distantia illius maxi-
mâ à Sole est 22997. media 20958. & mini-
mâ 19019. Distat Mars à Terra distantiâ maxi-
mâ 36990. mediâ verò 21008 & minimâ 5026.
Semidiameter apparens illius in media distan-

tia

// III

ria est 4. o. Vera continetur in Semid. o Ter-
 ræ $2\frac{1}{2}$ & paulò plus. Unde hac minor est
 Mars 15. vicibus. Subinde in eo apparet
 macula nigra, ut in A. subinde gibbus cum
 macula, ut in B. subinde varia corpuscula cir-
 ca extimas ejus partes circumvolitantia, ut
 in C. Est intemperatè calidus & siccus, ma-
 leficus, indèque *Infortuna minor* dictus.



Sol Planetarum Princeps, ſupra ſe habet tres prædictos, & infra ſe tres ſequentes Planetas; unde & *Medius* vocatur, eſtque Regula motûs reliquarum Stellarum, diſtinguens anni tempora, ac designans Solſtitia, & Æquinoctia, uti & inæqualitates dierum, Singulis diebus non omninò unum gradum Zodia-

ci, totum verò 365. diebus, 5. horis & 48. 45. (juxta Tychonem commuiter receptum) conficit. Quamvis autem motus habeat in ſe penitus æquales, ac uniformes, extrinſecus tamen, & reſpectu noſtri, variæ irregularitates, ſeu Anomaliæ, ejus locum, magnitudinem, ac motum immutant. Sic enim primum ſemicirculum Zodiaci, nimirum Borealem, percurrit 186. diebus & $18\frac{1}{2}$ horis, Australem verò diebus 178. & $11\frac{1}{2}$ horis, adeoque in Signis Borealibus ratione Apogæi 8. diebus & 7. horis longiùs commoratur, quàm in Australibus. Similiter ſua Apogæa & Perigæa non perficit eodem loco, ſed juxta ordinem Signorum mutat. Diſtantia ejus maxima à Terra eſt 1190. media 1150. minima 1110. adeoque Orbita illius 80. Semid. Diameter illius appa-

rens in media diſtantia eſt 30. 30. (cujus notitia ſervire poteſt pro uſu pinnacidiorum, ac
Alti.

Altitudine Solis observandâ) Diameter vera
 continet 5. Diametros Terræ, cum $\frac{1}{74}$. adeo-
 que est major Terrâ 140. vicibus. Secundum
 Modernos Excentricitas illius est $238\frac{1}{4}$ Distan-
 tia ejus à Tellure maxima 13993. media 13755.
 minima 13517. Semidiameter Solis apparens

/ //

in media distantia 15. 55. Vera 63. semid. Ter-
 ræ cum $\frac{1}{2}$ proximè, quare Sol major est Terrâ
 258309. vicibus. Paralaxis Solis (seu Semi-

//

diameter Terræ è Sole visa) 15. juxta dictam
 Astronomiam Carolinam, juxta alios ex Re-

// ///

centissimis 12. 30. consequenter distantia So-
 lis à Terra erit 16500. qua ratione etiam reli-
 qui Planetæ proportionaliter magis elonga-
 buntur. *Maculæ Solis* (quæ probabilius sunt
 fuligines bituminosæ, haud plùs distantes à
 Sole, quàm nubes à Terra) subinde sunt pau-
 ciore, subinde plures observatæ à 3. usque
 ad 30. Incipiunt plerumque apparere in par-
 te Disci Orientali, & moventur versùs Occi-
 dentalem, donèc evanescant, in medio qui-
 dem tardiùs, quàm in fine. Corpus Solis est
 naturâ suâ igneum, & saltem ad sensum, Sphæ-
 ricum, quod partim igne liquido instar Oce-
 ani fluctibus in altum jactatis ebullit, partim
 solidis eminentijs, seu montibus ignivomis
 aspera-

asperatur, ut ex adjecto schemate colligitur. Est Planeta non solum luminis & caloris, sed etiam specifica panspermarica virtute præditus, quam circumstantibus ac subjectis rebus communicat; unde rectè à D. Ambrosio dicitur *Oculus Mundi*, *Iucunditas diei*, *Pulchritudo Cæli*, *Mensura temporum*, *Virtus & Vigor omnium Nascentium*, *Dominus Planetarum*; & perfectio omnium Stellarum. Ex dictis autem de media distantia Solis à Terra, quæ est Semi-Diameter Circuli Solaris diurni, infertur I. Solem tanta velocitate moveri, ut uno horæ minuto primo majus spatium absolvat, quàm nuntius singulis diebus 10. Milliaria Germanica communia percurrans, quatuordecim mensibus conficeret & hoc quidem in sententia Tychonis omnium ferè Authorum in similibus parcissimi. Si verò Modernos, & præsertim recentissimè in Actis Eruditorum relatos, mediam Solis distantiam 16500. Semid. Terræ astruentes sequamur, sol quovis die absolvit 89113200. hoc est, octoginta novem milliones, centum & tredecim Millia, ac ducenta Milliaria Germ. communia; intra horam verò 3713050. seu tres milliones, septingenta ac tredecim millia, & quinquaginta milliaria; spacio autem unius minuti primi percurrit 61884. id est, unum supra sexa-


sexaginta millia , octingenta & octoginta quatuor milliaria; & quovis minuto secundo (quod pulsui arteriæ in homine sano æquiparatur) 1031. Milliaria Germanica.

Hinc præfatus Cursor quotidie 10. Milliaria percurrentes iter Solis diurnum 24414. annis , Horarium 1017. annis , spatium Solis unjus minuti primi 16. annis, ac denique spatium unjus minuti secundi 14. septimanis longè non absolveret.

Et quoniam juxta communem Astronomorum Saturnus decuplo plus distat à Terra , quàm Sol , idè qui dictam curiositatem ad distantiam Saturni à Terra , ejusque cursum diurnum, Horarium, ac Minutarium applicare volet , singulis præfatis postis unam cyphram seu nullam, quoad Stellas fixas autem duas nullas addere debet , & habebit intentum. Ex Apogæo autem Solari, quod Sol nunc peragit in Signis Borealibus , infertur 2.^{do} Solem mense Decembri in Terris Antipodum , ubi tunc est Æstas summa , ratione Perigæi ac suæ vicinitatis , majorem Æstum causare , quàm apud nos Æstare media.

Venus post Lunam & Solem (quem tanquam centrum circuit , & idè modò falcata , modò semiplena , modò plena conspicitur,

*Phases Veneris crescentis ac
decrescientis*



citur, à quo etiam ultra 48. gradus nunquam recedit) omnium lucidissima, ac maxima apparet, quæ quando manè Solem præcedit, *Phosphorus*, seu *Lucifer*, & quando vesperi eundem sequitur, *Hesperus* appellatur. Cursum suum peragit spatiò unius anni, sicut Sol, à quo, teste Argolo, distat 855. Semid. Distantiam à Terra communem habet cum Sole. Diameter ejus apparens in media distantia est $3\frac{1}{4}$ minut. Vera se habet ad Diametrum Terræ ut 6. ad 11. Venus est minor Terrâ $6\frac{1}{2}$. vicibus.

Juxta R R. Excentricitas illius est $71\frac{1}{2}$. cujus duplum dat Latitudinem Orbitæ $142\frac{2}{3}$. Distantia ipsius maxima à Sole est 10020. media 9949. minima verò 9878. Distat à Terra distantia maximâ 24013. mediâ 13755. minimâ 3497. Semidiameter ejus apparens in me-

// ///

dia distantia est 10, 30. vera continetur in Semid. Terræ $1\frac{2}{3}$ circiter, unde minor est Terrâ 3. vicibus. Periodum suam absolvit


/ //

224. diebus, 16. hor. 49. 24. Calida est, & humida temperatè, ac benefica, & idè *Fortuna minor* dicta.

Mercurius pariter pro centro habet Solem, & idè probabiliter crescit, & decrescit, sicut Venus, à quo etiam non recedit plùs quàm 28. gradibus circiter. A Terra habet eandem cum Sole distantiam. Diameter ejus

appa-

apparens in media distantia est $2\frac{1}{8}$ minus
vera ejus Diameter se habet ad Diametrum
Terræ ut 3. ad 8. Lucidus est, sed parùm can-
didus, Terrâ minor 19. vicibus, distatque
à Sole, Argolo teste, 582. Semid.



Juxta Modernos Excentricitas illius est
1096. cujus duplum 2192. dat Latitudinem
Orbitæ ejusdem, Distat à Sole distantia ma-

ximâ 6420. mediâ 5324. minimâ 4298. Distat Mercurius à Terra distantia maximâ 20413. mediâ 13755. minimâ 7097. Semidia-


// ///
meter ejus apparens in media distantia s. o. vera est $\frac{1}{3}$ Semid. Terræ. Unde minor est Terrâ 27. vicibus. Periodum suam facit 87.

/ //
diebus, 29. hor. 15. 53. Motus illius instabilis est, nunc directus, nunc retrogradus, vel etiam stationarius; modò sub Solis radijs absconditur, modò ex iisdem emergit. Est in motu & figura ferè Veneri similis; quando uterque Planeta est Apogæus, Mercurius stat infra Venerem, si uterque Perigæus, supra eandem. Est ancipitis naturæ, malus cum malis, & cum bonis bonus; ex se verò siccus, ob Solis vicinitatem, ac frequentem combustionem.

Luna omnium Planetarum infima, & ideò
I. sola in conicam Terræ umbram incidit. II. ob sui propinquitatem cum Terra & oculo nostro Sidera omnia in conjunctione occultat, quantæcunque sint magnitudinis, ut patet in Eclipsi Solis totali, quæ contingit in Novilunio per directam interpositionem Lunæ inter Solem & Terram. III. ob eandem vicinitatem apparet alijs major, licet sit plerisque minor. IV. ob eandem rationem
Luna

Luna majorem ac longiorem Sole , aliisque Planetis projicit umbram in Plano Horizontali. V. in Perigæo distat juxta Argolum

Facies Corporis Lunaris .



solummodò 51. 57. Semid. in Apogæo 60. in media distantia 56. unde Latitudo Orbitæ ejusdem erit 8. semid. - Hinc quando Soli conjungitur, aut opponitur, in maxima distantia, distat à Terra 57. 38. semid. in

quadratura verò 60. 4. minima verò distan-
 tia seu Perigæo, si tunc. jungitur, vel oppo-
 nitur Soli, distabit 54. 23. semid. in quadrato
 autem 51. 57. Semid. Diameter apparens erit
 circiter 33. minut. Vera Diameter Lunæ
 continetur in Diametro Terræ ter $\frac{23}{43}$. Præte-
 reà Corpus Lunæ est minus Terrâ 42. vicibus.
 Duplex illi attribuitur Mensis, unus dicitur
Periodicus respectu Zodiaci, cujus integram Pe-
 riodum absolvit spatio 27. dierum, 7. hor. &
 43. minutis. Alter mensis vocatur *Synodicus*,
 computatus ab una conjunctione Lunæ cum
 Sole ad aliam, quæ contingit intra 29. dies,
 12. horis, & 44. min. Cæterum movetur
 etiam Luna in latitudinem, deviando ab
 Ecliptica hinc inde versùs Boream & Austrum
 5. gradibus, & 17. min. ad summum. Puncta
 maximæ Latitudinis dicuntur *Limites* (nimi-
 rum evagationis Lunaris) seu *ventres Draconis*,
 Puncta verò intersectionis Eclipticæ, ubi nul-
 lam Luna habet Latitudinem, vocantur *Nodi*,
 & ille Nodus, à quo Luna ascendit versùs
 Signa Borealia, dicitur *Caput Draconis*, &
 exprimitur hoc signo ☊. Alter verò Nodus,
 à quo Luna digreditur versùs Signa Austr-
 alia, dicitur *Cauda Draconis*, & sic notatur, ☋.
 Causa autem, cur Arabes ita appellârint, est
 quòd segmenta, quæ evagatio Lunæ ab Eclip-
 tica describit, habeant similitudinem cum
 ser-

serpente, cujus *caput* & *cauda* sunt acuminata, *venter* verò latior. Iuxta Neotéricos Excentricitas Lunæ est $4\frac{1}{2}$ cujus duplum $8\frac{1}{2}$ dat Latitudinem Orbitæ. Distantia Apogæa à Terra est $64\frac{1}{2}$. Perigæa $55\frac{6}{7}$. media 60. Semid. ejus apparens in media distantia à Terra, Lunâ existente in oppositione, vel conjunctione, est
/ //

15. 17. Semidiameter vera est paulò plùs quàm $\frac{1}{4}$ Semidiametri Terræ. Diameter Horizontalis apparens Apogæa in Novi-aut Pleni - Lunio $28\frac{2}{3}$. Perigæa 33. sicque differentia
/

utriusque est paulò plùs quàm 4. Tellure minor est Luna $50\frac{1}{11}$ vicibus. Latitudo maxi-
o

ma in Novi-& Pleni Lunio est 5. in quadratu-
o / / //

ris 5. 18. Paralaxis maxima 61. 2.

Quantum ad Corpus Lunare, densum est, crassum, & opacum, nullâ præditum luce, nisi alienâ, Solis maximè; unde quando opponitur Soli, distans ab eo integro semicirculo, ut fit in Plenilunio, tota ejus facies nobis obversa apparet illuminata; distans verò 90. gradibus, seu quadrante Circuli, semiplena; conjuncta autem cum Sole in Novilunio, partem illuminatam à nobis averfam, alteram verò omni lumine destitutam nobis

obvertit. Ubi more suo pulchrè advertit S. P. Augustinus Tom. 2. fol. 131. litt. A. *Sicut Luna ad oculos nostros augetur recedendo à Sole, & minuitur ad eum appropinquando; sic anima recedendo à Sole Iustitiæ ad exteriora convertitur, appropinquando verò se convertit ad interiora, in iisque crescere incipit, & à terrenis se quodammodo avertit.* Quòd si ante & post conjunctionem cum Sole, dum corniculata existit, tota ejus corporis rotunditas dealbicans, vel etiam in Eclipsi Lunari (quæ semper contingit in Plenilunio per interpositionem Terræ inter Solem & Lunam) aliqua ejus lux in reliquo corpore appareat, illud non innato ejus luminis, sed radijs solaribus ac siderum, in eo velut speculo reflexis,tribuendum est. Cæterum constat ex partibus liquidis & solidis, seu ex Terra & Aqua Lunari, quòd probare videntur maculæ, quarum quæ minùs illustres in Schemate cernuntur, censentur esse fluidæ, adeoque lumen Solis imbibere, sed minùs reflectere, quàm partes solidæ, & consistentes. Montes verò, & valles, sylvæ & lacus in corpore ipsius apparentes, nec provenire à forma Telluris, in Luna tanquam speculo repræsentatâ, prout Rudolphus II. apud Keplerum speciatim credidit, se in ea videre effigiem Italiæ cum duabus adjacentibus Insulis; nec esse veros montes, valles, aut

aut ſylvas reales, ſimiles noſtratibus, prout
adverſus Marium contendit Helvetius; ac
multò minùs inhabitari ab hominibus & ani-
malibus, ut ſomniavit David Fabricius Friſius,
facile convincitur, tum quòd uno, eodẽ-
que tempore in diverſis locis penitus diverſa
videretur, tum quòd abſque fictione mon-
tium, ſylvarum, ac marium realium ſuffi-
ciat, Lunam corpus eſſe inæquale, nec ubi-
que & eodem modo radios ſolares admittere;
tum denique, quòd Act. 17. Deus dicatur
*ſeciſſe ex uno omne genus hominum inhabitare ſuper
univerſam faciem Terræ*; taceo, quòd Chri-
ſtus, qui tanquam ſecundus Adam pro omnibus
hominibus, ex Adam deſcendentibus, mortu-
uſeſt, pro his in Luna exiſtentibus, redi-
mendis minimè veniſſet; unde nec plantas,
nec animalia in uſum hominum unicè ordi-
nata ibidem exiſtere, credendum eſt. Qui
plura paradoxade Luna volet, adeat Oecono-
miam Mundi mirabilem Ioannis Zahn tom. 1.
ſcrut. 2. ad fin. Denique Luna, quantumvis
ex ſe frigida, & humida ſit, communica-
tis Solis radiis mirè temperatur, & viciffim
Solis æſtum ſuo influxu infringit; unde eri-
am naſcitur qualitas Lunæ valde nitroſa, ac
mirè penetrativa, uti ſentiunt Podagrici, Lu-
narici, & Hypochondriaci, aliisque tartareis
ac falſis humoribus & deſfluxionibus obnoxij,

quantumvis densissimis muris inclusi. Hinc etiam oritur Æstus Marinus, qui circa Novi- & Plenilunium semper major observatur, ut initio statim fol. 18. observavimus. Similiter si radij Lunæ Plenæ artificiosè speculò concavò excipiantur, & in conum coarctentur, mirè frigefacere & humectare (sicut radij Solares taliter excepti exsiccare & calefacere) sentientur; imò aquam inde collectam ad verrucas emolliendas & extrahendas aptissimam dicunt. Videmus eandem sympathiam Lunæ cum varijs affectibus, atque etiam vulneribus corporis humani; & miram vim in prægnantes ac fœtum ipsum, in hepar glirium, oculos felium, in diversa animalia, arbores, plantas, lapides &c. de quibus rara & copiosa exempla invenies in Oeconomia Mundi mirabili cit. scrutin. 2. disquisit. 1. c. 3. §. 3.

Denique juxta Tychonem Stellæ Fixæ (suppositâ saltem mediâ earum à Terra distantia 14000. semid.) I. magnitudinis Terrâ communiter majores sunt 68. vicibus circiter; licet insigniores, uti est Canis major, & Lyra, credat parùm abesse, quin Terræ molem centies excedant, Minores verò Stellæ Terrâ non multò plùs quàm 45. vicibus majores censet. Circumferentia orbis, in quo versantur, est 88000. semid. proximè; unde
 ipsis

ipſis duobus minutis paulò plùs quam 4. integræ Terræ Diametri competunt.

II. magnitudinis Stellæ Terrâ majores ſunt $28\frac{1}{2}$ vicibus.

III. magnitudinis 11 . ferè vicibus.

IV. magnitudinis ſesquiquater.

V. magnitudinis continent Terram $1\frac{1}{18}$.

VI. magnitudinis ſunt Terrâ minores 3. vicibus.

Quamvis autem Tycho aliàs in ſuis obſervationibus, quantum libero oculo licuit, fuerit ſolertiſſimus, ad inventis tamen perfectioribus Teſcopijs, longiùs progreſſi ſunt Neoterici, ita ut Ricciolius diſtantiã Solis uſque ad Fixas proximas menſuret 210000. ſemid. Terræ, Rheita verò 20000000. & Keplerus 39996640. ſemid. Ego in re tam ancipiti referam ex Hugenio inſigni Aſtronomo ſaltem ſequentia. I. enim ait, ex mente Copernici Fixas ad eò à Terra remotas eſſe, ut tota Solis Regio, quam curſu ſuo expatiatur, reſpectu Firmamenti non niſi unicum punctum reputari deberet. II. Quanta eſt diſtantiã proximarum Fixarum à Sole vel Terra, tantam quoque hatum eſſe diſtantiã à ſibi ſuperioribus, & ab his ſimiliter ſemper progrediendo ad denudò ſuperiores uſque ad ſupremas. III. Nihil obſtare, quò minùs rationabiliter credi poſſit, quamlibet Fixarum Soli magnitudine ſua

sua minimè cedere, quod ex vivacitate luminis ad tam immensam distantiam satis colligitur. Imò IV. ex specialibus fundamentis ac modis instituendarum observationum ingeniosè à se inventis, legitimè inferre contendit, Syrium v. g. 27664. vicibus plùs, distare à Terra, quàm ab hac distet Sol; & quia hanc Solis distantiam à Terra aliunde ostendit, esse 34377. semid. Terræ, consequens erit, Fixas infimas distare à Terra, 951005328. semid. Terræ seu 817864582080. Milliaribus Germanicis, quæ distantia certè tanta est, ut si globus v. g. à Cane Syrio tanta velocitate ad Terram descenderet, quantâ globus tormento bellico excussus pergere solet (nim. spatiò unius minuti secundi, experienciâ teste, 600. pedes absolvendo) 864477. annis terminum suum vix attingeret. Ex quo ulteriùs consequens est, Fixas Æquatori proximas 24. horarū spatio emetiri quotidie 5136189575462. Milliarum Germanica, pro quibus (juxta consuetum 10. crucigerorum stipendium nuntiis communiter dari solitum) præfato Cursori solvendi forent. 856031595910. floreni, id est, octingenta quinquaginta sex millia Millionum ac insuper triginta & unus Millionēs, quingenta & nonaginta quinque millia, nongenti ac decem floreni. De quibus licet nullam certitudinem habeant Astronomi, cum Deus ip his vel maximè mundum


dum tradiderit diſputationi eorum Eccle. 3. ſufficit tamen, magnitudinem Cælorum ac Siderum eſſe tantam, ut nullâ hominum arte debite meſurari, nec cogitatione ſatis comprehendere poſſit; unde ſit à nobis omnibus Divinæ Sapientiæ, Omnipotentiae, ac Immenſitati, cui ſuam ſuorumque Electorum Regiam uſque adeò exornare placuit, honor, virtus & gloria in ſæcula.

Reſtat nunc, ut de Mundi Syſtematibus breviter dicamus. Eſt autem *Systema Mundi* certa diſpoſitio, ſeu coordinatio præcipuarum Mundi partium, ut Elementorum, Siderum, ac Cælorum, quoad ordinem & ſitum eorum tam inter ſe, quàm reſpectu Centri univerſi.

Ex varijs Syſtematibus, quæ diverſi Aſtronomi ad explicanda Siderum Phenomena excogitarunt, & indices ferè nova pro ſuo quiſque genio excogitant, quæ proinde ibidem à curioſioribus videri poterunt, hîc pro aliquali informatione non niſi tria notiora in medium afferimus. Primum eſt *Ptolemaicum*, in quo Terraqua immota ponitur in Centro Mundi, & circa hanc Elementa, & octo Cæli, nimirum Cælum Lunæ, Mercurij, Veneris, Solis, Martis, Jovis, Saturni, & Stellarum Fixarum. Tribuitur Ptolemæo, Pythagoræ, Archimedi, Chaldæis, & plurimis


Systema

Ptolemaicum



Coperni

- carum.




rimis alijs usque ad Maginum & Clavium , quod tamen de facto , utpote incremento & decremento Veneris & Lunæ, aliisque Phenomenis declarandis , nisi aliter explicetur , insufficiens, à plerisque non admittitur.

Secundum Systema dicitur *Copernicanum* à suo principali Authore, vel saltem Restauratore Nicolao Copernico Boruffo, sui sæculi Astronomo præstantissimo, postea Canonico Warmiensi, illud multis argumentis, ac ingeniosis hypothefibus corroborante, quem omnes ferè Acatholici, & multi Novitatum amatores Catholici (saltem Systema illius ut hypothefin, ad calculationes & Tabulas Astronomicas perfectiùs & faciliùs instruendas singulariter utilem accipiendo) sequuntur. Pōnit is Solem immobilem in Centro Mundi, saltem quoad motum translationis; & circa eum proximè Mercurium diebus 80. revolutionem suam absolventem; deinde Venerem novimestri revolutione; postea Tellurem cum tota Sphæra Elementari eo in orbe, in quo alij collocant Solem cum annua sua revolutione ac motu diurno circa suum Centrum ab Occidente in Orientem; Luna verò circuit Terram revolutione menstrua; Mars autem circa Solem revolutionem bimam peragit, deinde Iupiter duodennem, ac tandem Saturnus tricennem. Sphæra item Stellarum Fixarum
pror-

prorsus immobilis est, & adeò vastò intervallo à Saturni Sphæra distans, ut Terræ orbis annuus sit puncti instar ad illam. Quamquam autem multi ab hac ejus sententia, utpote communi sensui, & præsertim Scripturæ Sacræ, Terræ quietem, Soli autem & Astris motum passim tribuenti, saltem in sensu reali ac literali loquendo, minùs conformi abhorreant; est tamen, si ut pura hypothesis accipiatur, omni curiosæ ac utilis inventionis laude digna.

Tertium Systema communiter, olim saltem receptum, est *Tychonis Brahe*, hujus ac præteriti sæculi nobilis Astronomi, ubi Terram cum Elementis collocat in medio Mundi immobilem, circa quam tanquam Centrum gyratur primò Luna, deinde Sol, ac demùm Sphæra Fixarum, reliquorum verò 5. Planetarum Centrum est ipse Sol, ut patet ex Systemate Tychonico. Et Mars quidem ita Solem ambit, ut in oppositione cum Sole perigæus factus, infra Solem descendat, ejusque orbem profundè interfecerit, Terræque propior fiat, quàm ipse Sol. Idem Systema etiam Longomontanus (addito tamen motu Terræ diurno circa suum centrum ab Occidente in Orientem) Scheinerus, Blancanus, aliique passim tanquam verius, ac S. Scripturæ,

Tychonicum




rae, communique sensui magis accommodatum amplectuntur.

Post Planetas etiam de Cometis dicendum breviter. *Cometa*, ut ait Ricciolius, est splendidum anigma à Deo propositum, nunquam ab humanis ingenijs solvendum. Licet diversissimis formis appareant, ad 3. tamen species reduci solent, ita ut unus dicatur *Barbatus*, qui ra-

E

dios


Tychonicum



ræ, communique sensui magis accommodatum amplectuntur.

Post Planetas etiam de Cometis dicendum breviter. *Cometa*, ut ait Ricciolius, est splendidum enigma à Deo propositum, nunquam ab humanis ingenijs solvendum. Licet diversissimis formis appareant, ad 3. tamen species reduci solent, ita ut unus dicatur *Barbatus*, qui radios

66 De Sphaera
Cometarum Apparentiae et Umbrae



dios suos antroꝛſum porrigit, eò nempe, quò
 iter inſtituit; alter *Caudatus*, qui radios poſt
 ſe trahit; ac tertius *Crinitus*, qui jubare ra-
 dioſo, quaſi crinibus undique cingitur. Quo-
 ad originem Cometarum, quot ſunt capita,
 tot ſunt ſententiæ. Illud ſaris certum eſt,
 quosdam eſſe ſub-alios ſuperlunares, ut pa-
 tet ex Paralaxi, quam aliqui habèrunt mayo-
 rem Lunâ, & ex eo, quòd aliqui ab una ſo-
 lum Urbe vel Regione viſi ſint, ut ille Hiero-
 ſolymis ante excidium; imò ille A. 1450.
 dicitur Lunam eclipsaſſe, & conſequenter fu-
 it eadẽ inferior. Hinc probabile videtur,
 Cometas fieri ex halitibus ac fumoſitatibus,
 quas ſublunaribus Terra, ſuperlunaribus ve-
 ro ſidera ſubminiſtrant, Sol præſertim, qui,
 teſte Hevelio, uno anno tantam exhalatio-
 num copiam evomere poteſt, ut ad 130. tales
 Cometas, qualis A. 1664. luxit, vel ad 9.
 Diſco Terreno æquales efformandos ſufficere
 poſſit, ut exhalationes aliorum Planetarum
 taceamus; unde mirum videri minimè debet,
 ſi uno anno plures generentur Cometæ, ſed
 potiùs, quòd tam pauci prodeant; volunt
 tamen, plures Cometas (quales in Eclipſi-
 bus Solis totalibus circa ipſum obſervati ſunt)
 in cælo exiſtere, quàm à nobis ob eorum di-
 ſtantiã vel exilitatem videantur; ubi Schei-
 nerus inſuper dicit, ſe conſtanter obſervâſſe,

Sole sine maculis apparente, ordinariè natum esse Cometam. Fumositatibus ergò hujusmodi magnà copiâ in unum globum, vel plures nucleos globum constituentes congregatis, globus accensus exhibet Cometam, ac proprijs exhalationibus fortè unctuosus (sicut flamma lucernæ vel candelæ oleô aut cerâ) longo tempore nutritur; communiter tamen ultra 80. dies haud durant, & unicus ille A. Christi 375. octimestris fuisse dicitur. Quòd autem ille ante excidium Hierosolymitanum integro anno, ille verò Magis ante Christi adventum apparens duobus annis arsisse dicatur, stellis extraordinarijs ac miraculosis annumerari debent.

Caput Cometæ ordinariè ex diversissimis nucleis dilucidiorè materiâ poris intersitâ constat, ut radijs solaribus facilior transitus pareat: subinde etiam aliquid stellulis conglobatis simile, instar spiritûs vini accensi luculentibus, observatum est. Imò A. 1618. deprehensum, Caput Cometæ instar ingentis foci, 3. vel 4. prunas ardentes in frusta dissilientes exhibentis apparuisse. Caput Cometæ non est figuræ rotundæ, sed scabrosæ, irregularis, ac discæ seu planiformis; unde eos nec motum circularem, nec rectilineum sortiri, discum tamen semper Soli normaliter obvertere, ait Hevelius. Nec est ejusdem

dem semper coloris, luminis ac formæ, sed certis diebus amœniùs ac lucidiùs apparet, Lunâ verò præsentē notabiliter obscuratur.

Caudam Cometæ ordinariè à Sole averſam protendunt, niſi radij ſolares, quod sæpiùs fieri ſolet, ob inæqualitatem nucleorum ca- put Cometæ conſtituentium, in illud incidentes refringantur, unde Barbatos Sole ſublimiores, Caudatos verò magis eidem laterales eſſe neceſſe eſt. Sic, ſi Cometa v. g. ſupra Solem B. exiſtat in G. cauda ejus multum elevabitur in L. ſub ſatis magno angulo viſuali G A L. ſub minore, ſi exiſtat in I. ſi verò ſit infra Solem in C. major apparebit, ac denique in oppoſitione Solis exiſtens in F. ex A. abſque omni cauda hirsutus videbitur, uti pluribus figura monſtrabit.

Motus Cometarum juxta Hevelium eſt triplex: Primus omnibus ſideribus communis ab Oriente in Occidentem; Secundus appa-rens, quem curſu retrogrado (ſaltem propter retardationem taliter concep- to) penitus inæquali perficiunt; Tertius eſt proprius, & cuius Cometæ à natura inditus, ſecundum quem nunquam ſunt ſtationarij aut retrogradi, ſed ſemper in directum, aliqui quidem in Ortum, alij in Occaſum, pauci in Meridiem, plurimi Aquilonem verſus.

progredi solent. Nunquam sunt tardiores Saturnò, nec Mercuriò velociores, ac distantias suas à Terra indices variant. Quando decreseunt, materia illorum magis magisque disgregari incipit, ipsi verò caudam retortam fortiri ac pallefcere solent, donec omninò diffluant ac evanescant.

Quoad *significationem Cometarum* omninò tenendum est, eos esse signa ominosa, & extraordinaria naturæ prodigia ac porrenta, prænuntiòsque insolitorum eventuum, à priori in se infaustorum, ut famis, pestis, Terræ moruum, belli, mortis Principum &c. licèt per accidens alijs fuerint fausti, ut patet experientiâ, si vel solum illum Cometam prægrandis ac lucidissimæ caudæ, nimirum 83. gradus longæ A. 1680. die 26. Decembris communi Spectatores suos Terrore concutientem consideremus, cujus deplorandi effectus hodiedum perdurare videntur; conformiter Scripturæ sacræ Luc. 21. v. 11. *Terrorores de cælo, & signa magna;* item Ioëlis 2. v. 30. *Prodigia in Cælo, & in Terra sanguinem &c. adstruenti.* Et certè ipso naturæ instinctu omnes in Terra Populi, quantumvis barbari, & cujuscunque fidei vel statûs, visis Cometis terrentur, eosque apprehendunt ut signa ac prodromos imminentium calamitatum.

C A P U T III.

De Centro Mundi, Axe, & Polis.

Centrum est Punctum medium, seu infimum Universi, è quo, sicut à divina omnipotentia tota Mundi machina evoluta est, ita omnia (sic ordinante divinâ sapientiâ) ad idem tendunt, & collimant; unde Terra, tanquam hominis habitaculum, meritò in hoc mundi Centro collocata est, ut scilicet, sicut in gratiam hominis Cæli & omnia reliqua mundi corpora creata sunt, ita hæc in Tellurem, seu in principium passivum, ac veluti naturæ gremium, vires suas ac seminales virtutes effunderent, quibus ut fertilissima hæc Mater tantò commodiùs imprægnaretur, in quiete eam constituit Deus; sicque longè convenientius erat, cætera in obsequium ipsius creata Circa eam in quiete sua relictam moveri, quàm ut ipsa, reliquis quiescentibus continuò moveretur. Certum ergò esse debet, Centrum terræ esse Centrum omnium gravium, quò nimirum omnia gravia saltem sublunaria naturali nisu tendunt, & quidem, nisi impediantur, semper viâ brevissimâ, hoc est, per lineam rectam: & licet Centrum gravitatis terræ à centro magnitudinis ejusdem diversum sit, imò accessione novi ponderis

deris v. g. integri exercitus, vel Classis nauticæ, continuò mutetur, tamen Centro mundi probabiliùs invariabiliter congruit, nec necessariò sequitur *Motus*, ut vocant, *Trepidationis*; tum quòd pondus hujusmodi adventitium respectu totius Terraquæ sit inæstimabile, ac impotens illam deturbare è sua possessione quiera; tum quia Ps. 92. dicitur. *Deus ita firmasse orbem Terræ, ut in æternum non (ne dicam continuò) commoveatur.*

Quantum ad terræ motus attinet, qui probabiliùs ex Aëre variorum spirituum, ac materię combustibilis copiâ turgido, intra terræ viscera concluso, ac tandem incalescente aut rarefacto, vel vi ignis subterranei, aut quavis aliâ causâ accenso, ortum habent, qui instar pulveris tormentarij cuniculis inclusi, majus quærendo spatium, Terram quatit, effringit, & quamcunque insistentem molem disjicere conatur &c. quod in locis thermarum, nitri item ac sulphuris copiâ scatentibus (uti sunt plerumque Insulæ) atque etiam maritimis, montosis, & cavernosis frequentius accidere solet; dicendum est, hujusmodi terræ motus vel esse solùm partiales, ac superficiales, vel, si teste Didymo, terræ motus in morte Christi fuit universalis, præter legem ordinariam Divinâ virtute, ac ipso Inferno infremescente ejusmodi concussionem causa-


causam esse; quemadmodum etiam Eclipsis illa tempore Christi morientis (exclamante Dionysio Areopagita: *Aut Deus naturæ patitur, aut mundi machina dissolvetur*) citra omnem naturæ legem contigit, utpote in Plenilunio, ubi Luna de jure integro semicirculo à Sole remota, mutato ordinario suo cursu ab Oriente in Occidentem retrogredebatur (oculato teste eodem Sancto Dionysio in Epist. ad Polycarpum, quem etiam allegat S. Thomas in sua Cæna aurea in cap. 27. Matthæi) & cum illi jam directè opponeretur, in hoc statu per tres horas immota quievit; & quod plus est, ita retrogrediendo præter communem ordinem, partem Disci solaris orientalem prius eclipsavit, quàm occidentalem, ac tum denuò suum cursum proseguendo versùs Orientem, partem Solis, quam ultimò occupavit, prius reliquit.

Quamvis autem Terræ moles sat is notabilis sit, ut suprà fol. 32. vidimus, respectu tamen totius Cæli, vel etiam Firmamenti merissimum punctum reputatur. Ad Centrum redeundo, de hoc sequentia notanda veniunt. I. *Centrum Magnitudinis* esse Punctum medium cujuslibet figuræ, per quod figura bissecatur; quemadmodum etiam *Centrum Gravitatis* est ejusdem Gravis medium, per quod bissectum, utrinque æquiponderat. Licet enim corpus gra-

ve secundum aliquam sui partem v. g. extremam, Centrum contingeret, quia tamen partes graviores superinsistentes illam comprimunt, necessarium est, illam partem extremam à Centro in partem oppositam tamdiu cedere, donec totidem partes æquiponderantes secum attulerit, quot ex hac parte superiore manent; unde sine hoc Centro gravitatis in rebus existente, nullus daretur nisus ad Centrum Universi, absque hoc nisu verò nullus sequeretur motus, sine motu autem omnia torpescere, imò in chaos suum reverti necesse foret.

II. Notandum, in figuris homogeneis Centrum gravitatis semper coincidere cum Centro magnitudinis: quomodo autem illud in omni genere figurarum & corporum inveniendum sit, clarè demonstrat Kircherus in suo Mundo subterraneo tom I. lib. I. c. I. ex quo insuper.

III. Notandum circa corpora ex partibus heterogeneis confata, v. g. Sphæram, vel globum plumbeum; vel enim segmenta A. B. utrinque ex cera aut ligno e. g. in modum Sphæræ agglutinata sunt æquiponderantia, & sic servabunt idem commune Centrum magnitudinis & gravitatis; vel si solummodo ex una parte adderetur segmentum heterogene-



rogeneum v.g.


A. Centrum gravitatis tantò magis recederet versùs partè gravio-rem, quò levius esset segmen- tum appositū, vel vicissim.

Linea ergò re-cta, per quam, ceu viam bre-

vissimam, grave tendit ad Centrum, dicitur *Linea Directionis*, eò quòd sit directiva motùs gravium, utpote qui secundum ipsam regula-riter fieri debet, nisi per accidens impedi-atur, & concipitur ducta à Centro-Mundi per Centrum corporis gravis. Omnes autem

Lineæ Directionis in superficie terræ confide- ratae (licet continuatae in Centro concurre- rent) ad sensum tamen sine omni erroris pe- riculo, censentur esse parallelæ, ut patet in Gnomonibus sciotericis, & ex praxi Archi- tectorum, nullo habito ad centrum respectu, muros passim ad amussim disponentium.

Hinc autem infertur I. Motum progres- sivum hominis necessario fieri secundum Li-
neam



neam Directionis , ut patet in-fitu A. B. D. quia per hanc viam tenderet descendendo ad Centrum , & propriè æquilibratur , ac dirigatur ad operationes suas commodius exercendas. Si neges ; ponamus illum à Linea Directionis E C. deviare in H. ubi pàter, illum ita inclinare , ut esset casui proximus ; ergò ut erectus stet , debet secundùm Lineam Directi-

rectionis erigi ex C. in I. Item ponamus in superficie Terræ construi pontem rectā protensum F B G. ubi denuò manifestum est, hominem per eum incedendo ex F. versùs B. quasi in præceps tendere per vallem, in B. verò secundum Lineam Directionis denuò erectum stare, & pergendo versùs G. quasi sublimem montem conscendere.

Infertur II. Naturæ sagacitati tribuendum, quòd quadrupedes duobus pedibus diagonaliter oppositis elatis progrediantur, reliquis verò duobus plano insistant; quia pedibus ejusdem lateris simul sublati, Linea Directionis Centro gravitatis dicti animalis non ampliùs congrueret, sed latus elevatum præponderaret alteri, & sic animal necessariò caderet. Idem est de volucris, quæ inclinando se, ut cibum capiant in terra, pedes antrorsum ita inflectunt, ut totum Corpus æquilibretur; si verò volant, duabus alis quasi fulcris in æquilibrio sustententur, ne una pars alteri præponderet. Ob eandem causam videmus aves longioris colli etiam longiora crura habere, & ideò ad procurandum dictum æquilibrium, inter volandum collum antrorsum, crura verò retrorsum extendere, & dum sursum volant, alas quoque seu fulcra in anteriorem partem protendere, si verò deorsum, in posteriorem partem retrahere.

Sicut

Sicut autem gravia naturali nisu deorsum , ita levia sub eâdem Lineæ centralis Directione sursum tendunt ; unde etiam vegetabilia sub ista Directionis Linea crescere, & in mundo subterraneo omnes mineralis naturæ operationes vel ad Centrum deorsum, vel à Centro sursum dirigi debere , pluribus ostendit Kircherus cit. lib. 1. c. 2. Ex quo obiter ulterius

Infertur III. in plano declivi v. g. colle, monte &c. non plures arbores crescere, aut domos construi posse , quàm in plano Horizontali, cui mons insistit , licet superficies dicti plani sit longissimè minor, quàm superficies montis ; cum enim arbores crescant, & ædificia exurgant secundum lineam directionis, & ad amussim, evidens est, nec plures arbores , nec plures domos consistere posse in superficie montis , quàm in radice.

Infertur IV. Si divinâ potentiâ pons cujuscunque figuræ regularis v. g. Circularis , Ellipticæ, Quadratæ, Triangularis &c. circa Centrum mundi , vel etiam circa superficiem Terræ construeretur, congruente centro gravitatis ejusdem cum centro mundi , cum absque fulcro liberè in aëre hæsiturum , utpote æquiponderatum , & ex omni parte æquè gravitantem. Interim nulla fabrica usui hominis apta foret, nisi circularis, quia
in

In omni alia figura non nisi in tribus vel quatuor punctis erectus stare posset, uti cogitanti facile patebit ex dictis in Inferendo I.

Infertur V. in Centro neminem pedibus insistere posse, sed necessario circa medium corporis ibi hæsiturum, adeoque fore, ut uno, eodemque tempore utrâque corporis medietate, nimirum capite & pedibus sursum tenderet; sicut etiam si duo scalam per Centrum mundi transeuntem in oppositas partes conscenderent, ambo ascenderent.

Infertur VI. Si homo divinâ potentiâ ita in Centro Terræ collocaretur, ut os ejus Centri medio congrueret, eum tali situ nec comedere, nec bibere posse, cum enim totum reliquum corpus inversum esset, ac sursum respiceret, nihil cibi aut potûs trajicere posset in ventriculum, donec os ejus à Centro esset remotius.

Infertur VII. Ignem, aquam, arenam, & omnia liquida in Centro mox in sphaeram esse conformanda, imò si semen alicujus plantæ projiceretur in centrum Terræ, eam quâversus in formam radiosæ stellæ efflorescere, uti ex natura Centri cuiusvis facile patebit.

Infertur VIII. Superficiem aquæ consistentis semper esse sphaericam, in exiguis
men

men vasis censendam esse Horizonti parallelam. Hinc autem ulterius


Infertur IX. Aquam connaturaliter, & seclusâ virtute pressivâ, nunquam ascendere ad locum altiore suâ origine; ex quo denud

Infertur X. Si scire cupias, an aqua ex monte v. g. proximo absque speciali machina per canalem dirigi possit ad locum desideratum, statue ibi vas vitreum quocunque humore repletum, & secundum lineam superficiei liquoris in vase stagnantis respice ad locum originis aquæ, & siquidem iste conspiciatur esse altior dictâ lineâ superficiali, evidens erit posse aquam inde dirigi ad locum vasis consistentis; si autem inferior appareat, non posse.

Restat, ut etiam de *Pendulis*, motu naturali Centrum petentibus, ac vi impulsûs ab eodem tam diu iterum recedentibus, donec oscillationibus continuò decrescentibus, tandem in Linea directionis quiescant, eorûmque naturâ ac utilitate breviter dicamus. De his itaque

Notandum I. *Pendulum* seu *Perpendiculum* ex E. non currere usque in ultimum semicirculi punctum O. sed solum in N. quia non esset ratio, cur ex O. non recurreret in E; & sic motus Penduli esset perpetuus.

No-



Notandum II. omnes oscillationes , seu excursus & recursus Penduli, siue majores , siue minores , æquali tempore perfici; & hinc Pendulum ex E. decurrens in N. pari temporis intervallo recurrit in F. & hinc in M. & ex M. in G. &c. donec tandem quiescat in Linea directionis AB. Quod enim in arcu majori ex E. in N. velocitate motûs acquirit , hoc in minore ex N. in F. suo decremento deperdit; pater enim experienciâ, Pendulum intra quadrantem v.g. æquales numerò oscillationes perficere, siue major, siue minor illi imprimatur impulsus.

Notandum III. Pendula longiora tardius suos arcus perficere, quàm breviora, æqualia verò æqualiter; quia longiora describunt circulum majorem, adeoque majus etiam insumunt tempus, uti denuò constat experien-

F

tiâ;

tiâ; sic enim Perpendiculara in Horologijs Anglicanis longiora tardiùs oscillationes suas faciunt, quàm breviora Horologiorû nostratûm.

Ut autem etiam utilitates Pendulorum breviter insinuemus, serviunt ea

I. *Ad regulandos motus Horologiorum*, uti à quotidianâ habemus experienciâ.

II. *Servit etiam Architectis*, muros suos, & ædificia ad amussim ordinantibus.

III. *In Astronomia* ad perfectè mensurandum tempus ac Siderum motus; si enim ab experientia habeo, Pendulum aliquod intra quadrantem v. g. 1200. oscillationes facere, facile erit judicare, illud peractis 4800. oscillationibus integram horam insumpsisse: prout etiam Merfennus observavit; Pendulum $3\frac{1}{2}$ pedum cursu, recursûque suo tempus unius minuti secundi præcisè explere.

IV. *In arte Medica*: Nam una vibratio Penduli 5. digitorum & paulò plùs, exactiori pulsui arteriæ, teste Joanne Marco Marci celebri Medico, perfectè respouder; imò haud difficile erit, parvulam machinam construere, mediante quâ Perpendicularum, filum remittendo, prolongari, vel attrahendo, abbreviari, & ubi pulsui infirmi suâ vibratione congruere compertum fuerit, firmari queat, hâc enim ratione, alterâ v. g. die major celerit.

leritas aut tarditas pullûs ad oculum patebit.

V. Voluerunt nonnulli ex Modernis, usum Penduli servire etiam posse in *Geographia*, ad locorum longitudes iuvestigandas, si ab experientia v. g. scio, illud intra horam mille vibrationes conficere, & in puncto discessûs navis versûs Orientem, vel Occidentem (notatâ horâ discessûs) numerare incipiam, & inueniam vibrationes 2000. vel 3000. &c. colligere facîle possum, navim à portu jam duabus vel tribus horis abesse. Sed quia praxis hæc supponit, navim semper æqualiter, & quidem viâ rectâ versûs Orientem moveri, inconstanti valdè nititur fundamento, & ipse motus, vel impulsus navis, si non sistere, saltem aliquialiter impedire poterit curso - recursum Penduli, eritque negotium hoc ob clamores ac tumultus nautarum continuos summè tædiosum, ac innumeris erroribus obnoxium.

VI. Feliciorem autem usum habet Pendulum in *Geometria* in ordine ad altitudines rerum per illud metiendas. Sit v. g. chorda, cui lampas alligata per tholum deducatur in inferiorem templi partem, & desideret quispiam scire altitudinem tholi à Terra. Instrûctum priûs habeas oportet filum unius pedis cum plumbo; quo comparato sic operare.

Nota, quot vibrationes chorda unius pedis faciat, dum altera longior agitata unam vibrationem facit, & invenio v. g. minorem chordam unius pedis octies currere ac recurrere, dum longior semel currit, & recurrit. Octo itaque vibrationes in se duces, id est, quadrabis, & habebis 64. altitudinem tholi usque ad lampadem, quibus si addas altitudinem à termino chordæ usque ad pavimentum, habebis totam altitudinem tholi à Terra. Ex quo facile etiam erit divinare, quot vibrationes faciat chorda pedalis, usque dum chorda 36. v. g. pedum unam faciat; si enim ex hoc numero extrahas radicem quadratam, invenies 6. vibrationes.

VII. Potest Perpendicularum etiam habere usum *Steganographicum* in ordine ad occultè alteri loquendum. Ponamus enim duos amicos æqualibus perpendicularis instructos, conficere sibi clavim ex certis numeris, ita ut v. g. 10. vibrationes significant hostium adventum, 20. liberationem è carcere, 30. prodicionem futuram &c. Si ergò unus sit v. g. arci, turri aut carceri inclusus, alter verò in sua arce vel domo, ita tamen, ut ad se invicem per fenestram prospicere possint, & unus alteri loqui desideret, strophio. lō vel alio quovis modo signum det oportet, cui etiam alter, si adverterit, respondebit,

ut appareat illum esse attentum; cum ambo agitantur sua Perpendiculara, & numerabunt vibrationes, absolutò verò numerò mysteriorum revelandi, loquens denuò det signum, ut alter sciat, numerum esse completum. Eadem etiam ratione alter poterit respondere &c. sed praxis dabit plura.

Denique cum motus chordarum in Instrumentis musicis eadem prorsus ratione se habeat, quàm Pendulorum motus, patet, illum etiam in *Musica* locum habere, imò totius artificij musici basin ac fundamentum esse, prout duobus tomis benè magnis explicat Kircherus in sua *Musurgia*, quò proinde plura scire volentem remitto. Et hæc de Centro Mundi, ac Lineæ centralis directione dicta sufficiant, Nunc de Axe mundi agendum.

Axis nomine intelligitur Linea recta, per Centrum Terræ ab uno mundi Cardine, seu Polo ad alterum imaginariè ducta, totius mundi Diameter, circa quam universa Cælorum Machina rotatur. Qua in re juxta hodiernam Lynceorum observationem ex mundo subterraneo Kircheri tom. 1. lib. 2. c. 17. sciendum est, divinam providentiam omnia Corpora cælestia ita Telluri adaptasse, ut sicut hæc Axi & Poli mundi immobiliter congruit, ita Poli & Axis omnium Corporum

rum coelestium circa Terram gyrantium hujus Axi & Polis perfectè semper responderent, situmque suum ex Austro in Septentrionem sibi à natura inditum, juxta situm Terræ ac Mundi inviolabiliter servarent. Notatum enim est, teste Kircherò, conformiter ijs, quæ in suo Itinere Extatico hac de re fusè pertractat, Planetas ac Stellæ omnes Terræ ita conformari, ut quos Circulos & Polos in Terreno globo nobis imaginamur, eosdem in omnibus & singulis Siderum globis expressos intelligamus, hoc solo discrimine, quòd in Terra immobili immobiles, in Sideribus verò circa proprium Centrum agitatæ mobiles comperiantur, prout universa Mundanorum Corporum symmetria, motuum eorundem analogia, ac sese mutuò fovendi necessitas postulabat, ut sic Terra immobilis Solis ac reliquarum Stellarum influxu æqualiter gaudeat; quod enim in Zona Torrida perpetuum eidem æquinoctium tribuit, hoc in Zona Temperata inæqualitas dierum & noctium, ac perpetua anni temporum vicissitudo, imò in ipsâ etiam Zonâ Frigidâ seu Suppolarî semiannuæ Solis suprâ Horizontem præsentia, & æqualis subtrus eundem absentia compensat. Dum econtrâ si Terræ ac Stellis libera esset evagandi, sèque pro lubitu situandi facultas, modò amicis, modò con-

trarijs Polis, modò transversis Axibus se invicem respicerent, sicque necessario communis rerum confusio & exitium sequeretur. Hinc tam Terræ (vi suæ gravitatis in Centro firmatæ) quàm cæterorum Siderum corporibus, ad adimendam hanc exitialem evagandi libertatem, commune frænum ac unanimis, inditum sibi situm ex Austro in Boream servandi necessitas imponi debebat, quam vim directivam Noto-Boream, virtutem Magnetica, Terræ ac omnibus globis Cælestibus communem esse contendimus. Exinde autem ansam sumimus, de stupendâ illâ omnibus quidem passim notâ sed nulli satis perspectâ *Magnetis virtute*, ejusque ad Polos mundi conversione breviter differendi.

Color illius ordinariè est ferè similis ferro, quod non solum attrahit, sed & attractum tam fortiter retinet, ut Schottus part. 4. suæ Magiæ naturalis lib. 3. c. 1. referat, P. Carolum du Lieu ex eadem Societate Lugduni Magnetem habuisse formatum 5. librarum, qui ferrum secundum longitudinem sibi è longinquo applicatum tantâ vi ad se rapuit, ut duo vel tres viri vix illud retinere, semel autem ipsi agglutinatam decem aut plures haud amplius (saltem perpendiculariter) abstrahere valuerint, ita ut indubiè virum etiam cataphratum ferro appensum tenuisset. Præter-

reà non solùm ferrum trahit (etiam interpositò lignò, lapide, argentò, librò benè magnò &c. interpositò autem ferrò nullus sequitur effectus, quia virtus illius dissipatur), sed illi per attractum, aut valde propinquam applicationem, insuper cōmunicat virtutem trahendi aliud ferrum, ita ut unus annulus v. g. trahat alium, iste denuò tertium, quartum, quintum &c. catenæ instar, plures vel pauciores pro diversitate virtutis ejusdem; unde quis istam vim lapidis non obstupesceret, exclamat S. P. Augustinus lib. 21. de Civit. c. 4. ubi etiam ait, legisse se, quòd quando juxta Magnetem ponitur adamas, non rapiat ferrum, vel raptum dimittat. Illud saltem experiencià constat, quòd Magnes, cui agglutinatum est ferrum, si illi applicetur alius, præsertim fortior, illud ocyùs dimittat, cùm alter Magnes illi adhuc sit magis amicus, quàm ferrum. Trahit etiam alterum Magnetem, si conjungantur Poli amici (hoc est, Meridionalis cum Septentrionali) secùs verò repellit, ut apparet in lingulis magneticis, quæ, si illis obvertatur Polus amicus, accurrunt, secùs verò fugiunt. Magnes major non armatus, rarò sustinet pondus majus, quàm præmet habeat, dum econtrà parvus subinde 18. vicibus majus pondus levet seispo. Interim major in instanti adimit minori vires su-


as, quas tamen intrà biduum vel triduum denuò recuperat.

De ista virtute attractiva adhuc observo I. eam conservari, relinquendo ei liberam facultatem se situandi ad Polos mundi, absque hoc enim situ ponitur in statu violento, qui cujusvis rei tandem est destructivus. II. Si prædicto situ connaturali servato in limatura ferrea, aut chalybea ponatur, quia ejusmodi ramenta vires ab eo acceptas in ipsum denuò reflectunt, ac radios in ipsum amicos vibrant. III. Si panno rubro involvatur, ac in dicto situ connaturali collocetur; quia nimirum herbæ, ex quibus tingi solet, supra mineras ferreas crescunt, & ab his amicas qualitates, tanquam gratum Magnetis pabulum hauriunt. Econtrà IV. compertum est, calorem & ignem esse virtutis magneticæ dissipativum ac inimicum. V. Si lingula magnetica incurvetur, vel incurvata denuò rectificetur, adeoque situm mutet, virtutem perdit. VI. validissimos Magnetes in Europa asportari potissimum ex Norwegia. Denique Virtus tractiva Magnetis incredibiliter augetur, accedente suâ armaturâ ferreâ, aut chalybeâ, de qua postea.

Quantum ad Directionem Magnetis, si frusto ligneo v. g. suberis in formam globi aut navis efformato Magnes imponatur, &

in aqua quiescente in pelvi liberè natare permittatur, hinc inde fluctuare videbitur, donec unâ sui parte Austrum, alterâ Boream respiciat. Hinc autem infertur I. in quovis Magnete, & in omni ejus frusto, duo dari puncta seu Polos, quorum unus dicitur Borealis, qui Boream, alter Australis, qui Austrum respicit. II. Magnes in formam Sphæræ elaboratus vocatur *Terrella* ob similitudinem cum globo Terreo quoad formam ac proprietates magneticas; unde lineam, quæ dictos Polos connectit, appellant Axem Magneteris, circulum verò ab utroque Polo æquidistantem vocant *Æquatore*, ac circulos per Polos & Centrum ductos, ejusdem Meridianos. III. Hanc virtutem directivam Magnes communicat etiam ferro, ut patet in lingulis magneticis. IV. Dicunt, si Magnes secundùm Axim à Polo ad Polum perforetur, & stylus longus ex optimo chalybe ei indatur, stylum hunc decuplò efficacius trahere ferrum, quàm cum armatura communi; ego tamen parcerem Magneti bono, si quem haberem, ob praxin incertam. V. Quod refert Plinius de Æthiopico lapide Theamede ferrum à se repellente, fabulosum est, si de ferro nulla virtute Magneticâ imbuta loquatur; secus

autem verum quidem est, si Poli inimici jungantur, sed nihil novi dicit, cum hoc sit cuiusvis Magneti commune.



VI. Sit in Magnete proposito Axis AB. Æquator CD. Item A. Polus Boreus, B verò Austrinus; si bissecetur secundum Æquatorem CD. erit in uno frusto E.

Polus Austrinus, in altero autem F. Polus Boreus, reliquis Polis in priori suo statu permanentibus. Quod si bissecetur per Axem AB. utrumque segmentum acquireret novos Polos prope GH. & IK.

De Declinatione ac Inclinatione Magnetis sequentia notanda sunt. I. Licet Magnetes ac Versoria unâ sui parte Austrum, alterâ Boream respiciant, rarissimè tamen (solâ ferè Insulâ Flandricâ Corvo dictâ, exceptâ.) Lineæ Meridianæ, vel Axi Mundi perfectè congruunt, sed deviant nonnihil, ac declinant versùs Orientem vel Occidentem, & hoc non tantùm in diversis locis, sed successivè etiam in eodem loco; cujus causa
{ teste

(teste Kircherō de Arte Magnetica l. 2. parte 5. ubi integrum catalogum Declinationum Magneticarum in varijs Europæ locis adstruit) esse potest notabilis mutatio ac deviatio venarum Magneticarum intra Terræ viscera latentium , ortam vel ex terræ motu , vel vehementiâ ignium subterraneorum. II. Experimentiâ constat , si Versorium adhuc inerme super obelum suum æquibretur , ita ut Horizonti perfectè sit parallelum , post legitimam tamen affriktionem Magnetis in hac nostra Sphæra obliqua partem Septentrionalem ocyùs dèprimi infrà Horizontem physicum versùs Polum Terræ Septentrionalem , parte oppositâ supra eundem Horizontem elevatâ ; unde periti artifices solent partem Australem priùs ponderosiorē facere , ut accedente virtute imbibitâ Magnetis perfectè æquibretur. Et hæc quidem Inclinatiō Magnetis , quò magis locus aliquis ab Æquatore recedit versùs alterum Polum , eò erit major , non tamen servatâ tam exactâ proportionē incrementi , ut exinde ubivis locorum vera ejus Latitudo crui possit , uti aliqui perperam voluere. Varia de reliquo experimenta & paradoxa invenies in parte IV. Magiæ naturalis Schotti Lib. 3. Syntagma 3. c. 2.

Cæterum Polos Magnetis inveniendi optimus videtur modus, si frustulum acûs chalybeæ, vel tenuis fili ferrei super Lapidem huc atque illuc circumducas, donec erigatur, & ubi perpendiculariter erectum steterit, ibi erit unus Polorum, & sic facillimè etiam inuenies alterum ex partè opposita. His jam inventis ad debitam figuram reducendus est Magnes, circa quam obiter noto sequentia. I. Figuram Parallelopipedam, seu quadrato-oblongam esse ferè commodissimam, postea Cubicam & Ovalem; imò etiam Sphæricam seu Terrellam in ordine ad multas experientias perutilem inveniri. II. Magnetem quoad figuram ita esse accommodandum, ut duo plana Polos ejusdem terminantia sint Axi, quantum fieri potest, perfectè perpendicularia sibi que invicem parallela; aliàs enim radij Magnetis nonnisi obliquè, adeoque minùs efficaciter incident & agent in plana. III. Axis quò longior relinqui potest, eò erit melior. IV. Si Sphærica Figura Magneti danda est, nulla antecedenter Polorum ratio habenda, sed hi postea primùm investigandi erunt, modo, quo suprà. V. Figurâ desideratâ debitè obtentâ Magnes perfectè applanandus ac poliendus erit. VI. Denique robur Magneti

ris ex virtute ejusdem attractivâ, ex majore Sphæra activitatis, & vel maximè ex homogeneitate ejusdem, si nimirum non multas particulas alienas, quæ radijs Magneticis transire adimere possint, admixtas habeat.

Armatura Magnetem mirè corroborat, ita ut armatus, teste Nicolao Bion l. 3. c. 2. subinde 150. vicibus plùs trahat ac præstet, quàm inermis; quia nimirum radij è Polo Magnetis præcipuè diffusi à medio laminæ ad ejus extremitates divergunt, & inde ad ferrum applicatum ex omni parte coeunt, sicque vis unita fit fortior, ubi observandum


I. Armaturam istam potissimum consistere in duabus laminis, nec nimis tenuibus, si Magnes sit fortis, cum aliàs totum illius effluvium satis capere non possent; nec nimium densis, si Magnes sit debilis, ne tota vis Magnetica à proximis laminæ partibus absorbeatur.

II. laminas istas debere fieri ex optimo chalybe indurato, quia nimirum copiosiores habet poros, quàm ferrum.

III. Debent hæ laminæ in extremitate geminos habere pedunculos quadratos æqualis altitudinis, sibi que in una linea recta perfectè correspondentes, ac laminis ipsis proportionatè densiores, latitudinis verò tantæ, ut de axe Magnetis duas ferè tertias ob-

te.


regant. IV. Debent in - & extrinsecus esse politæ, & Polis AB. seu Planis Magnetis undique perfectè congruentes, V. Debent cingulo æneo CC. constringi, ut Magneti



tantò arctius ex omni parte applicentur. Similiter VI. imponenda est superius alia lamina ænea, quæ armaturam in D D. contineat, cum annulo in medio, qui Magnetem in æqui-

librio suspensum teneat. Denique additur adhuc alia pars chalybea EE. proportionatæ magnitudinis ac formæ, ut in Figura videre est, cui inferius inferitur uncus liberè mobilis, pro appendendis ac sustinendis ponderibus: hæc autem pars chalybea debet pariter esse bene polita secundum lineam rectam, ut pedunculi armaturæ tantò exactius illi insistere possint.


Quoad armaturâ Magnetis Sphærici fiant ex chalybe duo concava justæ densitatis, convexitati Magnetis, ejusque Polis perfectè congru-



gruentia, superius clausa in FF. cum anulo, & inferius circa pedunculos cingulo quodam æneo cincta in GG. Reliqua dabit Figura, & sunt sicut in alijs suprâ.

Verforia verò animantur hoc modo. Lingula seu acus magnetica ad Polum Magnetis (contrarium tamen, hoc est, Austrinum, si illa pars acûs Boream respicere debet) ab ejus medio versùs extremitatem ter vel quater leniter ac lentè adfricatur; alij verò id ipsum faciunt unico non iterato tractu, & in fine continuant attractum acûs cum Magnete per unum & alterum horæ minutum, ut per hanc moram virtus Magnetica tantò perfectiùs imbibatur. Cavendum tamen, ne reducatùr verforium à cuspide versùs medium, aliàs enim virtus imbibita denuò destruetur. Cæterùm quò longius est Verforium, eò magnes debet esse robustior, ac major ejusdem Sphæra activitatis; quantum

rumvis tamen Magnes sit robustus, vibratio Verforij majoris semper erit minor, quàm vibratio Verforij minoris. Quòd si Verforium tractu temporis debile inveniatur, novaque affricatione opus sit, igne prius purgandum, sicque omni sua virtute privandum, ac tum primum de novo affricandum erit.



Potest etiam Magnes confici per artem; si enim fiant laminæ chalybeæ æqualis penitus magnitudinis, numero viginti vel triginta, longitudinis circiter 10. digitorum, latitudinis verò unius digiti, ac densitatis octavæ partis unius digiti ad summum, hæ, inquam, ad validum Magnetem adfrictæ, si sibi invicem secundum eosdem Polos impositæ, ita ut rectangulum parallelopipedon efficiant, quatuor cingulis æneis in HHHH. arctè constringantur, ipsisque chalybea ar-

matura convenientis magnitudinis, ut *suprà*, applicetur, cujus pedunculi duos circiter digitos lati inveniantur, ac reliquis *superiùs* ac *inferiùs* armati Magnetis partibus instruantur, eandem cum Magnete naturali efficaciam in ordine ad varia experimenta ostendent. Ex innumeris autem, quæ per Magnetes exhiberi possunt, aliqua solum in medium proferamus.

I. Si frustula minuta tenuioris fili ferri imponantur chartæ, vel tabulæ vitreæ, æneæ, aut ligneæ, ac unus Polorum Magnetis subrùs ipsis obvertatur, ocyùs erigentur, si verò alter Polus ipsis ostendatur, totaliter inversæ alterâ sui extremitate tabulæ insistent, si verò *Æquatorem*, seu latus Magnetis applices, mox prostratæ jacebunt. Similiter possunt II. effigiari parvuli milites ejusmodi frustulis fili ferrei, vel acûs instructi, ac duobus Magnetibus diversimodè applicatis effici, ut una eorum acies invadat alteram, ista fugiat, altera insequatur, illa stet, ista cadat &c. III. Eodem artificio formari possunt pisciculi, anates, cygni & similia aquatilia, cùmque ipsis in pelvi vel catino aquâ repleto non minùs varia ludicra institui, prout vel manum applicanti patebit. IV. Possunt varia horologia & astrolabia magnetica construi, eorùmque v. g. lim-

limbo horario occultè validus magnes includi, ad quem proinde pisciculus in aqua hamo chalybeo instructus accurret, vel columba Architæ filo suspensa advolabit, sicque horam, aut locum Solis designabit. Pari modo potest centro horologij, cujus limbus horarius circumrotetur, imponi Versorium Magneticum, in Stellæ v. g. aut Cometæ caudari, vel quamcunque aliam figuram efformatum, ac æquilibratum, & horologium ita situari, ut Versorium lineâ vel caudâ suâ horæ veræ exactè congruat, sic enim situm suum constanter servans, eam perpetuò monstrabit. V. Variæ historiæ eâdem arte exhiberi possunt, v. g. Christus super aquas incedens, & Petro periclitanti suppetias ferens; Jonas à pisce absorptus, Saul Davidem lanceâ petens, sed aberrans &c. VI. Denique valde curiosum est, si Magnetis sphaerici alterutri Polo deorsum verso applices rotulam æneam levissimam, stylo chalybeo perpendiculari instructam, eamque circumagas, pendebit hæc à Magnete, simulque per dimidiam horam, vel horæ quadrantem continuò gyra-bitur, cum tamen super plano vix horæ minutò circumagatur, quia nimirum cupide styli suspensa à Magnete, nullum invenit contrarium, quod impetum infringat,

sicut tamen super plano, suomet pondere
versus latera nutat. Imò si validus est lapis,
poterit secunda rotula suspendi à prima, &
tertia à secunda, inque partes adversas ju-
cundissimo spectaculo gyrari. Plura habet
Kircherus in sua Arte Magnetica, & suum
cuique suggeret ingenium.

Jam ad Polos mundi in titulo propositos
redeundo, licet ex dictis jam aliquammodo in-
notescere possint, de his tamen obiter noto
sequentia. I. Polos, circa quos tota mundi
machina circumvolvitur, Latinis propterea
Vertices seu *Cardines* dici, quorum unus à no-
bis conspicuus à proximo Ursæ Sidere *Ar-
cticus*, alter verò oppositus, & infra hæmi-
sphærium nostrum latens, *Antarcticus*
appellatur. II. Polus Arcticus vocatur etiam
Borealis, & *Aquilonaris* à Borea sive Aquilone
vento, qui ab illa plaga spirat, atque etiam
Septentrionalis à septem Stellis Ursæ præ-
fatæ constellationem efformantibus. III. Po-
lus Antarcticus communiter etiam dicitur
Meridionalis, à plaga Mundi sibi correspon-
dente, vel etiam *Australis*, à vento inde flan-
te. IV. Poli tamen isti non sunt puncta vi-
sibilia; nihilominus stella extrema in cauda
Ursæ minoris nominatur *Stella Polaris*, quia
Polo est proxima, & vix $2\frac{1}{2}$ gradibus di-
stat;

stat; unde etiam minimum circulum circa Polum describit, libero oculo vix discernibilem. V. Polum Antarcticum nautis deregunt quatuor Stellæ eidem propinquæ, in modum crucis situatæ. VI. Quamvis singuli cujuscunque sphaeræ circuli duos intelligantur habere Polos (de quibus postea incidenter mentionem faciemus) Polorum tamen nomine absolute & autonomaticè veniunt soli duo Poli prædicti, utpote circa quos immobiliter consistentes, quæcunque Sphaeræ 24. horarum spatio raptu Primi Mobilis rotantur. In Terra, utpote immobili, dicet hujusmodi *Vertices* seu *Cardines* non duntur, sicut tamen, ut ex dictis constat, Axis suo ac reliquis Circulis imaginarijs Axis mundi ac Circulis Cælestibus perfectè respondet, ita puncta Axim Terrestrem imaginarium utrinque terminantia, ac Polis Cælestibus substantia, *Poli Terrestres* intelligendi erunt; unde etiam Terræ illis confines *Subpolares* dicuntur, quæ spatio semestri diem continuū, sicut & noctem subsequenter æqualem habent; cum enim Æquator ejusdem perfectè intermediet, eisque Horizontis locò serviat, Solem sex Signa supra, ac totidem infra Horizontem percurrere necesse est. Creduntur tamen inhabitabiles, & mari ac

fretis undique cingi, circa quas illud memorabile, quod ex Atlante Novo refert Zahn in sua Oeconomia mundi mirabili Tom. 2. scrut. 4. disquis. l. c. 2. §. 5. ex unanimi narratione Nautarum ad Spizenbergam piscationi balenarum vacantium haberi, nullam videlicet navim Boream versus ultra 82. Latitudinis gradum progressam rediisse, lincresque incautiùs per dictos districtus divagatos nunquam amplius comparuisse; mare etiam ex monte proruens omnia secum rapere, manifesto satis indicio, esse sub Polo, vel in ejusdem vicinia voraginem immensam, per quam aqua aquam trahens una cum navibus innatantibus irresistibili vehementia absorbeatur, quæque per subterraneos deinde meatus procurrens tandem in alterâ parte Suppolari oppositâ regurgitetur. Propterea etiam Idem ibidem n. 3. ex Herrera in hist. Americæ Australis, refert, Classem maritimam Regio Consilio ad detegendas Regiones Australes expeditam versus Polum Antarcticum ultra LXX. Latitudinis gradum procedere non potuisse, ob aquarum nimium, aëre etiam penitus tranquillo, ipsæ perpetuò obviâ irruentium rapiditatem; quam ipsam invincibilem aquarum resistantiam experti etiam sunt Hollandi Baraviæ novæ incolæ, iter illud iteratò sæpiùs, sed irritò

rito semper conatu, prosequi minimè valentes.

In Planisphærio Poli sunt puncta extrema Axis, seu rectæ per centrum mundi ductæ, & Parallelos, signorum ad angulos rectos secantis. Ubi pro faciliore dicendorum intelligentia notandum, Circulos in Planisphærio nostro plerumque meris lineis rectis repræsentari, quales v. g. apparent annuli vel armillæ, si eas rectà aspiciamus, de quorum singulis nunc breviter agendum.

C A P U T IV.


De Sphæra Circulis.

Dividuntur I. ratione quantitatis in *Majores*, qui idem cum mundo centrum habent, Sphæramque secant in duas partes æquales, ut Æquator, Zodiacus, Horizon, Meridianus, & duo Coluri; ac *Minores*, qui Sphæram dividunt in partes inæquales, ut ambo Tropici & Polares cum reliquis Parallelis. II. Dividuntur ratione sitûs in *Rectos*, qui cum Æquatore faciunt angulos rectos, ut duo Coluri, Meridianus, & Horizon rectus; item in *Obliquos*, qui Æquatorem secant ad angulos obliquos, ut Zodiacus, & Horizon obliquus; ac denique in *Parallelos*, seu æquiter inter se distantes, uti sunt Æqua-

tor, Tropici, & Polares. III. Ratione motûs alij dicuntur *mobiles* seu *intrinseci*, qui in ipsa Sphæra sunt descripti; & in Planisphærio unacum Sphæra gyrari intelliguntur, ut Æquator, Zodiacus, Coluri, Tropici, & Polares; alij *immobiles* seu *extrinseci*, qui morâ Sphærâ, manent immoti, ut Horizon & Meridianus. De singulis jam speciatim agemus.

Horizon

Latinè *Finitor* dicitur, qui partem mundi conspectam finit, seu hemisphærium superius dirimit ab inferiore inconspetto. *Horizon* alius dicitur *Rationalis*, qui soli intelligentiâ percipitur pertingere usque ad Firmamentum, & dividit Sphæram in duas partes æquales, nimirum in superiorem conspicuam, & inferiorem latentem. Alius verò vocatur *Sensibilis* seu *Visualis*, qui sensu visûs percipitur ac terminatur, qui licet respectu oculi in superficie Terræ constituti sit diversus à Rationali, respectu Cœli tamen Terra cum tota sua superficie puncti rationem haber, uti superius jam insinuavimus. Sic si Terra ponatur esse A. Primum Mobile seu Firmamentum BGCH, Horizon Ratio-

Fig.^a 1.

nalis erit BC. & sensibilis DE. ubi apparer, duos Horizontes BC. & DE. semidiametro Terræ AF. à se invicem distare, quæ quidem distantia respectu Cœli intensibilis est, ut dictum, cum etiam in superficie Terræ simul videantur duæ Stellæ diametraliter oppositæ, quales ferè sunt Oculus Tauri, & Cor Scorpionis. Quæcunque ergo de Orru & Occasu

Stellarum dicuntur, ad Horizontem *Rationalem* referenda sunt; *Horizontis Visibilis* verò diameter, teste Cluverio l. 1. c. 3. ultra 5 $\frac{1}{2}$. Mill. Germ. se non extendere judicatur, licet Ozanam celebris Professor Parisiensis in 1. parte suæ Geographiæ c. 1. unum Horizontem notabiliter diversum ab alio ad 20. vel 25. Leucas marinas, seu 15. vel 19. ferè Milliarum Germanica extendat.

Præterea Horizon aliis vocatur *Rectus*, qui per mundi Polos transiens verticem habet sub Æquatore, cumque ad angulos rectos intersectat, ut in Fig. II. *Obliquus*, qualis est noster, dicitur, qui Æquatorem ad angulos obliquos secatur, uno Polorum sursum elevato, altero deorsum depresso, ut in Fig. III. ac denique Horizon *Parallelus* vocatur, qui cum Æquatore coincidit, ubi sex Signa Zodiaci sunt supra, & sex infra Horizontem, ut in Fig. IV. unde etiam Sphæra ob triplicem hunc situm triplex est, nim. *Recta*, *Obliqua*, & *Parallelata*, ut ex præcedentibus tribus Figuris liquet.

Porro Horizon, sicut quivis alius Sphærae Circulus, duos habet Polos, quorum unus perpendiculariter vertici nostro incumbit, & vocatur *Zenith*, quale est punctum G. in Fig. I. alter verò Polus è diametro oppositus H. dicitur *Nadir*, qui Antipodum cervicis

Fig. 2^a



Fig. 3^{ia}





Fig. 4^{ta}



vicibus incumbit, respectu quorum est Zenith; unde mutando locum, semper etiam mutamus Horizontem: differentia tamen locorum non censetur esse notabilis, nisi ad distantiam 20. vel 25. leucarum, seu 15. circiter milliarium Germ. communium.

Officia autem Horizontis sunt I. Superius Hemisphærium ab inferiore distinguere. II. Stellæ semper apparentes à nunquam conspicuis discernere. III. Monstrat Altitudinem Poli & Æquatoris; imò cujuscunque Sideris, quæ nihil aliud est, quàm arcus verticalis talis Sideris, inter istud & Horizontem interceptus, cujus complementum erit distantia Sideris à Zenith. IV. Exhibet Ortum & Occasum Stellarum, qui triplex est, Cosmicus, Achronicus, & Heliacus. Ortus vel Occasus Sideris *Cosmicus* seu *mundanus* dicitur, qui contingit Sole Oriente; *Achronicus* seu *Vespertinus*, qui fit Sole Occidente; ac denique Ortus *Heliacus*, quando Stella sub radijs Solis latens incipit conspici in Oriente, vel Occasus *Heliacus*, quando prius conspicua, sub iisdem incipit occultari. V. Constituit triplicem Sphæram pro diversa ad Æquatorem habitudine, nim. Rectam, Obliquam, & Parallelam, uti supra insinuavimus. VI. Determinat quantitatem dierum artificialium, & noctium, æqua-


lem

lem semper in Sphæra Recta, inæqualem in Obliqua, ac semiannuam in Parallela. VII. Amplitudinem ortivam vel occiduam Solis, ac Stellarum, quæ nihil aliud est, quàm distantia Ortûs Sideris à puncto Ortûs Æquinoctialis, seu à puncto H. 6. Æquinoctiali. Denique ostendit etiam Crepusculum matutinum, quod incipit, quando Sol attingit decimumoctavum gradum infra Horizontem, & finitur in ejus Ortu; & vespertinum, quod ex opposito incipit in ejus Occasu, ac finitur, quando deprimitur 18. gradibus infra Horizontem, saltem in Zona temperata. In Terra nullus stabilis est Horizon.

In Planisphærio Horizontem repræsentat filum Regulæ æneæ, asteriscis (ubi graduum numeratio incipit) applicatum, in quo situ omnia superiùs dicta demonstrat, ut infra ex instituto ostendemus.

Æquator

Est circulus ab utroque Polo æqualiter, id est, utrinque 90. gradibus distans, dividens Sphæram in duas partes æquales, nim. Septentrionalem, & Meridionalem; quem cum Sol attingit, ubique terrarum fit
Æqui-



æquinoctium, in principio ∇ . quidem *Vernum*.
 initio \sqcap verò *Autumnale*; unde etiam *Circulus*
Æquinoctialis vocatur. Hoc ipso autem,
 quòd *Axis mundi* & *Æquator* sibi invicem
 ad angulos rectos opponantur, *Altitudo* *Æ-*
quatoris semper est complementum *Altitudi-*
nis Poli, & complementum *Altitudinis* *Æ-*
quatoris est distantia ejusdem à puncto ver-
 tica.

ticali Zenith G. quæ vocatur *Latitudo*, unde etiam hæc semper est æqualis *Altitudini Poli*,

Cæterum præter prædicta munia *Æquator* I. servit pro mensura *Motûs Primi*; quoties enim 15. gradus *Æquatoris* ascendunt supra *Horizontem*, toties una hora est absoluta. II. Est mensura *Zodiaci*, de quo postea. III. Est regula *Dierum & Noctium*. IV. Est mensura *Declinationis Eclipticæ & Siderum*. V. imò & *Ascensionis Rectæ, Obliquæ, & differentię Ascensionalis*. VI. Intersecat *Horizontem* in punctis *Ortûs & Occasûs æquinoctialis*; sicut *Meridianus* eum secat in punctis *Meridiei, & medię Noctis*, seu quod idem est, *Æquator* secat *Horizontem* in puncto horæ VI. sicut *Meridianus* in puncto horæ XII Denique non solum *Astronomiæ* servit in ordine ad prædicta mensuranda, ac determinanda, sed etiam *Gnomonicæ* in ordine ad innumera horologia cujunque plano inscribenda; imò & *Geographiæ* ad locorum *Latitudines ac Longitudines* investigandas.

In *Planisphærio* per lineam *Axi* perpendicularem in totidem gradus distinctam representatur, ac denique in Fig. V. præcedente exprimitur per lineam *QR. Axi DE.*

per-

perpendiculararem, ex qua plura ex jam dictis & adhuc dicendis colligi poterunt.

Zodiacus & Ecliptica.

Z*odiacus*, juxta Fig. V. est Circulus major IK, bifariam sectus ab Æquatore in punctis V & \cap quæ repræsentativè ex utraque parte coincidunt in A, & utrumque Tropicum tangens in punctis solstitialibus I. & K. seu \odot . & p . unde cum isti etiam declinat ab Æquatore 23. grad. & 30. minutis. Ratione latitudinis dividitur *Zodiacus* in tres circulos parallelos, quorum duo exteriores juxta quosdam à se invicem 16. juxta alios ferè gradibus 20. à medio autem quilibet eorum 8. vel 10. circiter gradibus distat, intra quos reliqui Planetæ divagantur; medius verò *Zodiaci* Circulus, sub quo Sol perpetuò incedit, *Ecliptica* appellatur, eò quòd in ipsa, vel prope ipsam contingant Eclipses.

Dividitur autem *Zodiacus* in 12. partes seu Signa, quorum quodlibet 20. gradus continet, eorundemque nomina & characteres his versibus exprimi solent:

Sunt

♈. ♉. ♊. ♋. ♌. ♍.

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,

♎. ♏. ♐. ♑.

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Capri,

♒. ♓.

Amphora, Pisces. Priora 6: Signa sunt Bo-
realia, utpote in hemisphærio Septentrio-
nali sita, posteriora 6. verò Australia, seu
Meridionalia. Similiter ista 6. Signa ♋. ♌. ♍.
♎. ♏. ♐. vocantur *Ascendentia*, seu

Semicirculus ascendens, quia Sol percurrente
hæc Signa ascendit, ac vertici nostro seu Ze-
nith magis appropinquat; ista verò 6. Signa
♉. ♊. ♋. ♌. ♍. ♎. sunt *Descendentia*,
& constituunt *Semicirculum descendentem*, quia
per illa Sol descendit versus Nadir.

Zodiacus alius dicitur *Visualis* seu *sensibilis*,
consistens in 12. Signorum constellationibus,
quas videmus in Firmamento; alius *Ratio-
nalis*, constans ex 12. partibus Primi Mo-
bilis, quæ ad distinctionem Signorum Fir-
mamenti *Dodecametoria* appellantur. Hinc
quando Sol dicitur esse in hoc vel illo Signo,
non est intelligendum de Signorum constel-
lationibus, utpote quæ à tempore Hippar-
chi, Primi Astronomicorum Instrumento-
rum Inventoris, qui ante 1864. circiter an-
nos vixit, 28. grad. adeoque integro ferè Si-

H

gno

gno, vi Motûs Proprij Stellarum Fixarum
(quarum integra Periodus, quousque de-
nuò ad primum suum punctum redeant, ab
aliquibus 49000. ab alijs 36000. communius
verò 25000. annorum esse asseritur,) locum
suum mutârunt, ita ut Signum Arietis, quod
illis temporibus correspondebat primæ Do-
decameroriæ Zodiaci rationalis, nunc jam
congruat secundæ, & sic de cæteris. Lo-
quimur ergò solùm de partibus duodecimis
Zodiaci rationalis, quarum prima tribui-
tur ♈. altera ♉. &c. juxta ordinem superi-
us duobus illis versiculis indicatum.

Præterea duo puncta Zodiaci Solstitialia;
Æstivum ☊. ac Hyemale ☋. sicut & puncta
Æquinoctialia, Vernal ♈. & Autumnale ♎.
vocantur *Puncta Cardinalia* Eclipticæ, quia
constituunt initia quatuor anni temporum,
& idè etiam prima tria Signa ♈. ♉. ♊.
dicuntur *Verna*, secunda tria ☊. ☋. ♎.
Æstiva, tria sequentia ♎. ♏. ♐. *Autumnalia*,
ac tria ultima ☋. ♑. ♒. *Hyemalia*. Porro
punctum Zodiaci Oriens vocatur *Horoscopus*,
& punctum superius correspondens Meridia-
no, dicitur *Punctum Culminans*, seu *Medi-
um Cæli*, punctum verò inferius sub Meridia-
no appellatur *Imum Cæli*. Cæterùm sicut Zo-
diacus distat 23. grad. 30. min. ab Æquatore;
ita etiam Axes utriusque totidem à se invi-
cem

cem distant gradibus, hoc solo discrimine, quod Axis Zodiaci cum suis Polis Circulos Polares hoc suo motu describentibus, moveatur motu Primi Mobilis, Axis autem Æquatoris, qui cum Axe mundi coincidit, sit immobilis. Denique observo, Astronomos initium anni non sumere pro Calendis Januarij, prout sumitur vulgariter, sed constituere dictum anni initium in primo gradu Arietis, seu principio Veris, ubi nimirum tota natura incipit renovari, & quo tempore communiter etiam creditur mundus fuisse conditus ac redemptus, adeoque etiam Christus Incarnatus, ac pro nobis passus & mortuus.

Est autem Zodiacus I. Regula Motus Secundi. II. Via omnium Planetarum, sicut Ecliptica est via regia Solis. III. Suâ obliquitate gratam causat quatuor anni temporum vicissitudinem. IV. Efficit inæqualitatem dierum & noctium. V. Ecliptica (unde & nomen habet) designat loca Eclipsium, quæ non contingunt, nisi intra, vel prope eandem, Lunares quidem in Plenilunio per directam interpositionem Terræ inter Solem & Lunam, Solares verò in Novilunio per interpositionem Lunæ inter Solem & Terram. VI. Determinat Latitudinem Stellarum, quæ nihil aliud est, quam

H a

de.

deviatio Planetæ, vel alterius Aſtri ab Eclipſtica verſus alterutrum Polum ejusdem; unde ſi deſcendit ad Polum Eclipſticæ Auſtralem, dicitur tale Sidus habere *Latitudinem Auſtralem*, ſi ad Borealem deviat, habebit pariter *Latitudinem Borealem*. Sol nullam habet Latitudinem, cùm in media linea Zodiaci, ſeu Eclipſtica perpetuò incedat. Latitudo Saturni Borealis eſt 2. grad. 48. min. Auſtralis verò 2. gr. 49. m. ex mente Tycho-
nis. Jupiter habet Latitudinem Borealem 1. gr. 38. m. Auſtralem 1. gr. 40. min. Mars Borealem 4. gr. 31. m. Auſtralem 6. gr. 47. m. Venus hinc inde ab Eclipſtica gr. 9. m. 2. Mercurius pariter hinc inde 3. gr. 33. m. Luna in quadraturis cum Sole 5. gr. 17. m. in oppoſitione verò & conjunctione 4. gr. 58. min. Ubi Planetæ ſunt in maxima Latitudine, dicuntur eſſe in ventre ſui Draconis, ſi nullam habent Latitudinem, ſed incidunt in Eclipſticam, dicuntur eſſe in ſuis Nodis, qui ſunt vel Caput vel Cauda Draconis, prout ſuperius de Luna c. 2. inſinuavimus.

VII. Menſurat etiam Longitudinem Stellarum, quæ nihil aliud eſt, quàm arcus Eclipſticæ interceptus inter primum grad. Arietis, & Circulum illum, qui per Centrum Stellæ ac Polos Eclipſticæ tranſit, quot enim gradus reperiuntur in dicto arcu, tanta erit ſideris

Lon-

Longitudo. Ex quo patet, Latitudinem & Longitudinem Astronomicam Stellarum esse longe diversam à Longitudine & Latitudine Geographica locorum, de qua inferiùs, ubi de Æquatore agemus. Denique designat limites Zonæ Torridæ, quæ inter utrumque Tropicum per puncta Solstitialia transeuntem interjacet.

In Planisphærio. Ecliptica seu Zodiacus repræsentatur per Lineam Ellipticam seu Ovalem, divisam in 12. Signa, & horum singula in gradus 30. Latitudo ramen Zodiaci ibidem non exprimitur, quia evagatio hæc Lunæ v.g. non fit constanter in eodem Signo, sed Signa mutat ordine retrogrado, ita ut si nunc sit in ♊. post aliquod tempus progreditur ad ♋. &c. ac præterea cum omnes tres circuli Zodiaci eundem habeant Axim, eosdemque Polos, ideo solummodo medius exprimitur, seu sola Ecliptica.

Meridianus

Est Circulus major transiens per Polos Mundi, & per Polos Horizontis, seu per Zenith & Nadir loci dati, ac bifariam dividens Sphæram in partem Orientalem & Occidentalem,

Nomen suum habet ex eo , quòd ubi Sol in nostro Hemisphærio eum attigerit , faciat *medium diei* , sicut in Hemisphærio inferiori *medium noctis* ; & hoc verum est de omnibus Terræ populis ac locis sub eodem Meridiano constitutis. Mutatò locò versùs Ortum vel Occasum semper mutatur Meridianus , unde infiniti possunt fingi Meridiani , sicut & infiniti Horizontes , de Rationali loquendo ; sensibilis enim non censetur mutari , nisi mutatio loci sit satis notabilis , sicut etiam de Horizonte diximus. Ut autem sciretur , quot gradibus unius loci Meridianus sit orientior altero , statuunt alicubi certum Meridianum , quem vocant *Meridianum Primum* , à quo locorum Longitudines ac distantias numerari queant , nimirum secundum gradus *Æquatoris* , interceptos inter Meridianum Primum , & inter Meridianum loci dati , unde etiam differentia Longitudinis plurium locorum facillè eruitur. Utiliter verò hîc notandum venit , aliquos Primum Meridianum ducere per Insulam *Palmam* , unam ex Canarijs , ut Gerardus Mercator , alij per *Teneriffam* ex iisdem Fortunatis cum Blaeu , Ianson, Vischer, Witt, Valck , Danckers & Schenck ; alij per Insulam *Ferro* cum Mr. de Fer , Sanson & laillor ; alij per Insulam *S. Vincentij Hesperidum* , vel *Pico Azoridum* , vel

Cer.

Corvo Azoridum. Ut ergò Longitudines
Mapparum à diverſis Meridianis initæ ad
eundem Meridianum v. g. Teneriffæ reduci
poſſint, ſervire poterit ſequens

**Tabula reductionis Meridianorum Pri-
marum ad Meridianum ductum per
Teneriffam.**

| Subtrahere | | à Gradibus Longitudinis ſequentium Inſularum. | Longitudines à Teneriffa | |
|------------|----|--|-----------------------------|----|
| G. | M. | | Gr. | M. |
| 2 | 7 | Canariæ { Palma | 357 | 53 |
| 2 | 51 | { Ferro | 357 | 9 |
| 8 | 2 | { S. Nicolai | 351 | 58 |
| 8 | 21 | { del Fuego | 351 | 39 |
| 9 | 21 | { S. Vincentij | 350 | 39 |
| 10 | 57 | { Pico | 349 | 3 |
| 13 | 27 | { Corvo | 346 | 33 |
| 13 | 29 | { Florida | 346 | 31 |

Sic v. g. Sanſon Primum Meridianum po-
nit in Inſula Ferro; ſi ergò eum reducere
volo ad Teneriffam, ſubtraho gradus in Ta-

bula expreſſos, nim. 2. 51. à Longitudine
Inſulæ Ferro à Sanſone poſitæ, & reduceretur

ad 357. 9. Teneriffa verò ad 360. ſeu Primum

Meridianum. Quòd si verò Meridianus à Teneriffa ad Insulam Ferro, vel aliam magis Occidentalem reducendus esset, prædicti gradus locò subtractionis addi deberent, quod pro intelligendis Mappis, ac reducendis Longitudinibus plurimum contribuere poterit.

Servit autem Meridianus I. Geographis pro inscribendis Terræ locis in suis Chartis, seu Mappis, numerando eorum Longitudines à Primo Meridiano, ut immediatè dictum est, eorūque Latitudines, numerando eas in gradibus Meridiani ab Æquatore usque ad Zenith. II. Servit Astronomis ad cognoscendam in gradibus Ipsius Altitudinem Poli & Æquatoris supra Horizontem. Imò III. Ad mensurandam ipsam Terram, modò suprà c. 2. fol. 32. insinuatò. IV. Ostendit maximam Siderum altitudinem supra Horizontem; uti & V. Eorundem Declinationem ab Æquatore. VI. Determinat Meridiem ac mediam Noctem pro omnibus Terræ locis sub eodem Meridiano constitutis. VII. Quanto tempore citius sit Meridies in uno, quàm in altero loco; si enim differentia Longitudinis duorum locorum convertatur in tempus, computando 15. gradus pro una hora, facile patebit, quot horis vel minutis locus Orienta-


lior citius habeat Meridiem, quàm Occidentalior. Similiter idem Meridianus monstrat VIII. Quantò citius uni loco Sol oriatur præ altero, per eandem nimirum Longitudinis differentiam; quò citius enim unus locus habet Meridiem eò citius etiam habebit Ortum. IX. Meridianus est initium diei naturalis secundùm Astronomos, qui integram revolutionem diurnam, hoc est, 24. horas numerant à Meridie (vel in ordine ad observanda præcepta Ecclesiæ à Media Nocte &c.) quemadmodùm dies artificialis incipit ab Ortui Solis, & terminatur in Occasu. Econtrà Itali numerant 24. horas diei ab Horizonte Occiduo, ita ut proxima hora post Occasum sit hora I. & sic ulterius numerando usque ad 24. sicut Babilonij ab Horizonte Ortivo. Horæ verò *Iudaicæ*, *Antiquæ*, *Planetariæ*, & *Inæquales*, sic dictæ, eò quòd Antiqui ijs regimen Planetarum specialiter attribuerint, & cum sint duodecimæ partes diei artificialis, computatæ ab Ortui usque ad Occasum, ideo necessariò in æstate sunt majores, quàm in hyeme, consequenter *inæquales*, suntque illæ unicæ horæ, de quibus loquitur Scriptura, ut patet ex illo Ioan. II. v. g. ubi Christus tanquam rem omnibus notam proferens, ait: *Nonne duodecim sunt horæ diei?* quod tamen de alijs ho-

gis minime verificaretur, cum apud nos v. g. In æstate sint sedecim, in hyeme vero tantum octo horæ diei. Id ipsum luculenter patet ex Parabola Patrisfamilias Matth. 20. qui exijt prima Mane (hoc est, circa Solis Ortum, qui tempore Autumnali ac vindemiæ contingit juxta nostrum horas numerandæ modum circa horam VI.) conducere operarios in vineam suam; tum denuò egressus est circa horam III. (quæ apud nos est IX.) ac postea circa horam VI. IX. & XI. seu XII. III. & V. nostratem; unde ultimi solummodò unâ horâ fecerunt, nimirum, ab hora XI. usque ad XII. & tamen acceperunt denarium &c. Similiter quando Filium Regulæ Joan. 4. v. 52. horâ septimâ febris reliquit, erat juxta horas nostrates prima. Denique quando Matth. 27. v. 45. in Passione Domini tenebræ factæ sunt ab hora sexta usque ad nonam, erat tunc Hierosolymis juxta nostrum horas numerandi modum hora duodecima, & tertia, ubi etiam Christus expiravit; quia verò ibidem diem duabus horis anticipant, respectu nostri, cum Hierosolyma 30. gradibus sit Orientalior nobis, uti superius jam c. I. insinuavimus; idè in his nostris partibus tenebræ jam incepissent horâ undecimâ, fuissentque in morte Christi finitæ horâ primâ; quæ omnia nul-

si alteri horarum generi conveniunt, quàm horis Iudaicis, quarum duodecim numerantur ab Orru usque ad Occasum, majores utique in æstate, quàm hyeme in Sphæra obliqua, ac propterea inæquales, ut dictum.

Quoniam verò *Linea Meridiana* ad innumeros usus Mathematicos, de quibus postea, non solum summè utilis, sed etiam necessaria comprobatur, idè non abs re fore duximus, si unum vel alterum modum eam inveniendi, & in plano perfectè Horizontali (quod amissi seu perpendiculò examinandum est) describendi adduceremus. Primus, ac facillimus modus est, si in plano perfectè æquilibrato (quod præsertim in subsequentiis modis observandum erit) in *Æquinoctio Verno* vel *Autumnali* stylum erigas, & binis vicibus per notabile intervallum eadem die extremitatem umbræ ejusdem v. g. plumbagine notes, hæcque duo puncta lineâ rectâ conjungas, atque huic perpendicularem ducas, erit hæc *Linea Meridiana*. Quia verò nimis subinde longum foret, diem *Æquinoctij*, præsertim serenam expectare, idè

Secundus, & quavis die serenâ practicabilis modus communiter assignatur isto. In Plano Horizontali ex centro A. describantur plures Circuli, & in eodem Centro perpen-

Fig^a VI^a

pendiculariter erigatur stylus AB, convenientis altitudinis, ut umbram non nimis procul projiciat, sed alterutrum circulorum commodè attingere possit. Tum observetur duabus circiter horis ante Meridiem momentum, quo extremitas umbræ styli præcisè attingit peripheriam unius dicto.

storum circulorum, & ibi notetur punctum, v. g. C. idipsum simili horarum intervallo fiat etiam post Meridiem in puncto D, arcus verò CD. bifariam dividatur in E. & exemplo stylo per punctum E. & Centrum A. ducatur recta EAB. eritque ipsissima Meridiana.

Tercius modus inveniendi Lineam Meridianam ex Tabulis Astronomicis Federici Saminiati 1. part. c. 14. est iste. Ante omnia prope fenestram v.g. in promptu sit filum suo pondere instructum, ita ut quiescens perpendiculariter insistat Plano Horizontali, in quo designanda est Linea Meridiana. Dein die, quo Sol unum ex Signis Septentrionalibus ingreditur, ex Tabula Altitudinum Solis in Circulo Verticali (inferius in fine II. Partis apponendâ) notetur Altitudo Solis illi diei correspondens, & magno quodam Quadrante sæpius exploretur Solis Altitudo supra Horizontem, donec Altitudini in Tabula inventæ perfectè congruat; tum Lineam umbræ fili nota, hancque ad Angulos rectos secâ, & habebis Lineam Meridianam. In exemplo, Sole in Tropico φ existente (turius enim operatio instituitur circa Solsticia, quàm Æquinoctia) in dicta Tabula pro nostra Elevatione Poli grad. 48. invenies 32. grad. 27. min. quam.

quamprimum ergò magno Quadrante obser-
vabis, Solem habere totidem graduum Al-
titudinem, nota Lineam umbræ fili, ut su-
prà, eritque Linea huic perpendicularis,
Meridiana. Quandonam autem ubivis lo-
corum Sol pertingat ad Circulum vertica-
lem, ex dicendis in II. Parte parebit; hinc
Monachij verò initio Cancrì hoc contin-
git circiter mediâ octavâ.


Quartus modus ex eodem Authore est
talis. In priori exemplo Solsticij Æstivi
horâ VII. maturinâ v. g. ~~ex Tab. VII.~~ Tabu-

la invenies Azimuth Solis 5. 40. ex Tabu-
la verò Altitudinum Solis supra Horizon-
tem pariter in fine II. Partis ponendâ, eâ-
dem die & horâ apparebit Altitudo Solis

esse 27. 40. hanc si Quadrante quoque ob-
servaveris, nota Lineam umbræ fili A. B.
ut suprâ, in hac ad libitum describe Circu-
lum v. g. ex puncto C. & ex puncto B. ubi
Linea umbræ fili secat dictum Circulum,
numera complementum Azimuth Solis, ni-

mirum 84. 10. ad sinistram versùs D. erit-
que Linea ducta per hoc punctum D. &
Centrum C. Meridiana. Vel numera Azi-

imuth illius diei, & horæ, scilicet 5. 40.
à pun-

Fig.^a VII.^a

A puncto B, dexteram versùs in E. & ex E. per Centrum C. duc rectam E. F. eritque D. G. huic perpendicularis, Meridiana. Ubi proptaxi benè notandum est, quòd quando Altitudo Solis in Circulo Verticali est major Altitudine per Quàdrantem inventà, Azimuth censeri debeat Meridionale, si minor, Septentrionale, quousque hæc ex di-
 gen-

cendis de Circulo Verticali magis elucescant.

Quintum modum adducit Dechales Tom. 4. de Astrolabio l. 5. proposit. 4.

Sextum verò non ita dissimilem priorì assignat Ozanam in sua Gnomonica c. 1. Lem. 13.

Septimum describit Joan. Baptista du Hamel, Parte 2. Physicæ c. 4. qui tamen tres modi, quia prioribus operosiores sunt, ideò curiosiorem Lectorem eò ablego.

Octavus modus investigandi Meridianam erit, si in eodem Plano Horizontali simul describatur Horologium Horizontale, & Azimuthale, suo quodvis stylo instructum, illudque tamdiu vertatur hinc inde, donec ambæ utriusque Horologii horæ sibi exactè congruant, tunc enim Linea horæ XII. insister Lineæ Meridianæ.

Nonus Meridianam inveniendi modus esse potest, si Horologio æquinoctiali styli locò imponatur Planum versatile, eidem perpendiculariter insistent, quod suis Pinnacidiis instructum, Signa Zodiaci debite descripta contineat; si enim hoc instrumentum (ad quæcunque Horologia mutis inscribenda percommodum) tamdiu hinc inde vertatur, donec radius Solaris per dioptras transmissus locum Solis in Zodiaco
cur-

currentem attingat, invenies instrumentum ad Lineam Meridianam accuratè situarum. Verùm cum hujus loci non sit Gnomonicam tradere, de his duobus ultimis modis alibi fortè dabitur dicendi locus.

Denique quomodo ex ipso nostro Planisphærio erui possit Linea Meridiana, inferius in II, Parte hujus Opusculi ostendemus.

Quantæ autem utilitatis sit Linea Meridiana in Plano Horizontali exactè descripta, satis explicari nequit; servit enim I. ad quæcunque Horologia debite disponenda, & consequenter II, ad horam diei singulis momentis accuratè cognoscendam. III, Ad Globum conformiter Partibus Mundi situandum. IV, Ad Horologia muris ritè inscribenda. V. Ad acus Magneticas rectificandas, & VI. hac mediante ad navigia in suo cursu dirigenda. VII. Ad Mappas Geographicas in genuino suo situ collocandas. VIII. Ad instrumenta Geometrica mediante eadem acu Magnetica in eodem semper statu, ac situ (quod ad operationes Geometricas ritè instituendas unice necessarium est) constanter conservanda. IX. Ad explorandum cujuscunque ædificij situm. X. Ad ædificia, vel Ecclesias Partibus Mundi accommodandas, v. g. ut Altra-

re Summum Ortum respiciat, Organum vero è regione Occasum spectet &c. XI. Ad declinationes murorum investigandas. XII. Ad Azimutha quovis tempore exploranda; si enim umbra alicujus corporis, plano perpendiculariter insistentis, Meridianam fecer, Linea umbræ notanda, & quor graduum erit angulus sectionis, tot graduum erit Azimuth quæsitum. Denique rectificatâ Acu Magneticâ, ac pixide cum suo versorio in aliud planum translata, hocque ad Lineam Declinationis ut antea situato, haud difficile erit, tali modo Lineam Meridianam in quodcunque aliud planum Horizontale transferre, dummodò locus sit ab omni ferri latentis suspitione immunis. Sed hæc de his dicta sufficiant.

Cæterum Planisphærij Meridianus est Circulus in Limbo ibidem descriptus, in 4. Quadrantes divisus, ita ut Axis Mundi ad datam Elevationem pro lubitu moveri & accommodari queat.

Coluri.

Duo sunt Coluri, unus dicitur *Colurus Æquinoctiorum*, estque Circulus maximus, qui transiens per puncta Æquinoctialia.

lia Zodiaci & Polos Mundi, bifariam secat Aequatorem & Zodiacum, illum quidem ad angulos rectos, hunc autem oblique. *Colum Solstitiorum* est, qui transiens per puncta Solstitialia, Polos Mundi, & Polos Zodiaci, bifariam dividit Colurum Aequinoctiorum, Aequatorem, & Zodiacum, & hunc quidem utrumque ad angulos rectos, quia transit per Polos utriusque. Ambo autem simul secant Eclipticam in quatuor punctis Cardinalibus, quæ sunt initia quatuor anni temporum. In Sphæra Obliqua nunquam integrè ac uniformiter, sed quasi *truncatè* conspiciuntur, unde & *Coluri* appellantur. In Sphæra Recta medietas eorum semper existit supra Horizontem; in Sphæra Parallela autem sunt Horizonti perpendiculares.

Officium utriusque Coluri est I. Repræsentare Circulos Horarios, dum unus transit per puncta H. 6. alter verò per Meridiem. II. Designare initia quatuor anni temporum, ut ex dictis constat. III. Colurus Solstitiorum designat maximam Solis declinationem, seu obliquitatem Zodiaci. IV. Hic idem sustinet Polos Zodiaci in Circulis Polaribus. V. Dividit Eclipticam in partem ascendentem & descendentem. VI. Officium illorum est determinare Circulos Polares & Tropi-

picos, & consequenter Latitudines quinque Zonarum. In Planisphærio Colurus Æquinoctiorum coincidit repræsentativè cum Meridiano, & Colurus Solstitiorum cum Axe Mundi.

§. II

De Circulis Sphæræ Minoribus.

Tropici

Sunt duo Circuli Minores, æquali spacio, nimirum 23. grad. & 30. min. ab Æquatore distantes, quorum unus nobis propinquior *Tropicus Cancræ*, alter Meridiem versùs *Tropicus Capricorni* appellatur, à reverendo sic dicti, eò quòd Sol ultra eosdem nunquam progrediatur, sed inde ad partem oppositam denuò revertatur; unde in Cancro dies est omnium longissima, & in Capricorno brevissima, & ideò *Tropicus Cancræ* dicitur etiam *Æstivus*, sicut *Tropicus Capricorni* *Hyemalis*. Similiter puncta Horizontis, ubi Sol in Cancro existens oritur, vel occidit, dicuntur *Ortus & Occasus Æstivus*, in Capricorno autem, *Ortus vel Occasus Hyemalis*,

Ser-

Serviunt hi Circuli I. ostendendo maximam declinationem Solis, quæ dictis 23. grad. & 30. minutis nunquam est major. II. Exhibent nobis limites semitæ Solaris, quos Sol nunquam transgreditur, sed quamprimum eos attigerit, denuò revertitur. III. Determinant Latitudinem Zonæ Torridæ inter utrumque Tropicum comprehensæ, nimirum 47. graduum, per cuius medium transit Æquator. IV. Designant in Horizonte maximam Amplitudinem Ortivam vel Occiduum Solis, quæ in Sphæra Recta est Æqualis maximæ declinationi Solis; in Sphæra Obliqua verò tantò major est Amplitudo Ortiva, quò obliquior est Sphæra usque ad 66. grad. 30. minur. ubi præcisè est 90. graduum. V. Denique commonstrant, quandam in Æstate sit dies longissimus, & nox brevissima, in Hyemæ vero nox longissima, & dies brevissimus.

Quinam verò Circuli sint Tropici in Planisphærio, explicatione non indiget.

Circuli Polares

Sunt duo parvi Circuli. inter se æquales, & ad Æquatorem paralleli, quos Poli Eclipticæ suo motu Circulari describunt cir-

ca. Polos Mundi; unde unus à Polo sibi proximo *Circulus Polaris Arcticus*, alter verò *Amarcticus* appellatur.

Officia eorum sunt I. Determinare Latitudinem *Zonæ Frigidæ*, quæ vel Meridionalis, vel Septentrionalis est. II. Qui Zenith vel Nadir habent, adeoque habitant sub ipsis *Circulis Polaribus*, habent diem in Æstate, & in Hyeme noctem longissimam 24. horarum, adhuc longiorem autem, qui habitant intra hos *Circulos* versus Polum, ita quidem, ut sub ipsis Polis (si quidem Terra illa habitabilis sit) semestris evadat, absque Crepusculis, quæ etiam in Sphæra Parallela lucem diurnam prolongare solent. Denique in *Colura Solstitiorum* signant etiam duos *Polos Zodiaci*, ac motum eorundem circa *Polos Mundi*, à quibus distant 23. gradibus ac 30. minutis.

Denique hi duo *Circuli Polares* quinam sint in *Planisphærio*, per se clarius patet quam ut ulla indicatione opus sit.

C A P U T V.

De *Circulis Sphære Secundarijs.*


Paralleli Solis, ubi etiam de *Ascensione recta, & obliqua.*

Paralleli Solis sunt *Circuli* minores æqualiter à se invicem (saltem ad sensum)

&

& ab Æquatore distantes, quos Sol singulis diebus describit Motu Primo Raptus ab Oriente in Occidentem; licet enim propter *Retardationem* quotidie uno ferè gradu *Eclipticæ* deviet Motu Proprio, atque adeò reipsa *Lineas Spirales* faciat, ut superius jam diximus, communi tamen æstimatione & usu accipiuntur pro Circulis Parallelis, pro quorum, & adhuc dicendorum meliore intelligentia serviet apposita Fig. VIII. ubi A. est *Centrum Terræ ac Mundi*, Circulus BCDE. *Meridianus*, BD. *Horizon*, CAE. *Circulus Verticalis Primarius*, quia transit per puncta horæ VI. nimirum V. & \ominus . C. *Zenith*, & E. *Nadir*, F. G. sunt *Poli*, FAG. *Axis Mundi*, HAI. *Circulus Æquinoctialis*, seu *Æquator*, KL. *Ecliptica* cum sua *Latitudine* aa, bb. quæ *Zodiacum* constituit, MK. & LN *Tropici*, OP. & QR. *Circuli Polares*.

Jam ad propositum veniendo, si v. g. Sol existat in puncto S. describet illa die *Parallelum* TV. qui *Horizontem* secabit in W. puncto scilicet Ortus vel Occasus, in *Meridiano* autem, ubi dictus *Parallelus* eum secuerit in puncto V. erit Sol in *Meridie*, & in puncto T. in *Media Nocte*, Arcus autem DV. denotat *Altitudinem Solis Meridianam*, & arcus IV. *declinationem Solis ab*

Fig.^a VIII.^a

Æquatore. Præterea Arcus Horizontis **AW**, comprehensus inter punctum Orientis Veri Æquinoctialis **A**. (quod coincidit cum puncto **H. G.**) & punctum Occus vel Occasus Solis **W**. dicitur *Amplitudo Ortiva* vel *Occidua*, qui inter se ferè sunt æquales. Denique Arcus **WV**, comprehensus inter Horizontem & Meridiem, dicitur *Arcus*

se-

semidiurnus; quantum enim temporis intervallum intercedit inter Ortum & Meridiem, tantum intercedit inter Meridiem, & Occasum. Alter verò Arcus *W T.* ejusdem Parallelis Solis, latens infra Horizontem, & comprehensus inter hunc & Mediam Noctem, dicitur *Arcus seminocturnus*, quia nimirum tantum distat Occasus à Media Nocte, quantum hæc distat ab Ortui. Ubi etiam evidens est, dies, & consequenter etiam Arcus semidiurnos Sphæræ Obliquæ in Signis Septentrionalibus esse majores, quàm in Australibus, ita ut in ϱ . sit dies longissima, & in P . brevissima. In Sphæra Recta autem Arcus semidiurnus toto anno est æqualis, cum Sol ibi semper oriatur & occidat H. 6. Differentia verò inter Ortum Solis in Sphæra Recta & Obliqua, seu quod idem est, distantia Solis ab hora 6. vocatur *Differentia Ascensionalis*, quia est æqualis cum differentia inter Ascensionem rectam & obliquam.

Nomine autem *Ascensionis rectæ* intelligitur gradus Æquatoris, qui in Sphæra Recta cum Sole (vel cum alio quocunque Sidere) oritur, vel etiam in Sphæra Obliqua simul cum Sole pervenit ad Meridianum; sic v. g. si in Planisphærio locum Solis in Ecliptica quæ-

ras v. g. in nostro exemplo gradum 23. 17. 0 /
 ♄. & in linea Arcui Horario parallela descendas ad Æquatorem, occurret pro Ascensione Recta gradus 145. 38. 0 /

Ascensio Obliqua Solis est gradus Æquatoris cum Sole coorrens in Sphæra Obliqua. In Planisphærio Ascensio Obliqua reperitur, si distantia ab hora 6. seu Differentia Ascensionalis (quæ in dato exemplo est 15. 49.) in Signis Borealibus subtrahatur ab Ascensione Recta, vel in Australibus eidem addatur, & prodibunt 129. 49. ut in II. Parte pluribus dicemus, & examinanti facis patebit. 0 /

Ubi insuper observo, *Differentiam Ascensionalem*, seu *Ascensionum* vocari etiam illam, quæ intercedit inter duas Ascensiones Rectas duorum Siderum v. g. Solis & Lunæ, de qua in eadem Parte II. redibit sermo.

Denique *Paralleli Solis*, transeuntes per initia Signorum vocantur etiam *Paralleli*, seu *Arcus Signorum*, quorum unus est Cancro, alter Capricorno proprius, reliqui verò sunt semper duobus Signis communes, ut II. & ♄. ♀. & ♋. ♊. & ♌. ♍. & ♎. ♏. & ♐. ♑. & ♒. ♓. & ♈. 0 /
 Offi.


Officia autem Parallelorum Solis sunt I. Exhibere declinationem Solis. II. Amplitudinem Ortivam. III. Longitudinem Arcus semi-diurni vel nocturni. IV. Paralleli, qui sunt ultra Tropicos, specialiter dici possunt *Paralleli Stellarum*, quorum ille, qui Horizontem præcisè attingit versùs Septentrionem, vocatur *Parallelus maximus semper apparentium*, qui verò eundem attingit versùs Meridiem, dicitur *Parallelus maximus nunquam apparentium*, qui proinde ab alijs distinguunt Stellas semper, & nunquam apparentes.

Climata.

Ultra Parallelos Solis, assignant Geographi adhuc alios ejusmodi Circulos Parallelos, quos *Climata* appellant, quo nomine intelligitur Zona quædam minor, seu Terræ spatium duobus Parallelis tantundem à se invicem distantibus inclusum, ut dies longissimus unius, dimidiâ horâ differat à die longissimo alterius. Inter hos duos Parallelos Clima constituentes adhuc ponendus, vel saltem concipiendus est tertius Parallelus intermedius, qui Clima bifariam dividat, ubi nimirum differentia Diei longis-


gissimi solummodò est unius quadrantis horæ ; hæc tamen spatia Climatum , ac intervalla Parallelorum non sunt æqualia , sed majora prope Æquatorem , ac minora semper versùs Polos. Quoniam verò sub Æquatore dies sunt 12. horarum , sub Circulis Polaribus verò dies longissimus est 24. horarum , evidens est , differentiam dierum artificialium ab Æquatore usque ad Circulos Polares esse 12. horarum , & consequenter 24. Climata constitui debere , ita ut in I. Climato dies longissimus sit 12. horarum cum dimidia , in II. verò 13. horarum , & sic de cæteris. His 24. Climatibus addunt Moderni Geographi adhuc sex alia in ipsa Zona Frigida usque ad Polum , ubi dies longissimus in quovis Climate crescit integro mense , usquedum sub ipsis Polis dies evadat omnino semestris , ut sæpiùs jam insinuatum est. Serviunt autem hæc Climata ad cognoscendum , quantus sit dies longissimus alicujus loci sub tali , vel tali Climate ; si enim numerum Climatis reduco ad horas dimidias , statim apparebit , quot horis aut semihoris dies longissimus plus contineat , quàm in Æquinoctio : sic v. g. Monachium est sub Climate VIII. nondum completo , 8. autem dimidiæ horæ dant 4. integras , quæ si addantur duodécim horis , dant 16. horas.

un-

unde colligo, diem longissimum Monacensem esse totidem ferè horarum, sicut & Climma octavum ibi nondum est integrè finitum & completum; & vicissim si scio, quot horas dimidias dies longissimus alicujus loci habeat ultra duodecim, hoc ipso etiam scio numerum Climatis. Plura dabit Tabula  III. in fine Opusculi ponenda.

Circuli Verticales

A Rabicè *Azimuth* dicti, sunt, qui transeuntes per Zenith & Nadir, Horizontem ad angulos rectos interfecant, qualis etiam est ipse Meridianus; Circulus verò Meridiano perpendicularis, ac transiens per puncta *Veri Orientis & Occidentis*, nim. per puncta ∇ . & \sqcup , seu H. 6. vocatur *Verticalis Primarius*, qualis in Fig. VIII. est Circulus CAE. Circulus autem transiens per Centrum Solis, in quocunque demùm Signo existentis, *Verticalis Solis* appellatur, estque ibidem Circulus CSE. Possunt autem concipi *Verticales* infiniti, sicut & infiniti Horizontes, tot nimirum, quot sunt puncta Horizontis. Ubi notatu dignum occurrit, quòd, quando Zenith A. (ut in Fig. IX.) est intra duos Tropicos, seu quando Elevatio Poli est minor



nor $23\frac{1}{2}$ gradibus, Verticalis Solis existens
 tis v. g. in Tropico ☊, subinde secet hujus-
 modi Parallellum Solis in duobus punctis,
 nimirum in C. & D. tam ante, quam post
 Meridiem, quod tunc contingit, quando
 Parallelus Solis (qui in dato exemplo est
 Tropicus ☊) magis distat ab Aequatore,
 quam punctum Verticale A, seu Zenith, &
 tunc

tunc in loco habente hujusmodi Elevationem Poli umbra styli in Horologio Solari (ad instar Horologii Achaz 4. Reg. 20. v. 11.) retrogredi videtur, quia nimirum bis cadit in eundem Verticalem, adeoque ad eum accedit, recedit, ac denuò accedit.

Officium autem Circulorum Verticalium est I. Mensurare altitudines Astrorum. II. Eorum distantias à Zenith. III. Amplitudinem Ortivam, si nempe observeretur distantia Verticalis Solis vel Srellæ Orientis à Verticali Primario. IV. Serviunt Circuli Verticales ad cognoscenda Azimutha, & ad construenda diversa Horologia Azimuthalia, in quorum uno ad lineam umbræ perpendicularis directo, & Arcubus seu Parallelis Signorum debite instructo, solum Verforium, seu acus Magnetica, ubi quieverit, horas demonstraret; alterum autem stylo perpendiculari ab uno Signo ad alterum mobili sine Acui Magnetica idipsum præstet; ac tertium denique limbo horario mobili instructum, Lingulâ Magneticâ quiescente horam currentem designet. De quibus commodius alibi.

In Planisphærio autem *Circulus Verticalis Primarius* facile habetur, si Polo ad Latitudinem loci dati disposito, à gradu nonagesimo, seu Zenith per Centrum Planisphærij, seu punctum H, 6, recta ducatur, saltem

tem occultâ, quæ tamen aliàs in Planisphærio, utpote universalî, per se loquendo non exprimitur.

Circuli Altitudinum

ARabibus Almucantarath dicti, sunt Circuli minores, inter se, & cum Horizonte paralleli, Verticalibus autem perpendiculares, qui semper decrecendo pertingunt usque ad Zenith tanquam Polum suum communem, ita ut minimus sit, qui est proximus puncto Verticali, seu Zenith, & maximus, qui est proximus Horizonti. Non exprimuntur tamen in Planisphærio, quia non sunt Circuli stabiles, sed cum Horizonte continuò mutantur. Tales sunt v. g. Circuli Polares, Tropici, ac reliqui Arcus seu Paralleli Signorum, si Planisphærium disponatur ad situm Sphæræ Parallelæ; imò in Planisphærio pro quacunque Elevatione Poli eos repræsentabit filum Regulæ, si hoc in situ Horizonti Parallelo sursum promoveatur, quâ ratione omnes in quibusvis Circulis horarijs vel Paralleliis Signorum haberi possunt Altitudines Solis supra Horizontem, prout in II. Parte ostendemus. Eâdem ratione habentur initia & fines Crepusculorum


rum, de quibus superius c. 4. de Horizonte diximus, si dictum Regulæ filum deprimatur 18. gradibus infra Horizontem, & universim etiam gradus depressionum, si filum Regulæ demittatur ad Parallelum Solis & Arcum Horarium datum, infra Horizontem. Serviunt autem hi *Circuli Altitudinum* in Astronomia ad cognoscendam altitudinem Astrorum supra Horizontem, &, quænam Sidera sint æqualiter elevata, seu sub eodem Circulo Almucantarathico, in Gnomonica verò ad describenda Horologia Cylindrica, & quævis alia, quæ ex Solis altitudinibus conficiuntur.

Solent aliqui hîc etiam assignare *Circulos Longitudinum*, Equatori perpendiculares, seque invicem secantes in Polis Mundi, & *Circulos Latitudinum*, sese secantes in Polis Eclipticæ, sic dictos, eo quòd pereos dimetiatur Longitudines & Latitudines Astrorum; quoniam verò eorum Officium ex dictis de Meridiano & Ecliptica sufficienter colligi potest, ideò his dissimulatis ad alia pergemus.

Circuli Positionum, seu Domorum Cælestium.

Sunt sex majores Circuli, qui se invicem secantes in communibus sectionibus Me-


ridiani & Horizontis , dividunt Circulum Verticalem Primarium in duodecim partes æquales , Domos Cælestes dictas , quibus Astrologi singulares Planetarum influxus attribuunt. Incipit autem *Prima Domus* (quam etiam *Horoscopum* , *Angulum Orientalem* , & *Domum Vitæ* appellant) à puncto Orativo deorsum versum Mediam Noctem , seu *Imum Cæli*. Altera Domus versum Imum Cæli *Domus divitiarum* seu *Lucrum* vocatur. III. est Domus *Fratrū* , IV. *Parentum* , & *Angulus Terræ*. V. *Filiorum*. VI. Domus *valetudinis*. VII. *Conjugij* , & *Angulus Occidentalis*. VIII. Domus *Mortis* , & *Porta Superior*. IX. *Pietatis* seu *Religionis*. X. Domus *Regnorum* , seu *Officiorum* , & *Angulus Cæli*. XI. *Amicorum*. XII. *Inimicorum*. Pater itaque ex dictis , &



ex utraque Figura apposita, ordinem Domorum esse retrogradum, & procedere ab Ortum versus Imum Coeli, hinc ad Occidentem, inde verò versus Medium Coeli, & hinc denuò ad Orientem; ubi est finis Domus XII.

Serviunt autem hæ Domus Cœlestes Astrologis ad faciendas suas prædictiones secundum diversos Aspectus Planetarum, & diversas commorationes in Domibus prædictis, dum volunt, hominum fortunam ab ijs dependere, prout tempore nativitaris boni vel mali fuerint dicti aspectus. Sunt autem Aspectus Planetarum diversæ eorum distantiae in Zodiaco, sic qui distant 120. gradibus, dicuntur habere \triangle , seu Aspectum Trinum, qui 90. \square , seu Aspectum Quadratum, qui 60. \ast , seu Sextilem, \oslash , seu Oppositionem habere dicuntur, qui distant 180. gradibus, \cup , seu Conjunctionem verò, qui concurrunt in eadem Linea respectu alicujus loci Terræ. Fortiores cæteris & efficaciores sunt \ast , \square , \triangle , & \oslash , qui etiam *Aspectus Partiales* vocantur, eò quòd determinatam partem Zodiaci, v. g. sextam, quartam, tertiam, aut dimidiam occupent; si verò non præcisè ejusmodi partes aliquotas occupant, sed aliquibus gradibus plus vel minus, dicuntur habere Aspectum Platicum.

Inter hos Aspectus \ast . & \triangle . appellantur *Boni*, quia Planetæ hujusmodi amicabili Aspectu promittunt omnia bona; dum econtra \square . & \circ . minantur mala, eò quòd his Aspectibus (qui propterà *Mali* dicuntur) quasi torvis oculis Planetæ sese invicem intueri videantur. \circ . seu *Conjunctio* est quasi in-



differens, & modò benefica, modò malefica, prout Planetæ conjuncti sibi invicem sunt amici, vel inimici. Porro ex Fig. XII. patet, Aspectum \ast . sextam partem Zodiaci, \square . quartam, \triangle . tertiam, \circ . verò diamidiam occupare, \circ . denique fieri in Linea recta. Verùm hæc & similia, cùm levi videantur niti fundamento longiùs examinare non vacat, sed qui volet, cum Regulis Astrologis fusissimè pertractata inveniet apud

ſæpè laudatum Io. Zahn tom. 1. ſcrutin. 2. diſquiſ. 3. c. 6. & ſeqq.

Illud unicum hîc obſervo, poſſe Regimen Planetarum quâvis horâ, tam diurnâ, quàm nocturnâ (Planetariâ ſcilicet Iudaicâ, Antiquâ & inæquali, de qua ſola hîc ſermo eſt) facillimè cognosci ex rotula Fig. XIII. modò initium numerationis horarum fiat ab illo Planeta, à quo dies data nomen habet; v. g. volo die Veneris horâ V. diurnâ ſcire. quis Planeta illam regat; attribuo ergo Veneri, tanquam Planetæ illius diei horam Primam, & pergo numerare horas verſus dexteram per ſingulos Planetas uſque ad horam quintam, & invenio Iovem regnare dictâ horâ V. diurnâ; ſi verò nocturnam ſcire volo, pergo numerare per gyrum dictò modò omnes 12. horas diei Planetarias, & adhuc quinque pro nocte, & incido in Lunam, tanquam Regentem illius horæ. Quod quia faciliſſimum eſt, ideò Tabulam Regiminis Planetarum hîc apponere ſuperſedeo.


Zone, earumque Habitatores.

Zone, quaſi Cingula Terræ ſic dictæ, ſunt quinque Spatia inter duos Circulos Mi-

nores, vel inter Circulum minorem & Polum comprehensa. Zona, quæ intra duos Tropicos includitur, *Torrída* vocatur, ob Solis nimirum, cujus viæ subiecta est, perpetuum ardorem. Hujus medium occupat Æquator, continetque hæc Zona *Torrída* in sua Latitudine 47. gradus, seu 705. Mill. Germ. Circa Medium magis est temperata, quàm circa extremitates, tum quia in his Sol se diutius detinet propter Solstitia; tum quia ibi in Æstate dies jam sunt longiores, cum ibi Sphæra jam incipiat fieri Obliqua; tum denique propter copiosum rorem, quem Sol ibi potentissimè attrahit, & quia ibi noctes diebus perpetuè æquales aërem notabiliter refrigerant.

Habitatores *Zonæ Torrída*, commorantes sub ipso Æquatore I. habent perpetuum Æquinoctium. II. Sol bis in anno, nimirum initio γ . & α . est ipsis Verticalis, & idèò *Ascij*, seu inumbres vocantur. III. Omnes Stellæ æqualiter ipsis oriuntur & occidunt. IV. Quatuor habent Solstitia (sumendo ea saltem pro Accessu & Recessu Solis respectu Habitatorem, licet respectu Solis non sint Solstitia propriè dicta) duo quidem *Alta* in principio γ . & α . & duo *Ima* in principio ϵ . & β . V. Duas habent Æstates, & duas qua-

quā Hyemes , quia bis Sol ipsis appropinquat , & bis ab ipsis recedit. VI. Præter umbram Verticalem duplicem prædictam , præter Occidentalem & Orientalem , duas habent umbras Meridianas , Septentrionalem , & Australem , unde etiam *Amphisceij* , seu diumbres dicuntur. Denique sicut Habitatores isti Solis vigorem tam à Septentrione , quàm à Meridie æqualem experiuntur , ita etiam Natura (ut in Ebena , ac ligno Brasiliano ritè dissecto videre est) Circulos suos in arboribus omnes ad medullam concentricos , & ad invicem parallelos describit , ut patet ex Fig. XIV. dum econtrà iidem arborum Circuli in nostris Regionibus , penitus inter se inæquales , & excentrici , ut in Fig. XV. ac nescio quid ellipticum , parabolicum , aut hyperbolicum , ut in Fig. XVI. referentes apparent. Cujus rei ratio est , quòd arbores nostræ Solis vigore unice ex parte sui Meridionali fruuntur , sicque fibræ illarum ac venæ alimentum sugentes ex illa parte magis dilatentur , quàm versùs Septentrionem seu mediam Noctem , ubi propter perpetuam Solis carentiam ac frigus nocturnum potius constringuntur & quasi suffocantur. Ex quo infertur I. Licet hodie fortè non desint artifices , qui ligna certo liquore aut spiritu per totum penetrativo ita imbue-



re possint, ut ligno v.g. Brasiliano simillima videantur, ramò tamen ligni taliter colorati aptè dissecò, fraus facillimè detegitur; si enim circulos undique concentricos, & inter se æquales exhibuerit, vorum erit lignum Brasilianum, vel aliud sub Æquatore natum, si verò dictò modò inæquales ostenderit, erit adulterinum, ac unum ex nostratibus. II. Infertur, si per partem trunci arboris alicujus nostratis, ubi circuli sunt latissimi, versùs partem constrictam per medullam lineam ducas v.g. AB. in
Fig.

Fig. XV. erit hæc quasi Linea Meridiana, ita ut A. designet Meridiem, B. autem Mediam Noctem; & si decussatim per eandem medullam denuò aliam describas lineam CD, signabit C. Ortum, D. verò Occasum, ut adeò errabundus quispiam in sylva, tempore nubilo, ubi nullum extat Solis vestigium, hoc medio se ipsum juvare, & ad quam Plagam iter suum prosequi debeat, cognoscere possit. Simili medio sciendi Plagas Mundi utuntur Venatores; ubi enim vident muscum adherere arboribus, colligunt ex illa parte esse Mediam Noctem, & consequenter ex parte opposita Meridiem. Infertur III. Arbores salubriter transplantari ab uno loco in alium, servato priori situ; si enim pars Meridiana obvertatur Septentrioni, illa destituetur priori Solis fomento, hæc autem, utpote frigore nocturno antea jam suffocata, respirare amplius haud valebit.

Qui habitant sub ista Zona inter Aequatorem & Tropicos I. Duplicem habent umbram Meridianam, & idè pariter *Amphisij* sunt. & II. *Ascij*; quia Solem etiam bis in anno habent Verticalem, ac insuper III. Habent etiam umbram Orientalem & Occidentalem. IV. Quatuor gaudent Solstitijs, ut suprà, duobus summis, ubi Sol ipsis sit ver-

ticalis, ac duobus imis, nimirum quando est in Tropiciis. V. Duas quoque habent Æstates, & VI. Duas Hyemes, quia Sol bis ad ipsos accedit, & bis recedit.

Qui verò sub ipsis Tropiciis degunt, I. Unicam umbram habent Meridianam, nimirum vel Septentrionalem sub ☊. vel Meridionalem sub ☋. quare *Heteroscij*, quasi Alterumbres audiunt. Sunt tamen II. etiam *Ascij*, quia semel in anno Sol ipsis est Verticalis. III. Duo habent *Solstitia*, alterum sub suo meridiano Tropico, imum in altero opposito, similiter. IV. Unam Æstatem, & unam Hyemem, ob eandem rationem. Denique habent dies & noctes artificiales inæquales, quia jam sunt sub Sphæra Obliqua.

Duæ *Zonæ* extremæ circa utrumque Polum *Frigidæ* vocantur, eò quòd à via Solis longissimè remotæ sint. Qui in medio illarum, seu sub ipsis Polis habitant, habent I. Diem semestrem, & talemque noctem continuam, adeoque Sol dimidio anno est supra, & altero dimidio anno infra illorum Horizontem. II. Unicum habent Solstitium, quia unus tantum Tropicus est in illorum hemisphærio. III. Unam habent Æstatem, nimirum in suo Tropico, & unam Hyemem, ubi Sol est ab ipsis remotior. IV. Umbra illorum est circularis, unde & *Periscij*, qua-

quasi Circumbres dicuntur. V. Stellæ Fixæ, quæ ibi sunt in superiore hemisphærio, ipsis nec oriuntur, nec occidunt. VI. Venus & Mercurius cum Sole dimidio anno morantur supra, tantoque spatio infra Horizontem; Saturnus quindecim annis, Iupiter sex, Mars uno anno, ac denique Luna quindecim circiter diebus.

Qui sub ipsis Circulis Polaribus degunt, habent I. Polum elevatum 66. gradibus & 30. minutis. II. In Æstate habent diem longissimum 24. horarum, paræmque noctem in hyeme, quod contingit Sole in Tropicis existente, ubi præcisè radit Horizontem, & consequenter in Æstate non occidit illa die, nec oritur in Hyeme. In qua Sphæræ vel Poli Elevatione illud etiam notabile occurrit, quòd, quando Ecliptica cum Horizonte coincidit (sicut ibidem quotidie contingit) adeoque quando omnia 12. Signa Eclipticæ simul sunt sub Horizonte, proximo momento simul & semel sex Signa oriantur, seu emergant supra Horizontem, & simul sex deprimantur infra eundem, & sic videntur subinde 5. vel 6. Planetæ in eodem instanti simul oriri vel occidere, quod in alijs Sphæræ positionibus minimè contingit; licèt enim tam in Sphæra Recta, quàm Obliqua & Parallela, semper sex Signa sint supra,

pra, & sex infra Horizonem, in Sphæra tamen Parallela nullum omnino Signum de novo oritur, sed eadem sex Signa perpetuò gy rantur supra Horizonem; in Sphæra Recta vel Obliqua verò singulis momentis non nisi punctum vel minima pars unius Signi oritur aut occidit. Sed hæc omnia inspicienti Globum, vel Planisphærium consideranti, magis patebunt. Præterea 10. vel 12. diebus ante, & post Solstitium æstivum Habitatores illi nonnisi instantaneas, & quasi nullas habent noctes, quia ibi Paralleli Solis fere solummodò radunt Horizonem, ac Hemisphærium inferius nonnisi superficialiter pertranseunt; vaporum enim copia in illis partibus causat valde magnam refractionem, præsertim prope Horizonem, quæ Solem facit apparere altiori loco, quàm re ipsa sit, adeoque tunc potius erit crepusculum, quàm nox.

Denique qui habitant inter Polos & Circulos Polares, habent I. in Æstate diem maximam (idem est de nocte in Hyeme) tantò 24. horis longiorem, quò propinquiore sunt Polis. II. Quia Sphæram habent valde Obliquam, sicut & radios Solis, tam rigidum sentiunt frigus, ut veteres illam Regionem inhabitabilem crediderint: contrarium tamen (quidquid sit de Terris immediatè Sup-
Po-

polaribus) constat ex Terris & Insulis ibidem detectis, quales saltem sub Polo Arctico sunt Grænlandia, Islandia, Neulandia, Spizberga, & Nova Zembla &c. III. Longiora etiam habent crepuscula ob dictam Obliquitatem, vaporum copiam, ac inde orientem majorem refractionem: ubi etiam proximæ Stellæ semper, & aliæ plurimæ nunquam videntur. Cætera omnia ipsis accidunt, sicut inhabitantibus Zonæ Temperatæ.

Dicuntur autem *Zonæ Temperatæ*, quia inter Solis ardorem, ac frigus sunt mediæ, quarum una, quæ Circulo Arctico, & Tropico φ . terminatur, est *Borealis*, altera verò, quæ Circulo Antarcticæ & Tropico φ . concluditur, *Australis*. Incolæ illarum I. Habent crepuscula majora, quàm in Zona Torrida, ac breviora, quàm in Zona Frigida. II. Præter umbram Orientalem & Occidentalem, unicam habent umbram Meridianam, versus Polum sibi propinquiorem sparsam, unde & *Heteroscij*, quasi Alterum-bres vocantur. III. Duo habent Solstitia, *altum* & *imum*, sicut & IV. Duo Aequinoctia, V. Unam item æstatem, & hyemem, VI. Sol nunquam ipsis est Verticalis, VII. Quædam Stellæ illis nunquam oriuntur, & quædam

pra, & sex infra Horizontem, in Sphæra tamen Parallela nullum omnino Signum de novo oritur, sed eadem sex Signa perpetuè gyrantur supra Horizontem; in Sphæra Recta vel Obliqua verò singulis momentis non nisi punctum vel minima pars unius Signi oritur aut occidit. Sed hæc omnia inspicienti Globum, vel Planisphærium consideranti, magis patebunt. Præterea 10. vel 12. diebus ante, & post Solstitium æstivum Habitatores illi nonnisi instantaneas, & quasi nullas habent noctes, quia ibi Paralleli Solis ferè solummodò radunt Horizontem, ac Hemisphærium inferius nonnisi superficialiter pertranseunt; vaporum enim copia in illis partibus causat valde magnam refractionem, præsertim prope Horizontem, quæ Solem facit apparere altiori loco, quàm reipsa sit, adeoque tunc potius erit crepusculum, quàm nox.

Denique qui habitant inter Polos & Circulos Polares, habent I. in Æstate diem maximam (idem est de nocte in Hyeme) tantò 24. horis longiorem, quò propinquiore sunt Poli. II. Quia Sphæram habent valde Obliquam, sicut & radios Solis, tam rigidum sentiunt frigus, ut veteres illam Regionem inhabitabilem crediderint: contrarium tamen (quidquid sit de Terris immediatè Sup-
Po-

polaribus) constat ex Terris & Insulis ibidem detectis, quales saltem sub Polo Arctico sunt Grænlandia, Islandia, Neulandia, Spizberga, & Nova Zembla &c. III. Longiora etiam habent crepuscula ob dictam Obliquitatem, vaporum copiam, ac inde orientem majorem refractionem: ubi etiam plurimæ Stellæ semper, & aliæ plurimæ nunquam videntur. Cætera omnia ipsis accidunt, sicut inhabitantibus Zonæ Temperatas.

Dicuntur autem *Zonæ Temperatæ*, quia inter Solis ardorem, ac frigus sunt mediæ, quarum una, quæ Circulo Arctico, & Tropico φ . terminatur, est *Borealis*, altera vero, quæ Circulo Antarctico & Tropico φ . concluditur, *Australis*. Incolæ illarum I. Habent crepuscula majora, quàm in Zona Torrida, ac breviora, quàm in Zona Frigida. II. Præter umbram Orientalem & Occidentalem, unicam habent umbram Meridianam, versùs Polum sibi propinquiorem sparsam, unde & *Heteroscij*, quasi Alterum bres vocantur. III. Duo habent Solstitia, *altum* & *imum*, sicut & IV. Duo Æquinoctia, V. Unam item æstatem, & hyemem, VI. Sol nunquam ipsis est Verticalis, VII. Quædam Stellæ illis nunquam oriuntur, & quædam

dam nunquam occidunt. Denique dies artificiales & noctes habent inæquales.

Pro diversitate Zonarum tria potissimum hominum genera considerantur, nimirum Periaci, Antiaci, & Antipodes.

Periaci, quasi circumhabitatores dicuntur, qui sub eodem Meridiano, eodemque Parallelo, sed in locis oppositis ejusdem Paralleli habitant, adeoque qui secundum Latitudinem æqualiter distant à Polo, secundum Longitudinem verò à se invicem 180. gradibus, seu semicirculo. Tales sunt v.g. Populi Virginie, & Indiæ intra Gangem, quia sunt ambo in eodem Meridiano ac Parallelo, sed in parte Paralleli opposita; item Mexico Urbs celeberrima Indiæ Occidentalis, & Insulæ Cambæ in Asia; sicut & Nova Hispania, & Regnum Persarum.

Ultra ea, quæ Zonæ, in qua habitant, communia sunt. I. diversa habent Periaci dierum, noctiumque initia, media & fines, sicut & diversos Ortum & Occasum; quas enim horas isti numerant à Meridie, has illi numerant à Media Nocte, saltem ubi Elevatio Poli non est major 65. gradibus, & in Æquinoctio dum Sol uni loco oritur, alteri occidit; in Vere & Æstate verò, prius uni oritur, quam alteri occidit, e contra in Au-

tumno & Hyeme prius uni occidit, quam alteri oritur. II. Locus Orientis unius, respectu alterius est locus Occasus. III. Singulæ Stellæ æquali tempore commorantur supra eorum Horizontem, & eadem Stellæ nunquam ijs oriuntur, & nunquam occidunt.

Antæci, quasi Contrahabitanter sunt, quibus una eademque est Longitudo, ad Meridianum communem, in duabus Zonis numerata, & æqualis Latitudo versus utrumque Polum, Tales sunt accolæ Capitis Bonæ Spei, & Habitatores Moreæ; item Extremum Insulæ S. Laurentij vulgò Madagascar dictæ, & Mare Rubrum &c. Hi I. Meridiem, mediam Noctem, & omnes horas sibi invicem habent communes; quantitas tamen diei est illis diversa, dum enim his crescit, decrescit illis, & consequenter dies nostri sunt æquales noctibus nostrorum Antæcorum, & dum nos agimus Ver, aut Æstare, isti experiuntur Autumnum vel Hyemem. II. In Æquinoctio Sol illis simul oritur & occidit, alijs autem diebus his citius, quam illis. III. Se mutuò, vel ad Æquatorem respicientibus, uni orietur Sol ad dexteram, alteri ad sinistram, & sic de reliquis Stellis loquendo. IV. Stellæ, quæ
uni

uni loco perpetuò apparent, alteri nunquam conspiciuntur, & econtrà.

Antipodes, qui è diametro adversam nobis Plagam incolunt, oppositis quidem Parallelis 180. gradibus sejuncti, communi tamen Meridiano sunt comprehensi. Dari hujusmodi homines, ex Adam utique procreatos, in Regionibus oppositis, hodie tam ratione, quàm quotidianâ Mercatorum, atque etiam Missionariorum experientiâ, certum est ac innegabile. Sic Malaca in Hispania diametraliter opposita est Capiti Corlo & Blanco in America. Quòd autem S. P. Augustinus L. 16. de Civit. c. 9. cum Lactantio, Beda, Procopio, & alijs antiquioribus negarit, dari ejusmodi Antipodas, fecisse credendi sunt ex zelo fidei, ne si eos ex iolis congruentijs admisissent, cogerentur fateri, eos ex Adam non fuisse procreatos, cum constans à Clementis tempore omnium Scriptorum fuerit fama, inter Plagam nostram Borealem, & oppositam Australem immensum intercedere Oceanum à nullo hominum permeabilem, quia fatalis illa inscriptio Columnarum Herculearum: *Non plus ultra* omnes ab ulterioris navigationis studio absterruit, usquedum Christophorus Columbus eas Oras feliciter detexit. Sic Rivus Argenteus, seu *Rio dela Plata* extreme

Opponitur ultimis finibus Chinenſium, ubi ad ſe tutandum ab incurſionibus Tartarorum murum 400. Leucarum extruxerunt.

Habent autem Antipodes I. eundem Horizontem, ſed diverſam ejus faciem. II. Ortus Solis ac dies unius eſt Occaſus & nox alterius, & quò longior uni eſt dies, eò brevior eſt alteri. III. Horas diei reiſſa contrarias, nomine tamen eaſdem v. g. 1. 2. 3. numerat unus à Meridie, alter verò à Media Nocte. IV. Ver unius eſt alterius Autumnus, & ſic de Æſtate ac Hyeme loquendo. V. à Polis diverſis, & ab Æquatore æqualiter diſtant; ſicut etiam eundem habent Meridianum, ſed ſub diverſis Semicirculis. VI. Sidera uni perpetuò apparentia, alteri conſpiciuntur nunquam. Denique faciem ſimul convertentibus ad Æquatorem, uni oriſur Sol à dextris, alteri à ſiniſtris.

Caput Ultimum

De Structura & Partibus Planisphærij.

Partes Planisphærij à ſe invicem ſeparabiles ſunt potiffimum tres: I. Limbus exterior continens Circulum Meridianum, item Arcus Signorum & Menſium. II. Ob-

L

bia

bis Versatilis Limbo infertus, cui inscripti sunt Axis Mundi, & Æquator in suos gradus divisi, cum Signis, ac reliquis Parallelis Declinationum, Arcubus Horarijs, & Eclipticâ, per Lineam ellipticam repræsentatâ. III. Regula filo, & unione seu grano, secundum longitudinem fili hinc inde mobili instructa, & pro majori commoditate ac universaliori usu in suas partes divisa. His ob alias, etiam commoditates addimus Quadrantem, cum scalâ mille partium, Radio seu Semidiametro Planisphærij commensuratâ, & Triangulo pro gradibus in Eclipticam, & Arcubus Horarijs in cæteros Parallelos transportandis percommodo, de quibus omnibus singillatim, prout rei necessitas, & Constructionis Ordo postulabit, agemus.


De Limbo exteriori, Meridiano, Axe Mundi, Parallelis Zodiaci, necnon de Arcubus

Signorum & Mensuræ.

Quadratum Rectangulum æneum, vel alterius materiæ solidæ (quæ haud dubiè præstat chartaceæ, de qua postea) Opere tornatili ita aprè excaveretur, ut ei Orbis Versatilis, ac undique in gyrum mobilis
(su-

(suis tamen, ne è Limbo excidere possit, repagulis firmandus) exactè inseri queat. Tum Orbe eidem ita inserto, ac inibi, ut dictum, firmato, dividatur hic Circulus Meridianum & Colurum Aequinoctiorum referens, utpote transiens per puncta Aequinoctialia Eclipticæ, per duas diametros AB. & CD. perpendiculariter se invicem secantes in 4. Quadrantes, & horum quivis in 90. gradus, factò numerationis initio à duobus punctis lateralibus, asterisco * utrinque notatis, usque ad punctum summum & imum 90. quæ punctum Verticale Zenith, & oppositum Nadir repræsentant. Nisi autem divisio, præsertim prima in 4. Quadrantes sit exacta, dictæ duæ diametri, nim. Axis Mundi & Aequator, moto vel parùm aut mutato Orbe Versatili, suis gradibus minimè respondebunt. Cæterùm Linea AB. exhibet Axin Mundi, Colurum Solstitorum (transit enim per puncta Solstitialia Eclipticæ) Circulum Horæ 6. Horizontem in Sphæra Recta, & Circulum Verticalem in Sphæra Parallela; extremitates verò ejusdem referunt Polos Mundi, unde ordinariè etiam ad gradum Latitudinis Locì dati disponi debent. Altera verò Linea CD. repræsentat Circulum Aequinoctialem seu Aequatorem, item Circulum Verticalem

in Sphæra Recta, & Horizontem in Sphæra
Parallela.



Dividitur autem Linea Æquinoctialis
CD. in gradus 180. ita ut gradus 90. sit in
Centro Planisphærij, qui gradus partim
scribuntur supra dictam Lineam Æquino-
ctialem, ad denotandum Semicirculum à
puncto V. usque ad π . & totidem infra
can-

eandem usque ad 360. pro altero Semicirculo, qui intercedit inter \ominus . & \vee . qui tamen gradus non sunt inter se æquales, sed prope Centrum Planisphærij majores, versùs extremitatem verò, seu Limbum semper minores.

Hæc autem divisio in partes seu gradus inæquales institui potest I. Mechanicè, incipiendo v. g. à puncto \vee . & applicando Regulam ad gradus oppositos utriusque Quadrantis CA. & CB. nim. ad 1 & 1. 2 & 2. 3 & 3. &c. eos lineis occultis aut idealibus conjungendo, & intersectionis puncta in Æquatore notando, sicque procedendo per omnes gradus usque ad 90. Sufficiet autem divisionem hujusmodi fieri ex una parte Æquatoris; intercapedines enim horum graduum à Centro facillè transferri poterunt etiam in alteram partem Æquatoris, imò uno circini pede in Centro quiescente, eodem penitus labore etiam transferri poterunt in utramque partem Lineæ Axis, ob plurimos usus, de quibus in II. Parte dabitur dicendi locus.

II. Fieri poterit dicta divisio Trigonometricè, mediante Tabulâ Sinuum, & Scalâ Geometricâ 1000. partium RadioPlanisphærij commensuratâ, passim omnibus notâ, quam proptercâ in Schemate speciali debi-

re divisam Planisphærio superaddere volumus. Quoniam igitur in Tabula Sinuum Sinus Torus computatur pro 1000 0000. in nostra Scala verò tantum pro 1000. partibus, ideò de Sinu in Tabula invento semper ultimæ 4. cyphræ seu figuræ ad dexteram abijciendæ seu negligendæ erunt, reliquæ verò partes ad sinistram residuæ, ex Scala accipiendæ, & è Centro in Æquatorem transferendæ erunt. Sic v. g. pro I. gradu rejectis 4. figuris ad dexteram invenio 17. pro II. gradu, 34. pro III. gradu, 52. pro IV. gradu 69. & sic de reliquis loquendo usque ad 90. tot ergò partes ex Scala dicto modo è Centro in Æquatorem atque etiam in Lineam Axis transferri debent, eritque divisio graduum in Axe, & Æquatore absoluta; de reliquis enim Parallelis semper decrecentibus usque ad Polum, postquam modum illos in Planisphærio describendi dediderimus, dicemus.

Itaque pro Parallelis Signorum non solum per eorum injuria, sed & decimos, vel omnino quintos quosvis illorum gradus proportionè & magnitudine Planisphærij inscribendis, quare ex III. Tabula Declinationum in fine Opusculi ponendâ gradus ac minuta dictis Signorum initijs, ac decimis, vel quinq. quibusque eorum gradibus respondens.

dentia, & per hos gradus ex Tabula Declinationum excerptos, in Linea Axis duc rectas Æquatori parallelas, eruntque hæ Circuli seu Paralleli Signorum. Sic v. g. pro Parallelo transeunte per V. gradum V. in-

venio 2. o. pro gradu X. ejusdem invenio 3.

58. per hos ergò gradus & minuta in Linea Axis duco lineas ad Æquatorem parallelas, referentque istæ Parallelos transeuntes per V. ac X. gradum V. est sic de alijs. Pro Paralleliis verò extra Tropicos inscribendis (qui specialiter *Paralleli Stellarum* dici possunt) alio opus non est, quam ut per quintos aut decimos quosque gradus in Linea Axis notatos ducantur Rectæ ad Æquatorem parallelæ, ut in Schemate factum vides, Circuli autem Polares ducuntur per

66. 30. in Linea Axis à Centro, vel 23.

30. à Limbo, seu extremitate Axis computatos.

Denique in Limbo ducantur utrinque duo Arcus Meridiano paralleli, qui tamen sese ultra Tropicos non extendant, quorum duo Meridiano proximi EE. sint Arcus Signorum, exteriores verò FF. Mensium. Si

gnorum initia, eorumque gradus quivis decimi, aut quinti, facillimè notantur, si Æquatore Planisphærij ad Horizontem disposito, Paralleli Signorum suprà descripti applicatâ Regulâ extra Meridianum prolongentur per dictos Arcus Signorum, usque ad Arcus Mensium, quibus posterioribus etiam Menses facile inscribuntur, si juxta Tabulam hîc appositam eorum initia debitis

| Initio | Locus ☉ | Initio | Locus ☉ |
|-----------|---------|------------|---------|
| Januarij | 11 ♄ | Julij | 10 ♄ |
| Februarij | 13 ♁ | Augusti | 9 ♁ |
| Martij | 11 ♀ | Septembris | 9 ♀ |
| Aprilis | 12 ♀ | Octobris | 8 ♀ |
| Maij | 11 ♀ | Novembris | 9 ♀ |
| Junij | 11 ♀ | Decembris | 10 ♀ |

Signorum gradibus tribuantur, v. g. initium Januarij gradui XI. ♄. initium Februarij XIII. ♁. initium Martij XI ♀. &c. ubi obiter adhuc notandum est, Mensem Iunium ac Decembrem, in quibus circa vigesimum primum Solstitia accidunt, ita hîc dividi, ut altera cujusque pars in dextera, altera in sinistra Meridiani reperiatur, uti ex Schema-
te cujvis per se patet.

De

De Circulis Horarijs ,

Ecliptica, Regula, Triangulo,

& Quadrante.


Æquatore, ut supra, in suos gradus diviso, per se patet, Arcus Horarios per quindenos semper ejusdem gradus, semihorarios autem per $7\frac{1}{2}$. & Circulos qua-

drantis horæ per 3.45. Æquatoris transire debere. Quoniam verò Arcus Horarij ac semihorarij, vel etiam circuli quadrantis horæ saltem usque ad Circulos Polares per omnes Parallelos continuandi sunt, ob varios usus, de quibus in II. Parte dicemus, hi autem semper tantò minores evadant, quò remotiores sunt ab Æquatore, ideò ut dicti gradus & minuta etiam in ipsis inveniri possint, vel cuivis Parallelo peculiaris circulus describendus, ac in suos gradus & horas dividendus, vel Regula aurea adhibenda erit, dicendo: sicut se habet Radius Æquatoris 1000. ad Radium v. g. Tropicorum 917. qui

est Sinus 66. 30. sic Sinus horæ datæ ad distantiam puncti horarij in Tropiceis quæsitam. Quia verò uterque hic modus nimis laboriosus est, eadem puncta horaria sequenti viâ

longè commodiùs in quocunque Parallelo inveniri poterunt.

Fiat Triangulum æquilaterum ABC. cujus latera Radio Æquatoris exactè commensurentur. In unum igitur latus Trianguli v. g. ex A. versus B. transferantur gradus in Æquatore inventi, adscriptis eorum numeris 10. 20. 30. &c. perque eos ducantur rectæ coeuntes in C. Hoc facto transfer Radium, seu medietatem Paralleli dati v. g. Tropici ex puncto C. in utrumque latus Trianguli in D. & E. hæcque puncta Lineâ transversâ conjunge, in qua poteris non solum horarios cum semihorarijs & quadrantibus, sed & alios gradus quoscunque ex D. versus E. capere, & in dictum Tropicum à Linea Axis seu Linea H. 6. transferre, & sic de alijs Parallelis extra Tropicos descriptis loquendo.



Demum puncta horarum &c. in Parallelis dicto modo notata curvilineis aptè conjunge, & habebis Arcus horarios cum semihorarijs & quadrantibus desideratos.

Ubi

Ubi tamen adhuc obſervo I. gradus in Aequatore inventos eodem penitus labore, eademque circini aperturâ non ſolum ex Centro Planisphaerij in utramque partem tam Axis, quàm Aequatoris, ſed etiam in prædictum latus Trianguli transferri poſſe. II. Eodem modo, quo gradus inæqualium Parallelorum ex Triangulo inveniuntur, & in eos transferuntur, transferri etiam poſſe gradus pro deſcribenda Eclipticâ neceſſarios, juxta Tabulam ſequentem.

*Tabula inſcribendæ
Eclipticæ.*

| In Paral- lelos trans- euntres per | Gr. P | | Transfer ex Trian- gulo à Li- nea horæ 6. hinc inde | Gr. Min. |
|---|----------|----|--|----------|
| | 0 | 30 | | 0 0 |
| | 5 | 25 | | 5 27 |
| | 10 | 20 | | 10 53 |
| | 15 | 15 | | 16 17 |
| | 20 | 10 | | 21 39 |
| | 25 | 5 | | 26 57 |
| | 30 | 0 | | 32 12 |
| | | II | | |
| | | 4 | | |

| In Paral- lelos trans- euntes per | Ω | | Transfer ex Trian- gulo à Li- nea horæ 6. hinc inde | Gr. Min. |
|--|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|
| | $\frac{0}{5}$ | $\frac{30}{25}$ | | $\frac{32}{37}$ $\frac{12}{22}$ |
| | $\frac{10}{15}$ | $\frac{20}{15}$ | | $\frac{42}{47}$ $\frac{27}{29}$ |
| | $\frac{20}{25}$ | $\frac{10}{5}$ | | $\frac{52}{57}$ $\frac{25}{18}$ |
| | $\frac{30}{-}$ | $\frac{0}{8}$ | | $\frac{62}{-}$ $\frac{6}{-}$ |
| | | $\frac{8}{m}$ | | |

| In Paral- lelos trans- euntes per | m | | Transfer ex Trian- gulo à Li- nea horæ 6. hinc inde | Gr. Min. |
|--|-----------------|---------------------|--|---------------------------------|
| | $\frac{0}{5}$ | $\frac{30}{25}$ | | $\frac{62}{66}$ $\frac{6}{51}$ |
| | $\frac{10}{15}$ | $\frac{20}{15}$ | | $\frac{71}{76}$ $\frac{33}{12}$ |
| | $\frac{20}{25}$ | $\frac{10}{5}$ | | $\frac{80}{85}$ $\frac{49}{25}$ |
| | $\frac{30}{-}$ | $\frac{0}{15}$ | | $\frac{90}{-}$ $\frac{0}{-}$ |
| | | $\frac{15}{\gamma}$ | | |

In.

Incipiendo enim à 56. in proximum Parallelum, qui transit per quintum ejusdem

gradum, transfer 5. 27. in Tabula inventos à Linea horæ 6. in utrumque latus Paralleli, sicque pro Ecliptica describenda habebis duo puncta, nim. 5. gradum 56. ex una, & ex altera parte 25. gradum II. eâdem circini

aperturâ transfer etiam dictos 5. 27. à Linea H. 6. in utrumque latus Paralleli oppositi, qui scil. transit per 5 gradum P. & 25. P, quia eadem est dictorum 4. punctorum à Linea H. 6. distantia, sic etiam gradus in Ta-

bula inventi 10. 53. in Parallelum proximum in utroque hemisphærio, & in latus utrumque transfer à Linea H. 6. sicque denuò habentur 4. puncta, nim. 10. gradus 56. & 20. II. & pro Signis oppositis pariter 10. gradus P. ac 20. P & sic per omnes Parallelos procedendo, quæ puncta omnia si lineolis debite conjungantur, exhibebunt ellipticam, quæ hîc viam Solis Regiam, seu Eclipticam repræsentat.

Regula filo, & unione seu grano secundum longitudinem fili hinc inde mobili, ut supra diximus, instructa, ita utrique lateri Planisphærij adaptanda est, ut sive sursum sive deorsum mota, filum semper situm Horizonti parallelum server. Cæterum

eadem Regula, secundum spatium Radio seu Semidiametro Planisphærij correspondens in ordine ad plurimos usus, præsertim Trigonometricos, de quibus in II. Parte dabitur dicendi locus, utilissimè dividitur in centum vel mille partes æquales.

Denique de usu *Quadrantis* superaddici, Parte II. in primis statim Problematibus dicemus.

Illud tamen adhuc monitum velim Benevolum Lectorem, præstare, si Planisphærium ex materia solida v. g. ære, aurichalco, argento &c. præparetur; charta enim seu papyrus ad typum madefacta, ac denuò siccata, situm Schematis notabiliter variat, unde circino ac regulâ inter agglutinandum probè examinari, & parùm extendendo, vel ubi necesse fuerit, etiam contrahendo procurari debet, ut lineæ debitum situm ac figuram servent. Quia verò non est cujusvis, similia aptè tractare, ideò conabimur, ut hujusmodi Planisphæria jam debitè præparata justo pretio haberi possint. Et hæc de structura & partibus Planisphærij. Iam verò sit

PARS. II.


De Utilitate ac præstantia Planisphærij.

INcomparabilem Planisphærij nostri præstantiam satis commendabit ejusdem universalitas, facilitas ac utilitas ad quævis Problemata Mathematica, in quacunque ferè Materia per illud solvenda, uti ex sequentibus sole meridiano clariùs apparebit. Quia verò pleraque ex dicendis aliqualem saltem supponunt notitiam Sinuum, Tangentium, & Secantium, eorùmq; Tabularum, & Logarithmorum, idèd è re visum fuit, de his aliqua, quantum fieri poterit, breviter præmittere. De quibus sit

C A P U T I.

De Sinibus, Tangentibus, & Secantibus, eorùmq; Tabulis ac Logarithmīs.

PRænotandum itaque I. Licet nomine *Arcus* communiter intelligatur quævis pars circuli, siue major, siue minor sit semicirculo; hîc



ramen, ubi de Sinibus, Tangentibus, & Secantibus agitur, nomine *Arcûs* solùm venit segmentum Circuli minus semicirculo, quales in Figura apposita sunt imprimis quadrantes Circuli BD, DC, CE, & EB. item segmenta quadrante minora, ut BF, FD, vel quadrante majora, ut FDC, FBE, &c.

Prænotandum II. *Complementum Arcûs* dici illud, per quod Arcus differt, seu est major, vel minor quadrante. Sic *Complementum Arcûs* BF, quadrante minoris, est Arcus FD, & vicissim, quia in hoc differt Arcus minor à quadrante per defectum. *Complementum verò Arcûs* FDC, quadrante ma-

majoris est idem Arcus FD. quia in hoc differt à quadrante per excessum. Ex quo etiam patet, duos Arcus constituentes semicirculum, uti sunt BF. & FDC. habere idem Complementum commune FD. quia in hoc differt BF. per defectum, & FDC. per excessum à quadrante.

Prænotandum III. Id, quod dictum est de Arcu, ejusque Complemento, intelligendum etiam esse de Angulo & Complemento ejusdem. Arcus enim est mensura Anguli, ita ut Angulus rectus æquivaleat Arcui quadrantis, Angulus acutus autem Arcui quadrante minori, & Angulus obtusus Arcui quadrante majori. Hinc etiam Angulus FAD. erit Complementum commune Anguli FAB. & simul Anguli obtusi FAC. & sic de alijs.

Prænotandum IV. quæcunque imposteriorum de Sinibus, Tangentibus, & Secantibus Arcuum dicentur, etiam ad Angulos, quos Arcus subtendunt, extendenda esse.

Denique etiam prænotandum, Chordam cujusvis Arcus esse lineam rectam Arcui subtensam, & quæcunque aliam lineam rectam Circulo inscriptam, ita ut suis extremitatibus peripheriam præcisè tangat. Sic linea FH. erit Chorda, seu Subtensa tam respectu Arcus FBH. quam respectu Arcus FCH. ex quo etiam patet, Diametrum esse Chordam omnium maximam, quæ circulo

inscribi possunt. His præmissis jam de singulis in Titulo positis dicendum.

§. I.

De Sinibus, Tangentibus, & Secantibus.


S*inus* alius dicitur *rectus*, alius *versus*, & alius *Totus*. *Sinus rectus* alicujus Arcûs vel Anguli est linea recta ab una extremitate Arcûs ad Diametrum perpendiculariter ducta. Sic in Fig. præcedente *Sinus rectus* Arcûs BF. vel ejus Anguli BAF. est recta FI. & *Sinus rectus* Arcûs FD. qui est Complementum Arcûs BF. vel ejus Anguli FAD. est recta FK. diciturque *Sinus Complementi Arcûs*, vel, ut alij vocant, *Consinus*. Idem autem *Sinus* v. g. FI. est communis etiam alteri Arcui FDC. complenti semicirculum. Quia verò Linea recta ex Centro perpendiculariter ducta per Chordam, per 3. 3. Euclidis, dividit tam Chordam, quàm Arcum, cui Chorda subrenditur, in duas partes æquales; ideo omnis *Sinus rectus* erit dimidia pars Chordæ subtendentis duplum illius Arcûs, cujus dicitur *Sinus rectus*. Sic *Sinus rectus* FI. Arcûs BF. est dimidium Chordæ FH. subtendentis duplum Arcûs BF.

nim.

nim. totum arcum FBH. Hinc si scitur numerus partium Chordæ totius Arcûs, hoc ipso etiam scitur Sinus rectus dimidij talis Arcûs, & vicissim.

Sinus versus alicujus Arcûs vel Anguli est pars Diametri, comprehensa inter extremitatem Arcûs & Sinum rectum. Sic *Sinus versus* Arcûs BF. vel ejus Anguli BAF. est pars BI. Diametri BC. & *Sinus versus* Arcûs FDC. est pars Diametri IC. Unde sequitur, quod *Sinus versi* duorum arcuum BF. & FDC. constituentium Semicirculum, simul sumpti sint æquales Diametro. Imò potest etiam dici, quod *Sinus versus* alicujus Arcûs sit linea recta ab extremitate hujus Arcûs perpendiculariter ducta ad Sinum rectum ejusdem Arcûs. Ubi tamen duo adhuc observo, I. *Sinum versum* facile erui, si Sinus Complementi subtrahatur à *Sinu Toto*. II. quando simpliciter loquimur de *Sinu*, semper intelligi *Sinum rectum*.

Sinus Totus, qui & *Radius* appellatur, est Sinus quadrantis circuli, seu 90. graduum, & co-incidit cum Semidiametro, estque omnium Sinuum circulo inscribendorum maximus, & est Sinus communis utrique quadrantis, quem subrendit. Sic AB. est *Sinus Totus* tam quadrantis BD. quàm BE.



Tangens alicujus Arcus vel Circuli est linea recta, ab extremitate Arcus perpendiculariter ducta ad Diametrum ejusdem Arcus, & terminata in occurſu alterius rectæ ductæ à Centro per alteram extremitatē ejusdem Arcus. Sic *Tangens* Arcus BF. vel Anguli BAF. est recta BM. quia Arcum tangit in extremitate B. estque ad Diametrum perpendicularis, & terminatur in occurſu lineæ AM, ductæ à Centro per alteram Arcus extre-

tre-

tremitatem F. Sic eadem BM. est etiam *Tangens* Arcus BG. quia ipsum tangit in extremitate B. & insistit Diametro perpendiculariter, ac terminatur in occurſu rectæ MAG. ductæ per Centrum ad alteram Arcus extremitatem G. Eodem modo *Tangens* Arcus DF. est recta DL. quia tangit ipsum in extremitate D. estque Diametro ejusdem perpendicularis, ac terminatur in puncto concursus L. lineæ AL. ductæ à Centro A. per alteram Arcus extremitatem F. ac protractam in L.

Tangens Complementi est *Tangens* illius Arcus, qui dicitur Complementum. Sic quia Arcus FD. est Complementum Arcus BF. & Arcus FC. ideo sicut recta DL. est *Tangens* Arcus FD. ita dicitur etiam *Tangens complementi* utriusque.

Secans alicujus Arcus vel Anguli dicitur linea recta, quæ à Centro per alteram extremitatem Arcus ducta secat Tangentem. Sic *Secans* Arcus BF. vel ejus Anguli BAF. est recta AM. quia à Centro A. per alteram Arcus extremitatem F. ducta secat Tangentem in M. & *Secans* Arcus DF. vel ejus Anguli DAF. est recta AL. quia è Centro per alteram Arcus extremitatem F. ducta secat Tangentem in L. & quia Arcus DF. est Complementum Arcus BF. eadem AL. est simul *Secans Complementi*.

De his verò ulterius notandum venit I. *Tangentem* cujuscunque Arcus semper esse parallelum Sinui ejusdem Arcus; sunt enim ambo ad Diametrum perpendiculares.

Notandum II. *Tangentem* BM, quadrantis Circuli BD. posse produci in infinitum; cum enim sit parallela lineæ AD. nunquam ipsi occurreret, nec ab ea secabatur, idem est de Secante AD. ejusdem quadrantis BD. hæc enim quamvis protracta in infinitum, nunquam secabatur à Tangente BM. utpote sibi parallela.

Notandum III. omnem Sinum rectum, omnemque *Tangentem* & *Secantem* esse communem duobus Arcibus simul constituentibus 180. gradus, seu semicirculum. Sic clarum est, Sinum rectum FL. esse communem tam Arcui BF. quam Arcui FDC. Sic etiam *Tangens* BM. & *Secans* AM. est communis utrique Arcui prædicto.

Notandum IV. à magnitudine Sinus Totius dependere etiam quantitatem Sinuum non Totalium, *Tangentium* & *Secantium* cujuscunque Arcus, ita ut quò major vel minor est Sinus Totus, tantò etiam major vel minor sit tam Sinus, quam *Tangens* & *Secans*; & linea, quæ modò est Sinus, potest fieri *Tangens*, vel vicissim, mutato scil. Sinu Toto, sed non mutata proportionè. Sic enim recta FL, quæ

quæ modo est Sinus Anguli BAF. respectu Sinus Totius AB. poterit fieri Tangens ejusdem Anguli, respectu Sinus Totius AI. Nam si ex puncto A. ejusdem Anguli BAF. per punctum I. describatur Arcus IN. Tangens illius erit recta FI. quæ antea fuit Sinus, & per consequens AF. erit ipsius Secans, Sinus verò illius erit recta NO. Radio AI. perpendicularis, servatâ eadem penitus proportione. Hinc cognito semel numero partium, quas hæ lineæ continent, respectu certi aliquis Sinus Totalis, per Regulam Trium facile etiam cognosci poterit respectu alterius Sinus Totius cuiuscunque demum magnitudinis.

Notandum V. ex jam dictis, omnes Sinus rectos non Totales, intra quadrantem Circuli descriptos esse minores Sinu Toto, ita ut si tam Sinus Totus, quàm reliqui Sinus non Totales dividantur in partes æquales, quilibet Sinus non Totus pauciores partes contineat, quàm Sinus Totus, tantòque pauciores, quò magis à Sinu Toto remotus, seu quò minoris Arcus fuerit Sinus.

Sextò denique notandum est, Antiquos Geometras divisisse Radium, seu Sinum Totum in 60. partes, & quamlibet harum denuò in 60. alias minores partes æquales, seu minuta; quia tamen hic numerus 60. vel po-

ius 3600. partium, partim insufficiens est ad evitandos errores sensibiles propter fractiones negligi solitas, partim verò minus commodus propter numeros irrationales in ista supputatione ordinariè decurrentes, ideo Moderni ad evitanda prædicta incommoda longè plures partes Sinui Tori, seu Radio adjudicantes, eum ordinariè dividunt in 100000. imò etiam in 100000000. partes, & huic supposito insistentes supputare solent quantitatem Sinuum, Tangentium, & Secantium, ac desuper suas *Tabulas Sinuum, Tangentium & Secantium*, vel simpliciter *Tabulas Sinuum* appellari solitas, quæ passim venales inveniuntur, confecerunt, de quarum usu postea.

§. II.

De Natura Logarith-
morum.

Nemo ferè nescit, quantum in Mathematicis usum habeat Regula Aurea Trium, seu Proportionum, datis enim tribus quibuscunque numeris proportionalibus, facillimè invenitur quartus, ducendo scilicet secundum in tertium, & productum dividendo

do per primum, nam quotus ex hac divisione resultans est quartus numerus proportionalis quæsitus. Quoniam verò multiplicationes ac divisiones in magnis numeris (quales in Tabulis dant Sinus, Tangentes & Secantes) tædiosæ sunt & errori obnoxie, ideo Ioannes Neperus Nobilis Scotus singulari in universam Mathesim merito adinvenit, & anno 1614. vulgavit numeros quosdam artificiales, quos *Logarithmos* appellavit, quorum subsidio per solam additionem & subtractionem (laboriosæ multiplicationi ac divisioni substitutam) invenitur quartus proportionalis, tanto quidem compendio, ut mediantribus Logarithmis plures operationes & calculationes Astronomicas absolvere possimus intra horam, quam sine illis integro die. Hos numeros in Tabulas redactos, ac Tabulis Sinuum appositos, vocavit Author *Mirificum Logarithmorum Canonem*, quem postea excoluerunt, & partim auxerunt, partim aliter disposuerunt insignes Mathematici, nominatim Benjamin Vrsinus, Henricus Briggsius, Adrianus Ulaeus, Ioan. Keplerus, Cavalerius, Faulhaber, Philippus de Croy, Strauchius, Grûenbergerus, Ozanam, & alij, ubi Tabulas huiusmodi copiosissimas reperies, continentes non solum *Logarithmos Sinuum*, sed

insuper etiam *Logarithmos Tangentium*, *Mesa-Logarithmos* nuncupari solitos, & *Logarithmos Secantium*, qui *Temo-Logarithmi* vocantur. Ut autem tam utilis rei aliqualis saltem noticia habeatur,

Notandum est I. *Progressionem* in genere esse seriem numerorum æqualiter semper crescentium aut decrescentium; & siquidem illud incrementum vel decrementum fiat per additionem aut subtractionem continuam ejusdem numeri, ut 1. 2. 3. 4. 5. &c. priorem numerum semper augendo unitate, vel 1. 3. 5. 7. 9. &c. addendo semper binarium, dicitur *Progressio Arithmetica*; si verò fiat multiplicatione vel divisione per eundem semper numerum, quem *Exponentem* vocant, ut 1. 2. 4. 8. &c. 1. 3. 9. 27. &c. dicitur *Progressio Geometrica dupla, vel tripla* &c. Inter omnes autem *Progressiones* ad *Logarithmos* inveniendos optima videtur, quæ est omnium simplicissima, qualis inter *Arithmeticas* est prima, nimirum 1. 2. 3. 4. &c. inter *Geometricas* verò decimalis 1. 10. 100. 1000. 10000. &c. ita quidem, ut primus numerus *Geometricus* 1. pro *Logarithmo* habeat 0. secundus numerus *Geometricus* 10. pro *Logarithmo* habeat 1. tertius numerus *Geometricus* 100. pro *Logarithmo* habeat 2. & sic de reliquis, ordine, qui sequitur.

Pro-

| Progressio Geometrica. | Progressio Arithmetica. |
|------------------------|-------------------------|
| 1 | 00000000 |
| 10 | 10000000 |
| 100 | 20000000 |
| 1000 | 30000000 |
| 10000 | 40000000 |
| 100000 | 50000000 |
| 1000000 | 60000000 |
| 10000000 | 70000000 |
| 100000000 | 80000000 |
| 1000000000 | 90000000 |
| 10000000000 | 100000000 |

Ex hac autem Tabella Progressionum patet, Logarithmos in Progressione intermediis inter 1. & 10. esse meras fractiones unitate minores, & idè (ut ex Tabula Numerorum Vulgarium postea melius declarandâ videre est) omnes Logarithmi usque ad 10. incipiunt à 0. seu cyphra : similiter à 10. usque ad 100. omnes inchoantur ab 1. & à 100. usque ad 1000. à 2. & à 1000. usque ad 10000. à 3. & sic de ceteris secundum ordinem Numerorum vulgarium 1. 2. 3. 4. &c. qui propterea *Numeri Characteristici* Logarithmorum ab ipsis incipientium appellantur, & à reliquis puncto interposito separari solent, ut appareat, reliquas figuras ad
dex-

dexteram, positas esse fractiones decimales.

.Id autem, quod inventioni Logarithmorum occasionem dedit, est differentia inter Progressionem Arithmeticam & Geometricam. Nam in Arithmetica inter 4. numeros se invicem consequentes summa duorum extremorum semper est æqualis summæ duorum intermediorum, ut patet in his exemplis 1. 2. 3. 4. & 1. 3. 5. 7. in priori enim exemplo tam duo numeri extremi, quam intermedii, sibi invicem additi faciunt 5. in posteriori verò 8. Econtrà in Progressione Geometrica summa duorum extremorum semper est major summâ intermediorum, sic enim in hoc exemplo 1. 10. 100. 1000. summa numerorum extremorum facit 1000. intermediorum verò solummodò 110. Interim illud verum est, quod loco summæ, productum ex multiplicatione extremorum sit æquale producto ex multiplicatione intermediorum; nam in priori exemplo numeri intermedii multiplicati æquè faciunt 1000. ac numeri extremi. Hinc sicut ad invenendum quartum numerum proportionalem Geometricum, debent inter se multiplicari numerus II. & III. & productum dividi per primum, ita ad eruendum quartum numerum proportionalem Arithmeticum, debet e u-

nu.

numerus II. & III. ad se invicem addi, & à productò subtrahi primus; unde manifestum est, multiplicationem mutari in additionem, & divisionem in subtractionem, quando operamur per numeros Progressionis Arithmeticæ, qui respectu numerorum Progressionis Geometricæ, quos repræsentant, propter proportionem, quam inter se servant, *Logarithmi* vocantur.

Ut autem mira vis & efficacia Progressionis Geometricæ tantò luculentius appareat (loquendo solum de Progressione dupla, nihil dicendo de tripla, quadrupla &c. quæ incomparabiliter majus accipiunt incrementum) eam incidenter uno vel altero curioso exemplo breviter sic declaro.

Oeconomus quispiam de sua infidelitate convictus ac pœnitens, confitetur denique Iudici & Confessario, se Herum suum successivè notabiliter defraudasse, ab initio quidem per furta solum minuta, illa tamen indies per integrum mensem eâ ratione duplicando, ut prima die unum surripuerit nummum, alterâ duos, tertiâ 4. quartâ 8. quintâ 16. sextâ 32, &c. & sic in dupla semper proportionem progrediendo per dies 30. postea verò deprehensum destitisse, summam tamen ablatam se determinare non posse, sed malè partam iterùm dilapidasse.

Ut

Uc ergo tam Iudex, quàm Confessarius de gravitate damnificationis in casu positæ æquum iudicium ferre, & quivis scire possit, in quantum successive damnificationes etiam minutæ excrecere valeant, dico, eum ultra 4. milliones, nim. 4473924. florenos abstulisse. Veritas hujus calculi cuivis facile patebit, si incipiendo ab unitate priorem numerum semper duplicet, & hanc Progressionem duplam continuet per vices 30.

Aliud adhuc amplius exemplum sit, autem Regiam 60. cubiculis pretiosissime exornatis instructam dictâ lege venalem fieri, quo casu summa nummorum foret tanta, ut in crucigeros, florenos, ac denique aureos redactam, vigesies quinquies mille milliones equorum, si singuli tres centenarios auri ferrent, portare non possent. Ex quo colligitur, quanti pretij foret Palatium Vaticanum, quod, teste P. Bonanni in Historia Templi Varicani, ultra tredecim millia cubiculorum, complectitur. Incomprehensibilis autem quædam, ut ita dicam, prodibit infinitas graduum Gratiæ & Gloriæ, quibus Christus Dominus sanctissimam suam Virginem Matrem exornare dignatus est, si vera ponatur haud improbabilis quorundam Theologorum sententia, piè contendendum, eandem gloriosissimam Virginem Ma-

trem ratione luxæ Dignitatis ac eminentis Charitatis per singulos actus duplum prioris Gratia promeruisse.

Ut autem hypotheses hæcenus factas veris etiam exemplis declaremus, refert imprimis Crombecius lib. 1. Perfect. c. 36. Belgam quendam alteri equum suum eo pacto vendidisse, ut pro primo clavo ungulari solvere teneretur unicum granum frumenti, pro altero duo, pro tertio 4. pro quarto 8. & sic proportionem dupla progrediendo usque ad XXXII. clavum ungularem, atque summam granorum excrevisse ad 2147483648. quæ constituerunt 1239 scaphas frumenti; ubi tamen calculanti patebit, illum in clavo trigésimo primo computum suum finivisse, nec totam summam omnium 32. clavorum posuisse, quæ se extendit ad 4294967295. grana frumenti, quæ juxta superiorem computationem conficiunt scaphas à Crombecio usurpatas 2478 quarum unam 3. florenis æstimando equus constitisset 7434. florenis.

Alterum exemplum præbet nobis Ferdinandus Gonzalvus Comes Castiliæ, qui à Rege Sanctio Crasso tanquam Regni Legionensis Vassallus A. 958. citatus, secum detulit equum valde generosum, ac falconem dextrerrimum, quos ambos cum Rex appri-

me

mè affectasset, timens Comes, ne solutio diutius differretur, eâ lege certo pretio Regi venales fecit, ut pretium singulis diebus semper duplo augeretur, solutione ergò in septennium dilata, pretium præfati equi & falconis ita auctum est, ut omnes thesauri Hispaniæ ad illud redimendum impares extiterint; unde Rex satisfacere necessitatus, memoratum Castiliæ Comitatum ab omni ulteriore subjectione liberum declaravit. Sed de his satis, nunc ad priora redeamus.

§. III.

De usu Tabularum Sinuum, ac Logarithmorum.

NON vacat, hîc tradere modum construendi Tabulas; cùm enim hæ passim inveniuntur, & non minùs ac Calendaria faciliùs emanant, quàm conficiantur, ideò usum earum solummodò, & quomodo ea, quæ in Tabulis non continentur, denique erui, ac suppleri queant, quantum fieri potest, breviter hîc insinuabimus.

De.

Declaratio & Usus Prima Tabulae.

Duplicis generis sunt hae Tabulae. Prima continet Sinus, Tangentes & Secantes cum Logarithmis per singulos gradus ac minuta Quadrantis Circuli taliter disposita, ut duae facies se mutuo respicientes semper conficiant 90. gradus, & gradus ac minuta unius faciei sint complementum alterius, quod vel maxime commodum est pro praxi, ubi continuo occurrere solet necessitas Complementi Arcus, vel Anguli, quod tali modo absque ulla subtractione à 90. gradibus, eorumque minutis, e regione semper invenire est in pagina correspondente. Sic v. g. apparet, quod Complementum Arcus, vel Anguli 63. gr. & 24. min. sit 26. 36.

Porro qualibet pagina complectitur gradum dimidium, seu 30. minuta, quae adscripta inveniuntur in prima columna à sinistris, gradus vero in capite columnae, cum suis Sinibus, Tangentibus, & Secantibus,

N

quo

quorum Sinus Totus eſt .10000000. partium, qui ſicut in minoribus calculationibus, reſectis duabus cyphris ad dexteram poteſt accipi ſolum .100000. partium, ita etiam in quovis Sinu, Tangente, & ſecante tali caſu à dextris reſcindendæ erunt duæ figuræ ſeu numeri, qui proinde in hunc finem interpoſito puncto à prioribus ſeparari ſolent. Quod attinet ad Logarithmos, ut calculus tantò exactior evadat, ſupputantur iſti in ordine ad Sinum Totum adhuc pluriam, nempe 100000000. ſeu centum millionum partium. Ponuntur autem ordinariè ſolummodo Logarithmi Sinuum, & Tangentium, omiſſis Logarithmis Secantium, eò quòd in praxi etiam ſine iſtis totum negotium expediri, hique aliunde haberi facile poſſint, ut paulò poſt videbimus.

Dato igitur Arcu cum ſuis gradibus ac minutis, adeò facile eſt, ex Tabula ejus Sinum, Tangentem, & Secantem cum ſois Logarithmis, vel viciffim dato Sinu, Tangente & Secante, item Logarithmo Sinus vel Tangentis, Arcum illis convenientem invenire, ut præter Tabulæ inſpectionem, ulteriori declaratione minimè opus ſit. Aliqua tamen, quæ in ipſa Tabula non continentur, quâ ratione inveniri poſſint, perſequentes Propositiones lic dictas ad diſtinctionem reliquorum Problematum principalium indi-

tabimus. Et inprimis quidem, quia in Tabula non nisi minuta prima exprimuntur, sic

PROPOSITIO I.

Sinum quoad minuta etiam secunda invenire.

Sic v. g. inveniendus Sinus Arcus $30^{\circ} 20'$
 & $30''$. subtrahere ergo Sinum Arcus 30° . & $20'$
 à Sinu sequente proximè majori Arcus 30°
 21. min.

50528

50502 & habebis differentiam

26

Fiat ergo Regula Trium; si differentia unius minuti primi ab alio, seu 60. secunda, sunt 26. quid dabunt 30. & invenies 13.

quæ addita Sinui 30° . & $20'$. dabunt 50515.
 Sinum scilicet respondentem Arcui proposito

$30^{\circ} 20' 30''$. Idem modus operandi procedit etiam circa minuta prima aliarum Tabularum v. g. Ascensionum, Declinationum &c.

N a

ubi

ubi soli gradus Signorum, non autem minuta sunt expressa.

PROPOSITIO II.

Minutorum quoque secundorum Tangentes, Secantes, & Logarithmos calculare.

Quia modus operandi prorsus est idem cum priore, ideo hic repetere, vel ulteriora exempla asserre supersedeo.

PROPOSITIO III.

Quando Sinus vel Logarithmus datus in Tabula non continetur, Arcum seu gradum cum minutis suis primis & secundis illi convenientem eruere.

Detur Logarithmus Sinus 97736297.
eo proximè minor in Tabula erit 97735327.

eui respondent 36. & 25. proximè major
verò invenitur esse 97737039. conveniens

36. & 26. differentia verò inter utrumque
erit 1712. cum quæratur etiam differentia in-

inter Logarithmum datum, ac eo proximè minorem, quæ erit 970. His duabus differentijs habitis, fiat Regula Trium; si diffe-

rentia 1712. dat 60. differentia 970. dabit
//

34. Arcus itaque dato Logarithmo respon-
dens est 36. 25. & 34.

PROPOSITIO IV.

*Sinum Versum investi-
gare.*

Si Arcus minor est quadrante, subtrahe Sinum Complementi à Sinu Toto, Si verò est major, adde illum Sinui Toti, & productum erit Sinus Versus. Sic in Fig. appo-


sita Arcus BF. est 56. adeoque minor quadrante, cujus Sinus Complementi FK. invenitur in Tabula 55919. hunc subtrahe à Sinu Toto. 100000.

55919.

44081.

hocque residuum erit Sinus Versus BI. qua-
situs.

Quia verò Arcus FDC. Quadrante major est, ideò dictus Sinus Complementi 55919. ad Sinum Totum addendus erit, & produ-



Sum 155919. erit Sinus Versus IC. dicti Arcûs FDC. qui duo Sinus Versi simul sumpti, nim. BI. & IC. Diametro æquales sunt, adeoque conficiunt 200000.

PROPOSITIO V.

Logarithmum Sinûs Versi determinare.

Ex Logarithmo Sinûs dimidij Arcûs dati duplicato, subtrahere Logarithmum Semira-
diij.

dij, seu Logarithmum Arcûs graduum 30.
& habebis Logarithmum Sinûs Versi quæ-
situm. Sic in suprà posito exemplo Arcus
BF. est 56. graduum, & consequenter di-

midium hujus Arcûs 28. Log.^{us} Sinûs hujus
dimidij Arcûs 96716093. Ex hoc itaque du-
plicato, scil. 193432186. subtrahe Loga-

rithmum Semiradij, seu Arcûs 30. nim.
96989700. eritque residuum 96442486.
Log.^{us} quæsitî Sinûs Versi 44081. suprà in-
venti.

PROPOSITIO VI.

*Logarithmum dato Se-
canti respondentem assignare.*

A Log.^{mo} Sinûs Totius duplicato subtraha-
tur Log.^{us} Sinûs Complementi Arcûs proposi-
ti, eritque Log.^{us} Secantis talis Arcûs, Sic si

proponatur Arcus 25. invenies Log.^{um} Sinûs
Complementi ejusdem 99572757. hunc it. q;
Log.^{um} subtrahe à Log.^{mo} Sinûs Totius dupli-
cato 200000000. & residuum 100427243.
erit Log.^{us} Secantis, de quo quæritur.

Usus secundæ Tabulæ Logarithmorum.

TAbula secunda continet Log.^{mo} Numerorum Vulgarium seu Naturalium, sese ordinatè subsequentiū ab unitate usque ad 10000. qui numerus sufficit pro supputationibus ordinarijs, & absque errore notabili, juxta inferiùs dicenda, facile extendi potest ad 10000000. seu decem milliones.

Usus autem proprius Logarithmorum potissimū consistit in eo, ut propositis duobus vel tribus numeris, tertius vel quartus numerus proportionalis inveniatur per solam additionem & subtractionem, tædiosæ multiplicationi ac divisioni (in magnis præcipuè numeris) aliàs in Regula Trium adhibendæ, subrogatam.

In exemplo. Sicut se habent 4. ad 6. ita se habent 6. ad tertium numerum proportionalem, qui quæritur. Quemadmodum ergo aliàs multiplicari deberent 6. per 6. & productum dividi per numerum 4. primo loco positum, ita addendus, adeoque Logarithmus 07781512. numero 6. respondens duplicandus erit, & ab hoc duplo 15563024. subtrahendus Log.^{us} numeri 4. pri.

primo loco positi, nim. 06020600, & prodibit Log.^{us} numeri 9. seu tertij proportionalis quaesiti, videlicet 09542424.

Similiter datis 3. numeris, v. g. 25. 60. 120. quartum proportionalem invenies, nempe 288, si addantur Log.^{mi} numeri secundi & tertij, & à summa subtrahatur Logarithmus primi.

Ubi tamen adhuc observo, id, quod hactenus fieri vidimus per subtractionem Log.ⁿⁱ numero primo respondentis, posse etiam praestari per additionem *Complementi Arithmetici* ejusdem numeri primi, quod habetur, si à Sinu Toto simplici, vel etiam duplicato, si necesse erit, subtrahatur Log.^{us} numeri primi. Sic in exemplo horum trium proportionalium 2. 4. 6. si à Sinu Toto 100000000, subtrahatur Log.^{us} numeri primi 03010300. residuum 06989700. erit *Complementum Arithmeticum*, quod additum Log.^{us} numeri secundi & tertij hoc modo :

06020600,

07781512.

06989700,

20791812.

abjectâ unâ unitate in prima figura ad sinistram dabit Log.^{us} 10791812, respondentem quarto numero proportionali quaesito, nim. 12.

Porro sicut in Regula Trium inversâ aliâs multiplicandi sunt numerus primus & secundus, & summa dividenda per tertium, ita hîc Log.^m numeri primi & secundi addendi, & à summa Log.^{us} numeri tertij subtrahendus erit. In exemplo. 8. operarij absolvent opus 20. diebus, quor diebus absolvent illud 16. operarij? adde igitur Log.^{us} numeri primi & secundi, nim.

09030900.

13010300.

22041200.

& ab hac summa subtrahe Log.^{um} numeri tertij. 12041200. & remanebunt

10000000. qui est Log.^{us} numeri 10. eoridémque diebus 16. operarij absolvent opus.

Verbo, ubi operando per numeros simplices utimur multiplicatione, hîc eorum Log.^{us} addimus, & quando in simplicibus utimur divisione, hîc Log.^{um} Divisoris subtrahimus à Log.^{mo} numeri divideadi, prout sæpiùs jam insinuaturn est.

Ut autem ingens utilitas, ac mira facilitas Log.^{orum} tantò luculentius innorescat, utque ea, quæ in Tabula non reperiuntur, à quovis suppleri possint, rem sequentibus adhuc Propositionibus declarabimus.

PRO.

PROPOSITIO I.

*Duos numeros 10000. minores, a-
deoque in Tabula reperibiles, ope
Log.^{rum} inter se multiplicare.*

Quærantur in Tabula secunda Log.^{mi} duo-
rum numerorum propositorum, v.g. 145. &
62. & ad se invicem addantur; summa enim
ostendet è regione productum multiplicatio-
nis quæsitæ, nempe 8990. hoc modo,

$$145. \quad 21613680.$$

$$62. \quad \underline{17923917.}$$

$$8990. \quad 39537597.$$

Quid autem faciendum, si numerus eva-
dat major, quàm ut in Tabula inveniri pos-
sit, videbimus in Propos. 7. & 8.

PROPOSITIO II.

*Datum numerum quemcunque
10000. minorem pro lubitu per
Log.^{nos} dividere.*

A Log.^{mo} numeri dividendi subtrahæ Log.^{um}
Divisoris, eritque residuum Log.^{us} Quotien-
tis quæsitæ. In exemplo. Sit dividendus
num.

204 *De Ufu Tabularum Sinuum,*

numerus 4608. per Divisorem 32. A Log.^{mo}
itaque prioris 36635125.

subtrahatur Log.^{us} posterioris 15051500.

21583625.

eritque hoc residuum Log.^{us} Quotientis 144.
quæsitæ. Quod si tale residuum in Tabula
exactè non inveniatur, signum est adhæren-
tis fractionis, de qua infra in Propositione
9. & 10.

PROPOSITIO III.

*Ex numero 10000. minore Radicem
quadratam extrahere.*

Log.^{us} numeri dati dimidiatus, dat Log.^{um}
Radicis quæsitæ. Sic si Radix quadrata ex-
trahenda sit ex 9604. Log.^{us} ipsius est
39824522. hujus dimidiùm, scil. 19912261.
erit Log. Radicis 98. quæsitæ

PROPOSITIO IV.

*Datò numero, seu lineâ, ejus Qua-
dratum seu Aream assignare.*

Log.^{us} numeri dati 12. v. g. 10791812. du-
plica, & habebis Log.^{um} 21583624. cui re-
sponder Area seu Quadratum numeri 12.
nim. 144.

PRO-

PROPOSITIO V.

Ex dato numero Radicem Cubicam extrahere.

Tertia pars Log.^{um} numeri propositi dabit Radicem Cubicam. Sit v. g. ex 6859. extrahenda Radix Cubica; Log. illius est 38362608. & hujus tertia pars, nempe 12787536. dabit Radicem 19.

PROPOSITIO VI.

Dati alicujus numeri Cubum superputare.

Sit numerus propositus 12. hujus Log.^{um} 10791812. triplica, & productum 32375436. dabit 1728. Cubum scilicet numeri 12.

PROPOSITIO VII.

Numeri dati 10000. majoris Log.^{um} investigare.

Methodus sequens hoc præstandi non est quidem in rigore Geometrico undequaue exacta, attamen ab errore sensibili libera usque ad 10000000. est autem ista.

Sit

Sit inveniendus Log.^{us} numeri dati 3567894. qui cum suo Log.^{mo} haud amplius invenitur in Tabula Numerorum Vulgarium. Ab isto ergò numero rescindantur ultimæ tres figuræ ad dexteram 894. tot nim. ut residuum 3567. cum suo Log.^{mo} adhuc inveniri possit in Tabula prædicta, cujus residui Log.^{us} deprehendatur esse 35523031. Quia verò à numero dato 3567894. tres ultimæ figuræ, nim. 894. sunt ablatae, quæ residuum milles, ac insuper 894. vicibus augent, idèò imprimis quia 3. figuræ sunt ablatae, præfato Log.^{mo} addendus erit Numerus Characteristicus 3. qui juxta dicta illum auget mille vicibus, & sic habebitur Log.^{us} 65523031. qui respondet numero 3567000. ut autem insuper eruatut Log.^{us} pro 894. rescissis, subtrahendus est Log.^{us} 35523031. numeri 3567. à Log.^{mo} proximè majori immediatè sequente 35524248. numeri 3568. & restabunt 1217. quæ est differentia de 1000. sicut differentia numerorum 3567000. & 3568000. est etiam 1000. Jam dico per Regulam Trium; si 1000. dant 1217. quid dabunt 894. & prodibunt 1087. quæ addita Log.^{mo} 65523031. numeri minoris 3567000. dabunt Log.^{um} 65524118. respondentem numero proposito 3567894. quæ Propositio quia in multis servire poterit, idèò per plura exempla se in

ea exercere perutile erit, quemadmodum etiam in tribus sequentibus.

PROPOSITIO VIII.

Log.^{mo} dato numerum respondentem assignare.

Pro exemplo reassumamus Log.^{um} in præcedenti Propositione inventum 65524118. Quia in re

Observandum I. productum numeri simplicis inquirendi semper debere continere unâ figurâ plures, quàm indicat Numerus Logarithmi Characteristicus. Sic quia Characteristicus Log.^{mi} dati est 6. numerus Log.^{mo} respondens debet constare 7. figuris.

II. Quia Log.^{us} datus in Tabula non invenitur, mutandus est primus Characteristicus 6. in minorem adhuc in Tabula reperibilem, nim. in 3.

III. Quia etiam hic Log.^{us} 35524118. exactè in Tabula non continetur, ideò à proximè majore 35524248. subtrahendus est proximè minor 35523031. & habetur differentia I. nim. 1217.

IV. A Log.^{mo} dato 35524118. subtrahitur proximè minor, 35523031. erisque differentia II. 1087.

V. Fi.

V. Fiat Regula Trium ; sicut se habet differentia prima 1217. ad secundam 1087. ita se habent 1000. (quæ indicantur per Characteristicum 3. de novo assumptum) ad numerum inquirendum ; videlicet :

1217. 1087.

1000.

1087000.

qui divisus per numerum primo loco positum , nempe 1217. dabit 894. proximè.

VI. Denique quærat, quis numerus vulgaris Log.^{mo} dato 35524118. vel saltem proximè minori respondeat, & occurrent 3567. his si ad dexteram annectantur 894. ultimò inventi, prodibit numerus 3567894 Log.^{mo} dato respondens , qui erat inquirendus.

PROPOSITIO IX.

Fractionis propriè dictæ Logarithmum invenire.

Per *Fractionem propriè dictam* intelligitur illa , cujus Numerator minor est Denominatore, uti est $\frac{2}{3}$. $\frac{3}{4}$. $\frac{2}{5}$. &c. quando verò Numerator major est Denominatore, ut $\frac{15}{4}$. $\frac{10}{3}$. &c. dicitur *impropriè dicta*. De priore itaque loquendo, pro exemplo ponamus hanc fractionem $\frac{2}{3}$. Subtrahatur ergò Log.^{us} Numerato-

ris

ris 2. nimirum 03010300. à Log.^{mo} Denominato-
ris 5. nempe 06989700. & residuo præpo-
natur signum defectivum — hoc modo:

06989700.

03010300.

———— 03979400.

Ratio est, quia licet fractio $\frac{2}{5}$. data sit quo-
riens divisionis, in qua 2. esset de jure nu-
merus dividendus per divisorem 5. quia ta-
men numerus dividendus est minor divisore,
ideò Log.^{us} minoris ex majore subtrahen-
dus, & signum defectivum --- præponendum
erit. Cum enim fractio sit minor, quàm
unitas, cujus Log.^{us} est 0. etiàm fractio ne-
cessariò numerum minorem, quàm 0. ha-
bebit pro suo Log.^{mo}; sicut qui duos habe-
ret nummos, & deberet creditori suo 5.
non tantùm nihil, sed minùs nihilo, habe-
ret residuū, quia si haberet adhuc 3. solutio-
ne factâ nihil ipsi remaneret. Eodem modo
apparebit, quòd hæc fractio $\frac{3}{5}$. pro Log.^{mo} ha-
beat — 01249387. hæc $\frac{2}{5}$. verò — 01760913.

PROPOSITIO X.

*Dato numero integro cum fractione
adhærente, convenientem
Log.^{um} assignare.*

Numerus datus v. g. 25 $\frac{3}{4}$. reducendus est ad fractionem improprie dictam, cujus Numerator sit major Denominatore, ducendo scil. Denominatorem 4. in numerum integrum 25. & producto 100. addendo Numeratorem 3. stabitque fractio hoc modo $\frac{103}{4}$. Tum operare, ut in Problemate præcedente, subtrahendo nim. Log.^{um} Denominatoris 4. à Log.^{mo} Numeratoris 103. videlicet :

20128372.

06020600.

 14107772.

eritque hoc residuum Log.^{mo} quæſitus, attamen haud amplius defectivus seu negativus, ut in Problemate præcedente, sed affirmativus absque præpositione signi defectivi, quia scil. fractio improprie dicta est major unitate. Ubi tamen adhuc observo, posse fractiones diversissime instrui, ac proinde plures numeros integros cum suis fractionibus

bus annexis habere eosdem Log.^{os} Sic v. g. in exemplo Problem. 7. hi numeri 3567²94. vel 356789¹/₁₀. vel 35678¹/₁₀₀. vel 3567¹/₁₀₀₀. vel 35678¹/₁₀₀₀₀. vel 35¹/₁₀₀₀₀₀. vel 3¹/₁₀₀₀₀₀₀. eosdem habent Log.^{os} solo Numero Characteristico excepto, quem suprà §. II. paulò post Tabulam Progressionum diximus, à reliquis figuris puncto interposito separari solere, ut appareat, reliquas figuras ad dexteram positas esse fractiones decimales. Sic Log.^{us} primi numeri erit 6.5524118. secundi 5. 5524118. tertij 4. 5524118. quarti 3. 5524118. quinti 2. 5524118. sexti 1. 5524118. ac septimi denique 0. 5524118.

His itaque de utraque Tabula Sinuum ac Log.^{orum} pro faciliore dicendorum intelligentia, & expeditiore sequentium Problematum resolutione præliminariter præmissis, ad materiam hic nobis ex instituto præfixam redeundum est, Sit itaque

C A P U T II.

Usus & utilitas Planisphærij per plurima Problemata Astronomica, Gnomonica, Geographica, ac præsertim Trigonometrica demonstratur,

HÆc antequàm proponamus, in paucis

cis præmonitum velim benevolum Lectori.

I. In fine Opusculi non ſolùm reperiri Tabulas in ſequentibus operationibus neceſſarias, ſed inſuper etiam tradi modum, eaſdem pro quacunque demùm Locorum Latitudine conficiendi.

II. Præmoneo, Tabulas Declinationum Eclipticæ, Altitudinum Solis, Aſcenſionum, & Azimuthorum &c. paſſim extantes, in minutis præſertim, non convenire; tum quòd diverſi Authores circa Declinationem maximam, Altitudinem Poli certi cujuſdam Locì, cui ejusmodi Tabulæ accommodatæ ſunt, & ſimilia, diverſa ſupponant principia; tum quòd minuta ſecunda ordinariè negligantur; tum etiam quòd idem ſubinde Author ejusmodi Tabulas nec ſibi ipsis conſtantes, vel ipſos aliquando errores in Typographia, vel calculo admiſſos ex diverſis conſcribat. Unde etiam

III. Operanti juxta Regulas pro reſolutione ſequentium Problematum tradendas mirum videri minimè debet, ſi calculus cum Tabulis fortè ad manus habitis minùs exactè concordet, non quia Regula fallit, ſed quia ſubinde Logarithmi neceſſarij, ac inter minuta prima intermedij, in Tabulis præciſè non reperibiles, atque adeò minuta
ſec,

sec. neglecta, præsertim ubi plures operationes interveniunt, hujusmodi discrepantiam parere possunt.

IV. Præmoneo, Tabulas Locorum Solis v. g. vel Lunæ in Zodiaco, & similes, ordinariè construi pro tempore meridiano; unde si operatio pro alia diei hora instituenda est, ratum temporis haud negligendum erit.

V. Si addendus vel subtrahendus est v. g. Log.^{us} Sinûs Totius (quod ne continuò in sequentibus reperi debeat, hîc universaliter præmonitum velim) alio opus non est, quàm ut tali Log.^{mo} à sinistris addatur unitas, vel inde auferatur, si est subtrahendus. Quòd si Log.^{us} jam habeat præfixam unitatem, & addendus sit Sinus Totus, duplicandus erit primus numerus; vel si subtrahendus sit Sinus Totus, & Log.^{mus} habeat præfixum numerum binarium vel ternarium, iste una unitate minuendus erit.

VI. Numerus graduum communiter notari solet parvulâ Nullâ, ut vocant, minuta prima verò unâ virgulâ, & minuta secunda duabus &c. hoc modo:

o / //

42. 23. 36.

id est, quadraginta duo gradus, viginti tria minuta prima, & triginta sex secunda; si

O 3

ve-

verò calculus se extenderet ad tertia, quarta &c. minuta, hæc 3. vel 4. virgulis notanda forent.

VII. Ut ij, qui Tabulas Sinuum ac Logarithmorum non statim ad manus habent, interim se tam in prædictis de Usu earundem, quàm in Problematis Logarithmicè solvendis aliquo liter exercere possint, alijs Tabellis in fine Opusculi ponendis, addemus saltem partem Tabularum Sinuum per omnes gradu, & quinta quæque Minuta, quoad Numeros vulgares verò usque ad 1000.

Denique antequàm ad Problemata Nostra Logarithmicè solvenda progrediamur, quadam quasi præliminaria partim scitu utilia, partim etiam necessaria, attamen non nisi operationes simplices requirentia, præmittenda censui, ut Benevolus Lector facilioribus hisce jam affluens, ad difficiliora adhuc securura tantò lubentiùs animum & operam impendat. Sit itaque

PROBLEMA I.

Diem ingressus Solis in singula Signa, atque etiam gradum Signi quovis die determinare.

Ad hoc serviunt sequentes versiculi :

In

*Incluta Laus iustis Impenditur, Hæresis Horret :
Grandia Gesta Gerens, Felici Gaudet Honore.*
Duodecim hæc dictiones 12. Mensibus, ser-
vato eorum ordine, tribuuntur, prima scil.
Januario, secunda Februario &c. ubi sola
earum litera initialis, quorum in Alphabeto
locum obtineat, attenditur; sic enim F.
ponitur in Alphabeto sexto loco, G. septi-
mo, H. octavo, I. nono &c. Signa autem,
quæ Sol quovis mense ingreditur, facile te-
neri memoriâ poterunt, si Martio (tanquam
anni Astronomi. principio, ut I. Parte
c. 4. de Zodiaco observavimus) tribuatur
V. Aprili 8. Majo II. &c. juxta ordinem
Signorum, tritis illis versiculis *Sunt Aries,
Taurus* &c. indicatum. Si ergo diem ingres-
sus Solis in singula Signa ex prædictis versi-
bus eruere cupias, subtrahe numerum literæ
initiali mensis dati competentem ex 30. &
residuum indicabit, quo die mensis Sol Si-
gnum mensi dato respondens ingradientur.

Pro exemplo universali, quo in reliquis
etiam Problematibus utemur, ponamus hic
Monachij (ubi Elevatio Poli communiter
judicatur 48.) Solem commorari in 23. 17.
44. Q. uti factum fuit in die tam gloriose,
quàm prodigiose in Hungaria patræ contra

Turcas Victoriæ, quæ fuit 16. Augusti anni elapsi 1717. ubi Declinatio Solis erat 13.

47. 16. In hoc igitur exemplo, vocis *Gesta* littera initialis est septima in Alphabeto; subtrahere itaque 7. ex 30. & ex residuo 23. colligere dabitur, Solem mense Augusto ingredi Signum M , die 23. Augusti.

Quod si etiam gradum Signi quovis die dato scire desideres, v. g. die 16. Augusti in exemplo posita, huic numero 16. adde 7. quia Littera initialis vocis *Gesta* est septima in Alphabeto, & habebis 23. quod indicia erit, dictæ diei 16. Augusti respondere 23. Ω , in quo Sol eo die commoratur.

In Planisphaerio

Pater vel solum inspicienti Arcus Signorum & mensium in utraque extremitate positos, quibus mensium diebus initia & decades Signorum respondeant.

Minuta tamen hæc scrupulosius rimari non convenit, tum quia Instrumentorum similitudine angustia hoc non permittit, tum quia motus Solis in Zodiaco continuo variat; cum

cum enim uno die non integrum Eclipticæ gradum absolvat, sed 360. ejusdem gradibus permeandis 365. dies cum 5. horis ac 49. horæ minutis insumat, Sol ingressum suum in Signa non eodem die quotannis exactè parat, cum ultra 365. dies in anno Solari 6. fere horæ, ut dictum, residuæ sint, quæ singulis 4. annis integrum diem proximè conficiunt, & ideo in annis Bissextis post diem intercalarem (qui circa 24. Februarij contringit) diei mensis dato semper unus addendus. De quo sic

PROBLEMA II.

Quisnam annus Bissextilis sit, dicto citius enuntiare.

Ex numero anni propositi neglectis duabus primis figuris, solæ duæ ultimæ ad dexteram dividantur per 4. si nihil superfuerit, annus erit Bissextus, qualis v. g. fuit annus 1716. quia 16. per 4. divisus nihil remanet; econtrà in anno currente 1718. remanent 2. quod signum est, secundum abhinc annum nim. 20. denuò fore Bissextilem. Ratio est facilis, quia quattus quisque annus erit Bissextus, ita tamen, ut tres semper centesimi

anni, nim. 1700. 1800. 1900. usque ad quadringentesimum (qualis erit 2000. & sic deinceps) à Bissextis essent exempti.

PROBLEMA III.

Quotus gradus cujusvis Signi incidat in Calendas, seu initium singulorum mensium ?

Ex primo Problemate constat, quoto die mensis Sol singula Signa ingrediatur; si ergo insuper sciatur, quot dies quivis mensis contineat, facile erit numerare gradus Signi usque ad I. diem sequentis mensis inclusive. Sic enim ex dictis habetur, Solem ingredi xx. die $23.$ mensis Augusti, si ergo insuper sciam, eundem mensem habere 31. dies, haud difficile erit divinare, in primum diem Septembris cadere nonum gradum xx. Ut autem memoriter teneri possit, quot dies quivis mensis contineat, duæ potissimum viæ suppetunt; una nim. per Versus memoriales sequentes:

Ter denos September habet, totidemque November,

Iunius, Aprilis: reliquis superadditur unus.

Sit nisi Bissextus, videnos Februus octo.

Altera via memoriter id ipsum tenendi est per digitos hoc modo. Manus sinistrae pollicem, digitum medium, & auricularem erectos tene, reliquos verò duos, nimirum indicem & annularem intra volam manûs deprime. Dein more Astronomorum menses anni numerare incipe à Martio, eos ordine prosequendo per singulos digitos, ac denuò incipiendo à pollice, quousque numerus mensium fuerit absolutus.

Menses igitur, qui cadunt supra digitos erectos, habent 31. dies, qui verò contingunt digitos intortos seu depresso, continent dies 30. Februario excepto, qui in anno communi solum habet 28. in Bissexto autem 29. dies.

Exinde autem incidenter eruitur

PROBLEMA IV.

Quovis tempore, quot septimanis distet dies aliquis Festus, vel Natalis, & in quam hebdomada diem incidat, nullo negotio memoriter supputare.

Cùm ex præcedenti Problemate constet, quot dies quivis mensis contineat, haud difficile erit numerare dies, qui à die dato usque ad Festum propositum intercedunt; hanc enim

enim ſummam ſi divides per 7. productum dabit hebdomadas, & reliquum hebdomadæ dies.

In exemplo: hodie (v. g. die Sabbati incidente in 18. Septembris) ſcire cupio, quot ſeptimanis, ac hebdomadæ diebus, adhuc diſtet Natalis Chriſti Domini, incidens in 25. diem Decembris? Numero ergo dies adhuc reliquos hujus menſis Septembris, & invenio

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|
| pro Octobri | • | • | • | • | 12. |
| pro Novembri | • | • | • | • | 31. |
| pro Decembri | • | • | • | • | 30. & |
| pro Decembri uſque ad dictum Feſtum - 25. | | | | | |

98.

quæ ſumma ſi dividatur per 7. productum dabit 14. dico ergo: hodie poſt 14. ſeptimanas erit Feſtum prædictum Nativitatis Domini; cùm enim ultra 14. hebdomades nullus dies remaneat, ſignum eſt, illud cadere in diem Sabbati, ſicut & dies Sabbati datus erat pro initio numerationis. Quod ſi ultra productum 14. hebdomadum, reliqui fuiſſent dies 1. 2. vel 3. ſignum fuiſſet, quod dictum Nativitatis Feſtum caderet 1. 2. 3. diebus poſt diem Sabbati, adeoque in diem Solis, Lunæ vel Martis &c.

In Planisphærio

Licet dicta summa etiam erui, & dies septeni in Arcu mensium à præfato 18. Septembris usque ad 25. Decembris numerari denique possint, negotium tamen istud propter indiscernibilitatem partium in similibus Instrumentis, facilius dicto modo, & curiosius memoriter absolvitur.

PROBLEMA V.

Dato loco Solis, etiam diem mensis elicere.

Patet ex dictis in Probl. I. si enim scio, quotus gradus Signi sit hoc vel illo die mensis, hoc ipso etiam scio, quotus dies mensis congruat huic vel illi gradui Signi. Sic in nostro exemplo, sicut ad eruendum gradum Signi v. g. Ω . diei mensis 16. addimus 7. Literæ initiali vocis *Gesta* respondentia, ita ad eruendum diem mensis à gradu Signi 23. dicta 7. subtrahenda erunt, & prodibit dies 16. mensis.

In Planisphærio

Hæc duo (dies mensium, & Signa
il.

illis respondentia) iuxta se posita per se illucescunt.

PROBLEMA VI.

*Loco Solis , vel cuicunque dato E.
clipticæ puncto, punctum oppositum
determinare.*

Potest hoc Problema in pluribus supputa-
tionibus Astronomicis habere usum, in quo-
vis enim Sphæræ situ , uno gradu Signi ori-
ente , vel ascendente , aut medium cœli
tenente , alter illi oppositus occidet, vel de-
scendet , aut imum cœli occupabit. Si-
gnum autem, vel gradum Signi oppositum
invenies , si à Signo dato , juxta ordinem
Signorum, numeres 6. Signa; sextum enim
à Signo dato (idem est de gradibus ejusdem)
erit ejus oppositum. Qua in re plurimum
juvare poterit , si Signa notis illis versibus :
Sunt Artes , Taurus , &c. comprehensa sibi or-
dinate superposita scribas hoc modo :

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| ♈. | ♉. | ♊. | ♋. | ♌. | ♍. |
| ♎. | ♏. | ♐. | ♑. | ♒. | ♓. |

Sic enim quodvis Signum alteri sibi opposito
congruet.

In Planisphærio

Facillimè invenitur ; Regula enim dato Eclipticæ puncto v. g. 20. gradui 8. ac simul Centro Planisphærij applicata absceindet in altera Eclipticæ parte 20. gradum III. illi oppositum, & sic de alijs.

PROBLEMA VII.

*Altitudinem Solis, ac Stellarum
quovis tempore venari, & num ante
vel pomeridiana sit, perscrutari,*

Licet hoc Problema immediate ac directè Planisphærium nostrum non concernat, quia tamen Altitudo Solis vel Stellarum ad multa Problemata inde solvenda præsupponitur, & quia Instrumentum Quadrantis non cuius ad manus est, idè Schema Quadrantis addito Triangulo, & Scalâ Geometrica 1000. partium, semidiametro seu Radiò Planisphærij commensuratis, tam ad constructionem, quàm usum ejusdem percommodis (de quibus suo loco) specialiter addere volumus, quatenùs Planisphærio ex altera parte, vel etiam particulari asserculo pro cujusvis commoditate agglutinari que-

224 *Usus & utilitas Planisphærij*

at. Problema autem propositum sic solvendum est. Quadrantis penduli (qui quod major est, & quod exactius in suis gradus divisus, eo est melior) Centrum obverte Soli vel Stellis, eumque tamdiu eleva, ac deprime, donec per utrumque pinnacidium vel radient, vel conspiciantur, & filum in limbo Quadrantis monstrabit altitudinem quæsitam. Eadem altitudo haberi potest, si Quadrans stabilis erigatur perpendiculariter supra Horizontem, & planum ejus dirigatur versus Solem vel Stellas, ac Dioptra elevetur ac deprimatur, donec Sidus ejusmodi per utrumque pinnacidium vel radiet, vel videatur.

Quod si Sol non luceat, attramen obscuram aliquam sui imaginem in nubibus relinquat, hanc per pinnacidia conspiciendam observa, & altitudinem illius prope verum invenies. Si insuper scire cupias, num altitudo Solis quæsitæ sit ante-vel pomeridiana, annota altitudinem prius repertam, & post aliquod temporis intervallum eandem observationem deinde institue; & si quidem prior numerus graduum minor fuerit posteriore, certum signum esse debet, Solem Meridiem nondum esse affecutum, si verò est major, judicare poteris, Solem à

Mea

Meridie jam iterum descendere versus Occidentum.

Ubi tamen utiliter adhuc observandum est
I. Cum Sol in pinnacidio remanere divari-
catis radijs quendam sui discum effigiare so-
leat, debere Quadrantem ita dirigere, ut fo-
ramen pinnacidij non marginem, sed cen-
trum disci occupet, alias 15. facile minutis
aberrabis, qualium 30. circiter latitudo di-
sci importat. Hinc etiam est II. quod, si
Sol absque pinnacidij solummodo latus
Quadrantis radere permittatur, de numero
graduum observatorum 15. minuta detrahi
debeant. III. Hoc modo posse etiam discum
Solis apparentem observari, finim. circino
distantia unius pinnacidij ab altero accipia-
tur, & descripto arcu latitudo disci in re-
motiore pinnacidio efformari in arcum
transferatur; patebit enim, eam (dedu-
cta tamen foraminis amplitudine) dimidia-
um circiter gradum occupare. IV. Notan-
dum, refractionum etiam (quarum Tabu-
lam inter alias ad finem Opusculi dabimus)
minuta, praesertim de mane, minimè ne-
gligenda, sed de altitudine observata subtra-
henda esse.

Porro, quomodo hora diei nota eadem So-
lis altitudo tam per Log.^{ica}, quam ex ipso
Pla-

Planisphærio haberi possit , infrà dabitur dicendi locus.

PROBLEMA VIII.

Ex radijs Solis altitudinem illius meridianam indagare.

Quadrantem erige stabilem supra, & secundum Lineam meridianam (de cujus inventione ac utilitate fusiùs egimus l. Parte c. 4. & infrà adhuc ulteriùs agemus) de reliquo operare modo suprà dicto.

PROBLEMA IX.

Maximam & minimam altitudinem Solis meridianam , quam semel in anno habet , ex radijs ejusdem cognoscere.

Aliquot diebus ante , & post utrumque solstitium cape altitudinem Solis meridianam modo suprà dicto , & ex inventis facile erit, maximam & minimam eligere.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli datam disposito , idipsum gradus Meridiani ab utroque Tropico abscissi ad oculum monstrabunt,

PRO.

PROBLEMA X.

*Altitudinem Solis meridianam ex
Declinatione ejusdem cognoscere.*

Declinationem Solis , quæ in nostro
exemplo fuit 13. 47. 16. in Signis Boreali-
bus (quale etiam est Ω) adde Comple-
mento altitudinis Poli 42. (in Australibus
subtrahe) & invenies altitudinem Solis me-
ridianam ibi fuisse 55. 47. 16.

In Planisphærio

Idispum deprehendes , si attendas , quem
gradum in Meridiano Parallelus datus at-
tingat. Vel numera ab Æquatore sursum ,
datam Declinationem Solis in Signis Borea-
libus , in Australibus verò deorsum.

PROBLEMA XI.

*Datâ altitudine Solis meridianâ
& Declinatione ejusdem , altitudi-
nem Poli evincere.*

In Signis Borealibus (quale etiam est
P 2 Ω in

Ω. in nostro exemplo) subtrahe Declina-
 tionem Solis v. g. 13. 47. 16. ab altitudine
 ejusdem meridianæ 55. 47. 16. in Australi-
 bus verò adde, & habebis Complementum
 Elevationis Poli 42. consequenter & ipsam
 Poli Elevationem 48.

In Planisphærio

In nostro exemplo ab altitudine Solis
 meridianâ 55. 47. deorsum numera gradus
 Declinationis 13. 47. & incidēs in dictum gra-
 dum Complementi 42. à quo si sursum nu-
 meres gradus usque ad Zenith 90. habebis
 48. pro Elevatione Poli. Econtra in Si-
 gnis Australibus ab altitudine Solis me-
 ridiana numera Declinationem Solis sur-
 sum.

PROBLEMA XII.

*Ex maxima & minima altitudine
Solis meridiana Elevationem Poli
relicere.*

Sit data maxima altitudo Solis v. g.
^{0 /} apud nos 65. 30. & minima ^{0 /} 18. 30. Si ergo
Summa utriusque dimidietur, eruntur 42.
pro altitudine Æquatoris, & per consequens
pro altitudine Poli, cujus illa est Comple-
⁰ mentum, 48. utpote qui simul constituunt
90. gr.

In Planisphærio

Per se pater, medium inter ambos
Tropicos (in quibus contingit maxima &
minima Solis altitudo) tenere Æquatorem.

Si ergo Tropicus ϖ . disponatur ad 65. 30.
quæ ponitur esse maxima Solis altitudo, al-
ter Tropicus φ . indicabit minimam, nim.

18. 30. *Æquator* occupabit dictos 42. *Axis*
verò mundi 48. ſeu *Elevationem Poli* quæ-
ſitam.

PROBLEMA XIII.

*Ex altitudine Solis meridiana
Declinationem ejusdem divinare.*

Ex altitudine Solis meridiana, v. g. in no-
ſtro exemplo 55. 47. 16. ſubtrahere in Signis
Borealiſus, quale eſt Ω . *Complementum*
altitudinis Poli, & productum 13. 47.
16. dabit *Declinationem* quæſitam. In
Auſtraliſus verò datam Solis *altitudinem*,
v. g. in γ . 18. 30. ſubtrahere à *Complemento*
Elevationis Poli, & productum dabit 23.
30. *Declinationem* ſcilicet, quæ inquitur.

In Planisphærio

Ita diſpoſito, ut *Æquator* *Horizonti*
con-

congruat, in Signis Borealibus ab Æquatore sursum numerentur gradus usque ad Parallelum Solis datum, vel in Signis Australibus deorsum, & apparebit, in nostro exemplo Declinationem Solis esse 13. 47.

// 16. in 7. verò 23. 30.

PROBLEMA XIV.

Datâ Declinatione deprehendere etiam locum Solis in Zodiaco.

Derur Declinatio Solis 13. 47. Si ergò Sol est in primo Quadrante Eclipticæ Verno, qui nim. comprehendit prima 3. Signa V. 8. III. deprehendes, Solem commorari in 7. gradu 8. Si in secundo Quadrante Æstivo, ut in nostro exemplo, erit in 23. 8. si in tertio Quadrante, erit in 7. gradu III. ac denique si in quarto, erit in 23. gradu III. & sic de alijs.

In Planisphærio

Ita disposito, ut Æquator cum Horizonte coincidat, id ipsum ad oculum patebit.

PROBLEMA XV.

Data Hora nostrate invenire Ho-
ram Italianam.

Prænotandum, Horas Astronomicas
 24. numerari à media nocte denuò usque ad
 mediam noctem (alijs eas eodem modo à
 Meridie iterùm in Meridiem numerantibus)
 easque convenire in horarum numero cum
 nostratibus usque ad XII. meridianam, quâ
 finitâ nos denuò incipimus numerare I. II.
 III. &c. Astronomi verò numerare pergunt
 XIII. XIV. XV. &c. usque ad XXIV. Un-
 de notâ horâ nostrate hæud difficile erit
 scire horam Astronomicam. Itaque inven-
 te horæ Astronomicæ addo horam Ortûs, &
 habebis horam Italianam currentem.

Ponamus in nostro exemplo Solem oriri
 horâ V. nos verò agere horam III. pomeri-
 dianam; quæ est III. post Meridiem,
 adeoque XV. Astronomica; addo ergò 5. ad
 15. & invenio XX. Italianam, & sic de alijs. Vel
 quia Itali ab Occasu numerant horas 24.
 ita ut proximè sequentes de nocte sint I. II.
 III. &c. numera elapsas ab Occasu, & ha-
 bebis Italianam. Ubi tamen notandum est,
 ho.

horas huiusmodi non habere sedem fixam, sed sicut Sol modò serius, modò citius occidit, ita eas quoque serius aut citius numerationis suæ initium sumere.

In Planisphærio

Eodem modo numeratio horarum Italicarum institui potest, ita ut hora Occasus (ubi nim. Parallelus Solis datus fecat Horizontem) sit XXIV. proxime verò sequentes de nocte sint I. II. III. &c.

PROBLEMA XVI.

Horam Babilonicam reperire.

Quæ respectu Italicarum de Occasu diximus, eodem modo intelligenda sunt respectu Babilonicarum de Ortu, à quo si horas elapsas usque ad horam datam nueres, habebis horam Babilonicam currentem. Vel locò additionis in præcedentè Problemate adhibite, utere subtractione, subtrahendo nim. horam Ortus ab hora Astronomicâ inventâ, v. g. in priori exemplo subtrahendo 5. à 15. & inuenies II. X. Babilonicam.

In Planisphærio

Eodem modo inſtitue numerationem Babilonicarum, ita ut hora Ortus ſit XXIV. ſequentes verò de die ſint I. II. III. &c. ſicut ſuprà de horis Italicis reſpectu Occaſus diximus.

PROBLEMA XVII.

Ex data hora Babilonica, vel Italica Noſtratem colligere.

Horæ Babilonicæ datæ v. g. in priori exemplo X. adde horam Ortus, quæ ibi ponebatur eſſe hora V. & habebis horam Aſtronomicam à media nocte XV. conſequenter III. pomerid. noſtratem. Ab hora Italica verò XX. in ſuperiori exemplo, ſubtrahæ dictam horam Ortus, ac denuò prodibit XV. Aſtronomica, vel III. noſtras pomeridiana.

In Planisphærio

Ab Ortu numera H. X. Babilonicam, & incidet in III. noſtratem. Pro Italica verò

ab Occasu numera horas 20. & pariter
offendes III. pomerid. nostratem,

PROBLEMA XVIII.

*Horas Judaicas, Antiquas, Pla-
veterias, seu Inaequales quoad quan-
titem calculare,*

Cur Horæ istæ diversa hæc sortitæ sint
nomina, patet ex dictis P. I. c. 4. de Meri-
diano. Harum numerantur 12. de die ab
Ortu usque ad Occasum, ac totidem de no-
cte ab Occasu usque ad Ortum. Qui ergo
quantitatem harum Horarum (quæ in Æsta-
te de die sunt longiores, & tantò breviores
de nocte, & econtrà in Hyeme breviores de
die, & longiores de Nocte) scire desi-
derat, Arcum diurnum aut nocturnum in
minuta horaria resolutum, in 12. vel semi-
diurnum in 6. partes æquales dividat, & ha-
bebit intentum. Sic in nostro exemplo
prouit inferiùs in Probl. XLI. videbimus,
dies est longus 14. horas circiter, quæ sum-
marim in minuta horaria resolutæ dant 840.
hæc verò per 12. vel quoad Arcum semidi-
urnum per 6. divisa tribuunt uni horæ Inæ-
quali seu Judaicæ de die 70. de nocte verò 50.
minuta horaria.

In Planisphærio

A puncto Ortus ☉. numera 6. Horas nostrates, & sextam partem residui usque ad Meridiem adde Horæ nostrati, vel sextam partem excessus ultra Meridiem subtrahere ab Hora communi, & habebis tali die quantitatem Horæ Inæqualis. Sic in nostro exemplo si numeras ab Hora Ortus V. sex Horas nostrates, pervenies ad H. XI. sextam ergo partem Horæ adhuc residuæ usque ad Meridiem, nim. 10. minuta adde Horæ nostrati, & habebis 70. minuta pro una Hora Inæquali illius dies.

PROBLEMA XIX.

Datâ Horâ nostrate, resolutâ in Babilonicam vel Italicam, Judaicam assignare.

Ponamus H. III. pomerid. nostratem, quæ juxta Probl. XVI. in Babilonicam resoluta erit X. vel Italica XX. Nam fiat Regula Trium, v. g. in nostro exemplo, ubi Longitudo diei fuit circiter 14. horarum, hoc modo. Si-
cut

cut se haber Longitudo diei 14. H. ad 12. ita hora Babilonica v.g. 10. ad horam Judaicam inveniendam, & invenio $8\frac{8}{12}$ seu $4\frac{2}{3}$. id est, H. VIII. Judaicam cum dimidia circiter. De nocte verò fiat, ut Longitudo noctis v. g. 10. hor. in eodem nostro exemplo ad 12. ita H. 8. Italica ad Judaicam, & evenient $9\frac{6}{10}$. vel $3\frac{3}{5}$. id est H. 9. Judaica cum 36. minutis horarijs.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli disposito, filum promove ad punctum, ubi Parallelus Solis datus, nim. 23. Ω . in nostro exemplo, Meridianum attigerit, id est, ad gradum altitudinis Solis meridianæ 55. gr. 47. minut. ibique granum seu gemmulam fige. Tum filum Regulæ retrahe ad punctum, ubi Parallelus Solis Arcum v. g. H. III. pomer. nostratis (seu in dato casu X. Babilonicæ) interfecat; & Æquatore ad punctum Verticale 90. collocato, filum indicabit Horam Judaicam tunc currentem, eâ tamen lege, ut H. VII. incipias numerare primam, & H. VIII. secundam &c. de nocte verò primam incipias numerare H. V. &c. invenies enim, ut suprà, Horam Judaicam IX. cum

26. min. Quia tamen hic operandi Modus cum Calculo prius adhibito non undequaque exactè concordat, ideò qui voler, poterit saltem horas ab Ortū usque ad III. v. g. pomeridianam nostratē numerare, ac de reliquo uti modo sequenti.

PROBLEMA XX.

*Ex Hora nostrate, independenter à
Babilonica vel Italica, Judaicam
deducere,*

In nostro exemplo Sol oritur H. V. consequenter ab Ortū usque ad H. III. pomeridianam nostratē intercedunt 10. horæ, quæ universim in minuta horaria resolutæ dant 600. minuta; hæc verò si per 70. uni Horæ Inæquali respondentia (ut ex Probl. 18. constat) dividantur, prodeunt 8 $\frac{1}{2}$. & per consequens, quando nos agimus H. III. pomerid. erit H. Judaica VIII. cum $\frac{1}{2}$.

In Planisphærio

Operare, ut prius,

PRO.

PROBLEMA XXI.

Ex Judaica Nostratem colligere.

In nostro exemplo præcedente uni horæ Judaicæ respondent 70. minuta horaria; ergo 8. horæ Judaicæ cum $\frac{1}{2}$ seu 40. min. universim in minuta resolutæ dant 600 minuta, quæ divisa per 60. uni horæ Nostrati convenientia dant 10. horas, H. X. autem ab Ortus est apud nos H. III. pomeridiana,

In Planisphærio

Iuxta dicta in Problemate XIX. præcedente, granum seu gemmam fige in puncto altitudinis meridianæ 55. gr. 47. min. & Sphærâ rectificatâ, filum reduc ad punctum, ubi gemma monstrat horam VIII. Judaicam cum $\frac{1}{2}$. quo facto Planisphærium denuò dispone ad Elevationem Poli, si-
lūmque in Parallelo Solis dato, nim. 23. Ω .
abscinder H. III. Nostratem.

PRO-

PROBLEMA XXII.

*Vigilias Noctis Antiquarum, &
Quadrantes Diei ipsis respondentes
supputare.*

Harum Vigiliarum frequens fit mentio in Scripturis; unde, postquam de horis Iudaicis egimus, non inconueniens erit, eas hic ex communi sensu Authorum paucis declarare. Antiqui ergo (Iudaei praesertim) tam diem, quam noctem in 4. partes, 3. semper horis constantes, diuiserunt. Has de nocte *Vigilias*, de die verò *Horas Orationis*, vel simpliciter *Horas* appellabant, juxta illud v. g. Lucae 12. Si venerit, Dominus, in secunda Vigilia, & si in tertia Vigilia venerit, & in quarta inuenierit, beati sunt servi illi &c. I. Itaque Vigiliam noctis constituebat spatium illud primarum 3. horarum post Solis Occasum. II. Vigiliam complectebantur proximæ 3. horæ usque ad medium noctis; III. Vigilia includebat 3. horas immediatè sequentes mediam noctem; ac denique IV. Noctis Vigiliam conficiebant ultimæ tres horæ noctis ante Ortum Solis. Binum verò Galli cantum, de quo S. Marcus commemorat, quod

quod attinet , primus solet contingere circa medium noctis, alter verò ante Auroram seu Crepusculum, licet Gesnerus etiam tertium adstruat 3. horis ante mediam noctem. Quantum ad 4. partes seu Quadrantes diei, erant eæ *Horæ præsum*, Tubæ sonitu pios ad Templum convocantis, indicari solitæ, sicut Aët. 3. *Petrus & Joannes ascenderunt in Templum ad Horam Orattonis nonam &c.* Quilibet hujusmodi diei quadrans, sicut & Noctis, licet 3. contineret horas, teste S. P. Aug. ser. 14. de Verbis Domini, & ipse dicebatur ab Antiquis *Hora*, primus quidem quadrans diei ab Ortu usque ad Tertiam Judaicam, seu Nonam nostratem matutinam, constituebat horam *Primam*; alter à Tertia usque ad sextam, seu Meridiem vocabatur *Tertia*; Tertius verò quadrans à Meridio seu Sextâ Judaicâ usque ad Tertiam pomeridianam nostratem à sui principio dicebatur *sexta*; ac denique à Nona Judaica usque ad duodecimam, seu à Tertia pomeridiana nostrate usque ad Occalum erat *Hora Nona*. Totum ergo spatium 3. horarum ab uno clangore Tubæ ad alterum appellabatur *Hora III. VI. IX. &c.* Hinc quando S. Ioannes Christum crucifixum dicit quall horâ sextâ, S. Marcus verò horâ tertiâ, teste Natali Alexandro in c. 19. Joannis, communior & verior eos reconciliandi modus est, ut dicatur, Crucifixionem contigisse

Q

gisse paululum ante H. VI. seu meridiem, ut desumitur ab adjecta particula *quasi*, & consequenter adhuc intra spatium H. III. licet finis ejusdem jam instaret, immineretque signum Tubæ ad Horam Sextam. Quod autem S. P. Augustinus l. 3. de Consensu Evangelistarum c. 13. dicat, Judæos H. III. Christum crucifixisse linguâ, clamoribus nim. instando, ut crucifigeretur, H. VI. verò manibus militum, ac ipso opere, licet modus exponendi textus ad speciem dissonos Literalis non sit, ob Authoris tamen præminentiam omnibus venerationi esse merito debet.

Ex istis igitur, & cognitis juxta prius dicta Horis Iudaicis, nulli difficile esse poterit, *Horas* hujusmodi Antiquorum *diurnas*, aut *Vigilias Nocturnas* supputare.

PROBLEMA XXIII.

*Quantitatem Domuum Cœlestium
quovis tempore divinare.*

Cum Domus Cœlestis, ut ex dictis l. parte c. 5. de Circulis Positionum constat, sit sexta pars diei. vel noctis, alio hic opus non est, quam ut Arcus tam diurnus, quam

nocturnus in 6. partes dividatur. Cum ergo in Problemate 18. posuerimus Arcum diurnum continere 840. minuta, hæc per 6. divisa, pro una Domō relinquunt 140. minuta horaria, adeoque tunc temporis spatium unius Domūs diurnæ complectetur 2. horas nostrates cum tertia parte unius horæ, tantoque minores tunc erunt Domus nocturnæ, cum una eo casu plus non contineat, quam $1\frac{1}{2}$. hor. Cæterum quæ de Horis Inæqualibus (quarum duæ semper unam Domum constituunt) Problematibus præcedentibus diximus, facile huc etiam applicari poterunt. Id unum hic repeto, quod loco supra citato de Circuli Positio-
 hum jam insinuatū est, ordinem nimirum Domum Cœlestium esse inversum, ita ut in Ortū sit finis Domūs XII. proximus verò Circulus versus Imum Cœli sit finis Domūs I. & initium II. & sic retrogrediendo versū mediam noctem, ubi est initium Domus IV. hinc ad Occidentem, tanquam initium Domūs VII. inde verò versū Medium Cœli, ubi est initium Domūs X. & hinc denuo ad Orientem, tanquam finem Domum Cœlestium, ut dictum.

In Planisphaerio

Quantus sit Arcus diurnus, habetur ex Problemate XVIII. quota autem sit Domus, modus inveniendi tradetur in Problemate sequenti.

PROBLEMA XXIV.

In quota Domo Cœlesti Sol commoretur, ex Hora Judaica dicere.

Datam Horam Judaicam v. g. Nonam divide per 6 & provenient $4\frac{1}{2}$. talisque erit Domus ab Ortū versū Occalum numerata de die; de nocte vero ab Occasu versū Ortum.

Quod si verò insuper scire cupias, quota sit Domus juxta modum eas numerandi communem, vide, quot Domus usque ad sextam ultra inventas $4\frac{1}{2}$. supersint; seu quod idem est, inventum dimidij $4\frac{1}{2}$. subtrahe à sex, & videbis restare $1\frac{1}{2}$. has adde Occalui, seu Domui VII. & exinde apparebit, reipsa tunc esse Domum VIII. cum di-

dimidia. De nocte verò Horam Judaicam v. g. IX. dicto modo per 2. divisam subtrahere à Domo Occasus VII. & residuum indicabit Domum II. cum dimidia.

In Planisphærio

Operatio est penitus eadem cum operatione Problematis XIX. nisi quòd horà sextà numeranda sit Domus I. versùs mediam noctem, & horà quartà matutinà Domus II. horà secundà verò noctis Domus III. ac denique horà duodecimà noctis IV. & sic de reliquis, ita ut horà VI. vespertinà veniat Domus VII. & in Meridie Domus X. &c.

Vel:

Planisphærio ad Elevationem Poli disposito filum promove ad punctum, ubi Parallelus Solis Arcum Horæ Judaicæ datæ intersectat, ibique gemmulum fige, quæ Aequatore in puncto Verticali 90. collocato, & priori Numerationis modo servato, Domum desideratam monstrabit. Factà ergo prædictà operatione, ac Domuum numeratione prodibit Domus quæ sita, nim. octava cum dimidia.

PROBLEMA XXV.

*Datâ Latitudine loci, in quoto is
Climate ſit, invenire.*

Modum calculandi Climate dedimus
ſuprà Parte I. c. 5. de Climatibus; qua de
re conſuli etiam poteris Tabula ~~XIII~~ in fine
Opusculi.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli datam v. g. Mona-
cenſem diſpoſito numera, quot quadrantes
horæ in Tropico \odot , contineantur à linea
Horæ 6. uſque ad punctum Ortûs, & de-
prehendes octo horæ quadrantes nondum
completos, adeoque ſcies, Monachium
pariter eſſe ſub Climate 8. nondum com-
pleto.

PROBLEMA XXVI.

*Cognito Climate hoc ipſo ſcire eti-
am diem longiſſimum, & viciffim.*

Utra ea, quæ I. cit. diximus, cùm qua-
drans

dians horæ manè & vespèri, adeoque ante & post Sextam faciat horam dimidiam, 8. ferè quadrantes taliter dabunt 8. ferè dimidi-
as horas, & per consequens 4. ferè horas in-
tegras, quæ si addantur ad 12. horas Æqui-
noctij, evenient 16. ferè horæ pro die lon-
gissimo nostrate.

In Planisphærio

INDEX
Res patet ad oculum ex operatione præ-
cedente.

PROBLEMA XXVII.

*Tres Sphæræ positiones in Planis-
sphærio facillimè exhibere.*

Æquatorem pone sub puncto verticali 90.
& exhibebis Sphæram rectam; si Axim sub co-
dem puncto 90. colloques, Sphæram Paralle-
lam; ac denique si Axim disponas ad datum
quendam gradum Elevationis Poli interme-
dium inter Verticem & Horizontem v. g.
ad gradum 48. Elevationis nostratis Sphæram
Obliquam, de quibus diximus Parte I. c. 4.
de Horizonte.

PROBLEMA XXVIII.

*Initium & finem Crepusculorum
investigare.*

De hac re diximus Parte I, c. 4. de Horizonte.
Calculationem insinuabimus infra, ubi age-
mus de altitudine Solis.

In Planisphaerio

Filum pone 18. gradibus infra Horizon-
tem, & intersectiones fili, & Paralleli So-
lis dati monstrabunt initium ac finem, &
consequenter etiam durationem Crepuscu-
lorum quæsitam.

PROBLEMA XXIX.

*Gradus Aequatoris in horas con-
vertere, & vicissim.*

Per calculum fit hæc conversio, compu-
tando 15. gradus pro una hora, unum gra-
dum verò pro 4. minutis horarijs, atque
addeò 15. minuta unius gradus pro uno horæ
mi-

minuto. Hujus rei Tabulam invenies in fine, quæ erit **XVII.**

In Planisphærio

In Ascensionibus rectis numera à principio **V.** gradum datum, & Arcus horarius ibi transiens indicabit horam quæsitam. In exemplo; quære ibidem v. g. gradum **75.** & invenies H. **V.** consequenter **75.** gradus **Æquatoris** æquivalent **5.** horis.

Quia verò sæpè contingit, ut differentia Ascensionum v. g. Solis & Lunæ superet quadrantem, vel etiam semicirculum, ideò addo sequens exemplum. Si v. g. peteretur, quot horas efficerent gradus **300.** tunc post H. **XII.** perge numerare **13. 14. 15. &c.** & reperies horas **20.** quoties nimirum **15.** gradus uni horæ competentes continentur in **300.**

PROBLEMA XXX.

*Datâ horâ Astronomicâ, reperire gradum Eclipticæ Culminantem, unde
que etiam Ascensionem rectam Medij*

Cæli.

Prænotandum **I. Medium Cæli, Gradum Culminantem, seu Mediationem & Culminationem**

nem puncti ellipticæ, vel ſtellæ ibidem com-
morantis, nihil aliud dicere, quàm pun-
ctum ejusmodi exiſtere in Meridie.

Prænotandum II. id quod ſuprà Proble-
mate 15. jam advertimus, horas Aſtronomi-
cas 24. numerari etiam à Meridie in Meridi-
em, prout eas hic ſumere oportet.

Itaque ad Problema reſpondendo, Aſcen-
ſioni rectæ Solis adde Horam Aſtronicam
datam in gradus converſam, & ſumma da-
bit Aſcenſionem rectam Mediæ Cœli. In
noſtro exemplo Horam Aſtronicam v. g.
XXI. (ſeu Nonam matutinam noſtratam)
in gradus converſam, nim. 315. adde Aſcen-

ſioni rectæ 145. 38. dabunt 460. 38 inde
verò deductis 360. (quod ſemper fieri debet,

quando productum iſtus, 360. id eſt, inre-
grum Circulum excedit) remanent 100.

38. quibus ex Tabula Aſcenſionum recta-
rum infra in fine ponenda, reſpondere vide-
bimus 9. 46. 30. proximè.

In Planisphærio

A Loco ☉. (in noſtro exemplo 23. 30.)

in Linea Ascensionis rectæ, seu Æquatore,
numera Horam Astronomicam datam, nim.
XXI. (computando 15. gradus pro una hora)
& habebis gradum Eclipticæ tunc culminan-
tem, videlicet. 9. 46. 33.

PROBLEMA XXXI.

*Data Ascensione recta Medij Cœ-
li, vel Gradus Culminantis eruere
Horam Astronomicam.*

Ab Ascensione recta Medij Cœli, auctâ
360. si necesse est, subtrahere Ascensionem re-
ctam Solis, & residuum in horas conversum
dabit Horam Astronomicam quæsitam. Sic
in priori exemplo Ascensio recta Solis fuit
145. 38. & Ascensio recta Medij Cœli 100.
38. ab hac igitur Ascensione Medij Cœli
100. 38. auctâ 360. nim. à 460. 38. subtra-
here Ascensionem rectam Solis 145. 38. & re-
siduum erit 315. qui in horas conversi dabunt
Horam Astronomicam XXI. seu IX. mat.
nostratem.

In Planisphærio

A puncto Aſcenſionis Rectæ Solis 145.

38. numera in Æquatore uſque ad punctum

Medij Cœli 100. 38. ſecundùm ordinem graduum, gradus interceptos, & invenies

315. qui in horas converſi dabunt Horam Aſtronomicam XXI quæſitam. Vel: numera ab uno dictorum terminorum ad alterum 15. gradus, quories potes, & invenies eundem numerum XXI.

PROBLEMA XXXII.

Dato gradu Culminante, & diſtantiâ ſtellæ à Meridie præterito, indagare Aſcenſionem Rectam.

Ab Aſcenſione Medij Cœli, ſeu Culminatione Sideris, auſtâ 360. gradibus, quando pro ſubtr. ctione faciendâ neceſſe eſt, ſubtrahæ diſtantiâ Sideris à Meridie, & reſiduum erit Aſcenſio Recta.

Sic

per Problemata demonstratur. 253

Sic in nostro exemplo Culminatio juxta

Probl. XXX. fuit 100. 38. Ab hac ergò au-
cta 360. subtrahe distantiam Solis à Meridie
præterito 315. & residuum eris Ascensio Re-

cta 145. 38.

In Planisphærio

A puncto Culminationis 100. 38. numera
in Equatore contra ordinem graduum di-
stantiam Solis à Meridie, nim. 315. 0. &
incides in gradum 145. 38. Ascensionis Re-
ctæ quæsitæ.

PROBLEMA XXXIII.

*Data Culminatione & Ascensione
Rectâ Solis, determinare distantiam
ejusdem à Meridie præterito.*

A Culminatione data v. g. 100. 38. (aut
360. si alias subtractio fieri nequit) adde-
que

que à summa 460. 38. subtrahe Ascensionem Rectam Solis 145. 38. & productum 315. dabit distantiam à Meridie præterito ; seu Horam Astronomicam Solis XXI.

In Planisphærio

A puncto Culminationis 100. 38. ut antea ; numera contra ordinem graduum Ascensionem Rectam Solis 145. 38. & occurrant 315. quæ est ipsa distantia à Meridie præterito , seu Hora Astronomica XXI.

PROBLEMA XXXIV.

Data distantia alicujus Sideris à Meridie præterito , horam Noctis cognoscere.

Distantia Stellæ à Meridie præterito in Planisphærio facile cognoscitur , si filum Regulæ promoveatur ad gradum Altitudinis Stellæ in Limbo per Quadrantem v. g. observatæ ; tunc enim filum in parallelo Stel-

læ abscinder horam, seu distantiam à Meridie, ita quidem, ut si Stella sit in parte Occidentali, ipsa hora pomeridiana tunc occurrens sit petita distantia; si verò sit in parte Orientali, tunc horæ per filum indicatæ, addendæ sint horæ 12. ut habeatur distantia à Meridie præterito.

Huic itaque distantie in gradus convertæ, adde Ascensionem Rectam ejusdem Stellæ, in Tabula Ascensionis ac Declinationis Stellarum insigniorum in fine Opusculi reperibilem, & habebis Culminationem; quæ si excedat 360. his subtractis residuum erit Culminatio.

Ab hac autem Culminatione si denuò subtrahatur Ascensio Recta Solis, provenient gradus, qui in horas redacti indicabunt Horam Astronomicam à Meridie præterito, & per consequens ipsum tempus Noctis.

In exemplo, sit v. g. Altitudo Lucidæ Aquilæ, per Quadrantem observata, 40. graduum. Filum itaque gradui 40. in Limbo applicatum in Parallelo Declinationis ejusdem Stellæ nim. 8. grad. versùs Septentrionem abscinder paulò plus quàm quadrantem supra H. II. pomeridianam, quæ proinde juxta dicta, cum Stella fuerit in parte Occidentali, simul erit Hora Astronomica Sideris, absque addito 12. horarum,

quæ

quæ in gradus redacta dat 35. 34. estque ipsa
Stellæ distantia à Meridie præterito.

Huic si addatur Ascensio recta Stellæ 294.

dabit summam 329. 34. adeoque ipsam Cul-
minationem. Inde verò subtractâ denuo

Ascensione recta Solis 145. 38. residuum

183. 56. in horas conversum, indicabit
H. XII. Noctis cum 15½ minutis.

In Planisphærio

A dicto gradu distantia Stellæ à Meridie

35. 34. numerata in Aquatore secundum ordi-
nem graduum Ascensionem rectam Stellæ

294. & incidet in 329. 34. quæ erit ipsissima
Culminatio.

Ab hac si ordine retrogrado numeres A-

scensionem rectam Solis 145. 38. occurrent

183. 56. qui in horas conversi dabunt dictam
H. XII. Noctis cum 15½ minutis.

PRO-

PROBLEMA XXXV.

Data Altitudine Stellæ, ejusque Azimutho à Meridie, detegere ipsam Stellam.

Habita exactè Lineâ meridianâ (de qua Inveniendâ diximus suprâ parte I. c. 4. de Meridiânò, & adhuc dicemus inferiùs) facile eruitur Azimuth , si gradus Anguli , quem radius Stellæ cum dicta Linea meridianâ efformat , debite observetur.

Jam itaque Axe Planisphærij in verticè constituto , filum applica ad Altitudinem

Stellæ v. g. 40. gradum verò firmâ in gradu distantie Azimuthalis à Meridie , quæ

hic observata est 48. 43. cum Sphærâ ad Elevationem Poli reductâ , filum indicabit Parallelum Declinationis 8. gradum , atque unâ distantiam horariam Stellæ à Meridie

35. 34.

Post hæc Horam Astronomicam Solis Problemate præcedente inventam , nim. Hæ

XII. noctis cum 15½ min. in 183. 56. cona

R

ver

verſam, adde Aſcenſioni rectæ Solis 145. 38.

& ſumma 329. 34. dabit Culminationem.

Ab hac ſumma (hîc non augendâ 360. cùm ſequens ſubtractio absque hac fieri poſſit) ſi ſubtrahas præſaram Horam Aſtronicam

ipſius Stellæ 35. 34. reſiduum 294. dabit Aſcenſionem rectam Stellæ.

Si igitur in Tabula Aſcenſionis , & Declinationis Stellarum inſigniorum, in ſine apponendâ , inveſtigem , cuinam Stellæ conveniat dicta Declinatio 8. graduum, & Aſcenſio 294. invenio & iplam Stellam , videlicet *Lucidam Aquilæ*.

In Planisphærio

A gradu Aſcenſionis rectæ Solis 145. 38. numera in Æquatore ſecundùm ordinem

graduum Horam Aſtronicam Solis 183.

56. & incidet in eundem gradum Culmi-

nationis 329. 34. à qua ſi reſtorſum nume-
res,

tes, seu contra ordinem graduum Horam

Astronomicam Stellæ 35. 34. invenies 294. videlicet Ascensionem rectam Stellæ. Notâ autem hac Stellæ Ascensione rectâ, unâ cum prædicta Declinatione 8. graduum, ex allegata Tabula facile erit, scire ipsum nomen Stellæ, ut insinuatum est.

PROBLEMA XXXVI.

Data Culminatione invenire gradum Eclipticæ Ascendentem, seu Orientem.

Ascensioni rectæ Medij Cœli adde gradus 90. & summa (deductis 360. si superet) dabit Ascensionem obliquam gradûs Eclipticæ Orientis.

Sic in priori exemplo Ascensio recta Medij Cœli erat 329. 34. huic adde 90. & summa 419. 34. (deductis 360. quia superat) nim. 59. 34 dabit Ascensionem obliquam gradûs Ascendentis. Cum his ergo ingredi Tabulas Ascensionis obliquæ & reperti-

es gradum Eclipticæ Aſcendentem 28.

34. II. cujus punctum oppoſitum eſt gradus

Deſcendens ſeu Occidens nim. 28. 34. ‡. prout jam ſuprà Probl. 6. advertimus.

In noſtro exemplo de Sole diſtante à Meridie 45. verſus Ortum, utpote H. 9. matutinâ, Aſcenſio Medij Cœli, juxta

Probl. 30. erat 100. 38. quibus ſi addantur

gradus 90. ſumma dabit 190. 38 pro Aſcenſione obliqua gradûs Eclipticæ Orientis, qui ex Tabula prædicta Aſcenſionis Obliquæ

inveniuntur eſſe 7. 49.

In Planisphærio

Ab Aſcenſione Recta Medij Cœli 329. 34. nûmera antrorſum ſecundum ordinem gra-

duum Æquatoris 90. & occurrent dicti 59.

34. de reliquis conſule Tabulam Aſcenſionum obliquarum, ut dictum. Idem cum pro-

proportione observandum est in altero exemplo Solis.

PROBLEMA XXXVII.

*Data Ascensione obliqua Stella,
& Solis, indagare horam Ortus
Stella.*

Ponamus Stellam vel Planetam versari
in 28. 34. II. Solem verò in 23. 17. Ω .
Ex Tabula igitur excerpe Ascensionem obliquam utriusque, & inde sume differentiam, quæ in horas conversâ dabit distantiam horariam utriusque Sideris, ita ut, si Ascensio obliqua Solis sit major, indicio sit, quòd Stella tot horis antecedit Ortum Solis, si verò sit minor, Stella tot horis suum Ortum retardet.

In exemplo priori Ascensio obliqua Stellæ fuit 59. 34. Ascensio Solis verò obliqua (ut infra ex instituto videbimus) in nostro exemplo est 129. 49. harum differentia 70. 15. in horas resoluta dat 4. horas, & 41. minuta horaria. Dum ergò Solis Ascensio
R 3 sit

ſit tantò major, etiam Stella vel Planeta
 eorundem horis Ortum ſuum præ Sole antici-
 pabit; ſecùs ſi eſſet minor.

In Planisphærio

Ab Aſcenſione obliqua majore v.g. Solis
 in dato exemplo 129. 49. numera retrorſum
 contra ordinem graduum, gradus Aſcenſio-
 nis obliquæ Stellæ vel Planetæ, nim. 59. 34.
 & incidet in dictam differentiam 70. 15. quæ
 important 4. horas cum 41. minutis hora-
 rijs.

PROBLEMA XXXVIII.

*Dato puncto Eclipticæ Oriente re-
 perire Gradum Nonageſimum.*

Per gradum Nonageſimum hîc intelligi-
 tur ſummum punctum Eclipticæ, tunc tem-
 poris in Cœlo datum, cujus noticia ad Ecli-
 pſes Solares calculandas præcipuè neceſſaria
 eſt. Cùm enim dimidia pars Eclipticæ ſem-
 per ſit ſupra, & dimidia infra Horizontem,
 ideò

ideò punctum medium Arcûs inter utramque Horizontis intersectionem dicitur *Gradus Nonagesimus*, quia dividit Arcum Eclipticæ supra Horizontem existentem in duos quadrantes.

Itaque à puncto Eclipticæ Oriente subtrahe 90. gradus seu 3. Signa, & habebis Gradum Nonagesimum quæsitum. Sic in pri-

ori exemplo punctum Oriens sit 28. 34. II. inde subtractis 90. gradibus, vel 3. Signis

provenit Gradus Nonagesimus, nim. 28.

34. H.

Pro nostro exemplo de Sole, ubi punctum Oriens erat juxta Problema 36.

7 49. II . à quibus si subtrahantur, vel retrò

numerentur 3. Signa, remanent 7. 49. II . pro Gradu Nonagesimo.

In Planisphærio

A dicto puncto Oriente nim. 28. 34. II. retrò numera 3. Signa integra, & deprehen-

R 4

des

des Gradum Nonagesimum esse 28. 34. M.
Idem est in nostro exemplo de Sole, ubi pro-
dibunt 7. gradus & 49. min. 25. pro Gra-
du Nonagesimo.

PROBLEMA XXXIX.

*Distantiam Nonagesimi à Meridie
Cælo inquirere.*

Cum Punctum Oriens & Occidens Ecli-
pticæ propter obliquitatem ejusdem non
semper, sed in solis Æquinoctiis ac Solstitiis
à Meridiano æquidistant, evidens est, pun-
ctum medium inter utrumque, adeoque Gra-
dum Nonagesimum exceptis præfatis punctis
Solstitialibus, & Æquinoctialibus, nun-
quam coincidere cum Meridiano, sed ab
eodem suam habere distantiam, quæ proin-
de hic indagatur. Ex quo etiam patet,
hunc Gradum Nonagesimum, exceptis dictis
4. punctis Cardinalibus, semper esse à gradu
Eclipticæ Culminante utpote in Meridie
constitutum, diversum.

Denique etiam hic notandum occurrit,
quod Gradus Nonagesimus existente Culmi-
natione in Signis Ascendentibus, nim.
à P. usque ad 25. semper sit in parte Orien-

gali in Occidentali verò in Signis Descendentibus à \odot . usque ad P .

Jam itaque ad resolutionem Problematis veniendo, Gradus Nonagesimus subtrahendus est à gradu Culminante vel vicissim.

Modus autem faciendi dictam subtractionem Astronomis valde familiaris, & in Tabulis sæpius adhiberi solitus, suum cuius Signo numerum tribuit, ut sequitur.

$\text{V. 8. II. } \odot. \text{II. } \text{X. } \text{III. } \text{II. } \text{M. } \text{I. } \text{P. } \text{III. } \text{K.}$

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

quod si subtractio aliter fieri nequeat, numeri 12. 13. 14. 15. &c. augendo nim. priorem numerum semper 12. ac mutando 2. in 14. & 6. in 18. &c. ut in præsentis videre est. Ut ergo v. g. in priori exemplo fiat dicta

subtractio graduum $\text{III. } 27. 21.$ à gradibus

datis $\text{K. } 28. 34.$ ponunt Signa, gradus, & minuta hac modo:

S. 0 / quia Pisces habent numerum 11. — 11. 28. 34. & quia Aquarius competit 10. — 10. 27. 21. quæ subtracta ab invicem dant 1. 1. 13. id est, unum Signum, 1. gradum cum 13. minutis, seu resoven-

do Signum in gradus, 31. 13. pro distantia

R 5

scil.

scil. Gradus Nonagesimi à Medio Cœli, & sic de alijs.

Quòd si contingat, uti sæpè fieri potest, ut Signum posterius subtrahendum sit à Signo priori, ut in exemplo Signum Piscium II. cum suis gradibus à Signo Aquarij 10. tunc loco numeri 10. ponitur inferior illi respondens numerus major 22. hac ratione

$$\begin{array}{r} \text{S. } 0 \quad / \\ 22. \quad 27. \quad 21. \\ \text{II. } 28. \quad 34. \\ \hline 10. \quad 28. \quad 47. \end{array}$$

si verò gradus inferior à superiori subtrahi nequeat, mutuandi sunt à Signo prioris 30. gradus, & habebitur differentia major, seu complementi; unde supputatio erit talis:

$$\begin{array}{r} 0 \quad / \\ 10. \text{ Signa } 28. \quad 47. \text{ seu } 328. \quad 47. \end{array}$$

In Planisphærio

Numera distantiam graduum unius Signi dati à gradibus alterius, & habebis intentum.

PRO-

PROBLEMA XL.

Distantiam Solis à Nonagesimo assignare.

Gradum Solis in Ecliptica dicto modo subtrahe à Gradu Nonagesimo, & productum erit distantia quæsitæ, quæ hîc, uti & prius, accipienda est proxima, subtrahendo nimirum Signum proximè antèrius à posteriori, & addendo 12. si hoc subtractio facienda requirit. Sic locus Solis in nostro exem-

plø fuit 23. 17. ♄. Nonagesimus verò 7.

49. 23. Staret itaque exemplum hoc modo:

$$\begin{array}{r}
 \text{S. } \circ \quad / \\
 4. \quad 23. \quad 17. \\
 3. - 7. \quad 49. \\
 \hline
 \end{array}$$

I. 15. 28. seu 45. 28. præ distantia Solis à Nonagesimo.

Ubi adhuc notandum venit, quòd, si Sol respectu Gradus Nonagesimi est in Signo anteriori, ut in exemplo primùm posito, distantia illius ab isto sit in Hemisphærio Orientali, secus verò in Occidentali.

In Planisphærio

Eadem distantia facile habetur , sicut in Problemate præcedenti.

Hucusque proposuimus Problemata operationes merè simplices requirentia , & ex solo Planisphærio , vel communi calculo resolvenda ; nunc autem subjungemus alia , tam per Logarithmos , quàm diversam Planisphærij applicationem non minùs curiosè ac jucundè , quàm utiliter expedienda , ac tandem ex principijs Trigonometricis etiam demonstranda.

Ubi tamen ultra ea , quæ in præcedentibus hinc inde jam advertimus , observandum adhuc venit , Vocabula communiter occurrentia in sequentibus non integrè exprimi , sed literis tantùm initialibus indicari , v. g.

| | | |
|--|----------|-----------|
| Locò: Logarithmus Sinus | ponitur. | L. S. |
| Logarithmus Tangentis | | L. T. |
| Sinus Totus | | S. T. |
| Complementum Altitudinis Poli | | C. A. P. |
| Complementum Declinationis Solis | | C. D. ☉. |
| Complementum Arithmericum | | C. Arith. |
| Inventum primum vel secundum, In v. I. II. &c. | | |
| Et hoc quidem , tum ne hujusmodi vocabu- | | bu. |

bula millies redeuntia continuò integrè poni debeant; tum etiam, & vel maxime, ut sufficiens suppetat spatium, Numeros ac Logarithmos ordinatè scribendi, sibi que invicem debitè supponendi.

Ob eandem rationem locò particulae *addantur*, solummodò ponimus signum conjunctivum utriusque numeri addendi (& locò vocabuli *subtrahatur*, præponimus numero subtrahendo signum defectivum —

Denique si alicui Logarithmo Sinus Totus addendus est, præfigimus illi unitatem ad sinistram, interposito puncto; si verò subtrahendus, unitatè præfixam lineolâ transversâ delemus, quæ omnia ex sequentibus ipso usu & inspectione clarescent.

PROBLEMA XLI.

*Distantiam Solis Orientis ab H. 6.
ex Declinatione ejusdem, & Altitudine Poli deducere.*

Præmitto hoc Problema, quia ab ista multorum aliorum resolutio dependet. Itaque

Log. Tang. Alr. Poli, & Log. Tang. Declin. \odot . addantur, & à summa subtrahatur Sinus Totus (abiiciendo primam uni-

270 *Uſus & utilitas Planisphærij*

gatem ad ſiniſtram, uti ſuperiùs diximus fol.
213.) & reſiduum erit Log. Sinùs Diſt. ☉.
ab H. 6.

Sic in noſtro exemplo ponitur Altitudo

Poli 48. gr. Declinatio ☉. verò 13. 47. 16.
adeoque

L. T. A. P. (100455626. &

L. T. D. ☉. (93898699.

S. T. 1.94354325.

& reſiduum erit L. S. Diſt. ☉. ab H. 6. nim.

15. 48. 56.

In Planisphærio

Ad Alc. Poli diſpoſito ita invenitur.
Filo Regulæ ad Horizontem applicato à
puncto Ortùs Solis (ubi ſcilicet Parallelus
☉. 23. gr. 17. min. ☉. Horizontem inter-
ſecat.) deſcende in Linea Arcui Horario pa-
rallèlâ uſque ad Æquatore, & incidet in
dictos 15. gr. 49. min. proximè, eos à
linea H. 6. ſeu Centro Planisphærij in Æ-
quatore numerando, quanta nim. eſt Di-
ſtantia ☉. ab H. 6. quaſita.

PRO.

PROBLEMA XLII.

*Horam Ortûs & Occasûs
☉. investigare.*

Dicta ☉. Distantia ab H. 6. nim. 15. 48.

// 56. in tempus conversa (computando 15. gr. pro una hora, & unum gradum pro 4. min. horarijs) dabit 1. horam & $3\frac{1}{4}$. minuta, quæ in Signis Borealibus, quale est ☉. subtracta ab H. 6. (in Australibus verò addita) indicant Horam Ortûs nim. $3\frac{1}{4}$. min. ante H. 5. & ex opposito H. 7. cum $3\frac{1}{4}$. min. pro Occasu.

In Planisphærio

Ubi Parallelus ☉. datus v. g. in nostro exemplo 23. gr. ☉. Horizontem interfecat, Arcus Horarius proximus monstrabit Horam Ortûs & Occasûs, vel quadrantem illius, ut supra.

PROBLEMA XLIII.

Arcum Semidiurnum, atque etiam Longitudinem Dierum & Noctium supputare.

Spatium inter Ortum & Meridiem; vel inter Occasum & mediam Noctem, dat Arcum Semidiurnum vel Seminocturnum; duplum verò illius Longitudinem Diei ac Noctis. Sic in nostro exemplo Arcus Semidiurnus erit 7. hor. $3\frac{1}{4}$. min. Seminocturnus verò $3\frac{1}{4}$. min. minor quàm 5. hor. adeoque Longitudo Diei 14. hor. cum. $6\frac{1}{2}$. min. Noctis verò totidem minutis minor quàm 10. hor. seu 9. hor. cum $53\frac{1}{2}$. min.

In Planisphærio

Haud difficile erit à Puncto Ortus (vel Occasus (ubi nim. Parallelus ☉. datus Horizonem interfecat) usque ad Meridiem vel mediam Noctem numerare horas & minuta pro Arcu Semi-diurno, vel Nocturno, cuius duplum, ut diximus, dabit Longitudinem Diei ac noctis.

PRO

PROBLEMA XLIV.

Differentiam Ascensionalem assignare.

De hac diximus I. Parte fol. 137. semperque coincidit cum Dist. ☉ Orientis ab H. 6. quam in Probl. 41. invenimus 15 gr. 49. min. seu 1. hor. cum 3 $\frac{1}{4}$. min. de qua proinde in Planisphærio invenienda jam ibidem etiam diximus,

PROBLEMA XLV.

Ascensionem rectam ☉ ex Distantia ejusdem ab Æquinoctio proximo, & Declinatione maxima calculare.

Log. Tang. Dist. ☉ ab Æquinoctio proximo, & Log. Sinus Complementi Declinationis maximæ addantur & inde subtrahatur Sinus Totus, eritque residuum Log. Tang. Ascensionis rectæ.

Sic in nostro exemplo Dist. ☉ ab Æquin. proximo, prout in Probl. 48. ex instituto vi-

S

de

debimus, est 36. 42. 16. Complementum
verò Declin. maximæ 66. gr. 30. min.
Itaque

L. T. Dist. ab Æq. prox. (98724463. &
L. S. C. D. maximæ 99623978.

S. T. 98348441.
& residuum erit L. T. Ascens. Rectæ, nim.
unà cum minutis prim. & sec. computatæ

34. 21. 32.

Quoniam verò Ascensiones Rectæ nume-
rantur 360. numerationis initium faciendo
à Puncto γ . eamque continuando per o-
mnes 4. Eclipticæ Quadrantes, ideò bene
observandum est, in quonam Quadrante
sit Signum vel Locus \odot . Primus enim Qua-
drans est Vernus complectens prima tria Si-
gna γ . 8. Π . Alter Æstivus cum Signis
 Θ . Ω . Ξ . Tertius Autumnalis continens
 \equiv . m . \ddagger . & quartus Hyemalis cum ulti-
mis 3. Signis p . \approx . H . Si ergò Locus \odot
est in primo Quadrante Eclipticæ, produ-
ctum dictæ subtractionis est ipsissima Ascen-
sio Recta. Si verò Locus \odot est in secun-
do Quadrante, sicut in nostro exemplo,

tunc memoratum productum 34. 21. 32.
sub-

Subtrahendum erit à Semi-Circulo, seu 180. gr. & remanebunt pro Ascensione Re-

cta quæ sita 145. 38. 28. proximè. Si autem ☉ est in tertio Quadrante, tunc productum addendum erit Semi-Circulo, ac denique in quarto subtrahendum à toto Circulo, seu 360 gr.

Quòd verò in Tabula Ascensionum Rectarum pro gradu 23. Ω . Ascensio recta solum inveniatur 145. gr. 21. min. nos autem

ponamus 145. 38. 28. inde provenit, quòd ☉ in nostro exemplo non occupet præcisè 23. gr. Ω . sed insuper 17. prim. & 44. secunda minuta, de quibus inveniendis diximus suprà fol. 195. quæ proinde differentia minutorum & Logarithmorum, in Tabula non reperibilium, sæpius imposterum consideranda erit.

In Planisphærio

Idem invenies, si in Ecliptica quæras Locum ☉ datum v. g. 23. gr. Ω . & in Linea Arcui horario parallela descendas ad Æquatorem; occurrunt enim idem 145. gr.

38.

38. min. prout jam supra fol. 137. & seq. insinuavimus.

PROBLEMA XLVI.

*Eandem Ascensionem Rectam ex
Declinatione ☉ data, & Declinatione maxima statuere.*

Compl. Declin. maximæ est 66. gr. 30.

min Declin. ☉. data 13 47. 16.

L. T. C. D. maximæ (103616981. &

L. T. D. datæ 93898699.

S. T. 97515680.

& residuum erit L. S. Ascens. Rectæ nim.

34 21. 32. quæ dicto modo à 180. subtracta, dant veram Ascensionem Rectam, videlicet 145. 38. 28.

In Planisphærio

Præter modum in præc. Problemate insinuaturn, colloca Aequatorem in Horizonte. Filum verò applica ad gradum Declin. da-

datæ in Limbo , nim. 13. gr. 47. min. & à puncto, in quo secuerit eclipticam, descende, ut priùs , in Linea Arcui horario parallela ad Æquatorem , & incidet in dictum gradum 145. cum 38. min.

PROBLEMA XLVII.

Ascensionem Obliquam venari.

Distantiam ☉ Orientis ab H. 6 (quam

Probl. 41. invenimus 15. 48. 56 & semper coincidere diximus cum Differentia Ascensionali) in Signis quidem Borealibus subtrahe, in Australibus adde Asc. R. & habebis Ascensionem ☉ obliquam , videlicet 129. 49. 32.

In Planisphærio

A gradu Ascensionis Rectæ 145. 38. 28. numera in Signis Borealibus retrorsum (in Australibus verò antrosum) gradus Dist. ☉ ab H. 6. nim. 15. gr. 49. min. & occurrent denuo dicti 129. gr. 49. min.

PROBLEMA XLIX.

*Longitudinem ☉ ab Aequatore
 seu Distantiam ab Aequinoctio proxi-
 mo ex Declinatione illius currente, &
 Declinatione maxima dedu-
 cere.*

Declinatio ☉ data est 13. 47. 16. Declina-
 tio maxima vero 23. gr. 30. min. Jam

L. S. D. ☉ datae. & S. T. 1. 9377.1738.

L. S. D. Max. — 96006997.

97764741.

qui erit L. S. Dist. ☉ ab Aequin. prox. num.

36. 42. 16.

In Planisphærio

Præterquam quod facile numerari possint
 Gradus à loco ☉ usque ad V. vel ♄. di-
 sponere Axin ad gradum Declin. Max. 23. gr.
 30. min. in Limbo, filum verò ad gradum
 Declin. datae ibidem, scil. 13. gr. 47. min.

&

& istud in linea Axis à Centro monstrabit,
dictum gradum 36. cum 42. min. Dist. ☉
quæsitæ,

PROBLEMA XLIX.

*Eandem Distantiam ab Æquina-
tione ex Ascensione recta, & Declin-
atione maxima colligere.*

○ / //

Ascensio recta 145. 38. 28 Declin. max.
23. gr. 30. min.

L. T. Ascens. rectæ, & S. T. 1. 98348441.
L. S. C. D. maximæ — 99623978.

98724463.

○ / //

erit L. T. Distantiæ quæsitæ nim. 36. 42. 16.

In Planisphærio

In Æquatore à gradu Ascensionis rectæ

○ / //

145. 38. 28. perge secundum lineam Arcui
horario parallelam usque ad Eclipticam, &
ab illo puncto Eclipticæ numera gradus us-

S 4

que

que ad Æquinoctium proximum, & reperi-
es dictos 36. gr. 42. min.

PROBLEMA L.

*Eandem ☉ Longitudinem, seu
Distantiam ab Æquin. proximo, ex
Amplitudine data, & Amplitudine
maxima evincere.*

In nostro exemplo Amplitudo Ortiva
(de qua in Probl. 52.) est $\overset{\circ}{20.} \overset{'}{51.} \overset{''}{56.}$ Am-
plitudo maxima verò $\overset{\circ}{36.} \overset{'}{34.} \overset{''}{42.}$ proximè. Jam
L. S. Amplit. data, & S. T. — 1. 95516629.
L. S. Amplit. maximæ — 97751888.

eritque hoc residuum L. S. Dist. ☉ quæsi-
tæ, nim. $\overset{\circ}{36.} \overset{'}{42.} \overset{''}{16.}$

In Planisphaerio

Axim dispone in Limbo ad gradum Am-
plit. maximæ 36. 34. 42. & in eodem
Limbo. filum applica ad gradum Amplit. da-
tæ

rae 20. 51. 58. & istud in linea Axis à Centro indicabit Distan. \odot quæsitam, scil.

36. 42. 16.

PROBLEMA LI.

Amplitudinem Ortivam maximam ex Dist. \odot ab Æquinoctio & Amplitudine Ortiva data perscrutari.

Dist. ab Æquinoctio in nostro casu est

36. 42. 16. Amplitudo data verò 20. 51. 58.

Jam

S. T. & L. S. Amplit. datae 95516629.

L. S. Dist. ab Æquin. prox. — 97764741.

97751888.

qui est L. S. Amplit. maximæ nim. 36. 34. 42. proximè.

In Planisphærio

Filum applica ad grad. Amplit. datae 20. gr. 52. min. Axin verò tamdiu hinc inde verte, quousque filum in eo abscondat grad.

S 5

dum

282 *Usus & utilitas Planisphaerii*

dum Distantiæ ☉ ab Æquinoctio 36 gr.
42. min à Centro, & Axis in limbo deno-
tabit gradum Amplit. maximæ prædictum.

o / //

36. 34. 42.

PROBLEMA LII.

*Amplitudinem Ortivam curren-
tem ex Amplit. maxima, & Distan-
tiâ ☉ ab Æquinoctio quovis tempore
deducere.*

Amplitudo maxima in nostro exemplo
est 36. 34. 42. Distantiâ ☉ ab Æquinoctio

o / //

36. 42. 16. Itaque

L. S. Amplit. maximæ

L. S. Dist. ☉ ab Æquin.

(97751888. &

97764741.

S. T.

+ 95516629.

remanet L. S. Amplit. quæsitæ, nim.

o / //

20. 51. 56.

In Planisphaerio

Axis eleva ad gradum Amplit. maximæ
in

in limbo 36. 34. 42. filum verò promove ad
 gradum Dist. ☉ ab Æquinoctio 36. 42. in
 linea Axis à Centro, & hoc monstrabit in
 limbo gradum Amplis. datæ 20. 52. pro-
 xime.

PROBLEMA LIII.

*Eandem Amplitudinem Ortivam
 ex Declinatione ☉ & Complemen-
 to Altitudinis Poli invenire.*

Declinatio ☉ est in nostro exemplo

13. 47. 16. Itaque

S. T. & L. S. D. ☉

1. 93771738.

L. S. C. A. P.

— 98255109.

95516629.

qui est L. S. Amplis. quæsitæ, videl.

20. 51. 58.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli disposita sume Cir-
 cino

cino Distantiam à Centro usque ad punctum Ortus, atque hanc ex eodem Centro transfer in lineam Æquatoris, & abscindes ibidem dictos 20. gr. & 52. min. à Centro computatos.

Vel

Filum dispone ad Horizontem gran. verò fige ad punctum Ortus, & Axe Horizonti applicato, granum ibidem denotabit gradum Amplit. quæsitæ, nim. 20. gr. 52. min.

PROBLEMA LIV.

Declinationem ☉ ex Amplitudine data, & Complemento Altitudinis Poli deducere.

Amplitudo data fuit 20. 51. 58. Complementum Altitudinis Poli verò supponitur hic 42. gr. Itaque
 L. S. C. A. P. (98355109 &
 L. S. Amplit. ortivæ 95516629

S. T. 493771738.
 residuum erit L. S. Declin. quæsitæ, videl.

13 47. 16.

In

In Planisphærio

Axis disponatur ad gradum Amplit. datæ
20. gr. 52. min. proximè, filum autem ap-
plica Complemento Elevationis Poli 42. gr.
in linea Axis à Centro, & istud in limbo
monstrabit Declinationem quæsitam, scil.
13 gr. 47. min.

PROBLEMA LV.

*Eandem declinat. ☉ datam ex De-
clin. maxima, & distantia ab Æqui-
noctio proximo reperire.*

Declinatio maxima fuit 23. gr. 30. min.

Distantia verò ☉ ab Æquinoctio 36. 42. 16.
Jam

L. S. Dist. ☉ ab Æquinoctio 97764741.8x
L. S. D. maximæ 96006997.

S. T.

x. 93771738.

residuum dabit L. S. D. quæsitæ, 13. 47. 16.

In Planisphærio

Axis pone ad gradum Dist. ☉ ab Æquino-
ctio.

o /
 Etio 36. 42. in limbo, filum verò promove
 ad Declinationem maximam 23. gr. 30. min.
 in Axe à Centro, filumque in limbo dabit
 gradum Declinationis quæsita^{o /} 13. 47.

PROBLEMA LVI.

*Declinationem ☉ currentem ex
 Complementary Declin. maxima, &
 Ascensione recta detegere.*

Ascensionem rectam superius vidimus esse
 o / //
 145. 38. 28. Complementum verò Declin.
 maximæ est 66. gr. 30. min. Igitur
 L. S. Ascens. rectæ & S. T. 1. 97515680.
 L. T. C. D. maximæ — 1. 03616981.
 & residuum hoc erit L. T. D. ☉ 93898699.
 o / //
 videl. 13. 47. 16.

In Planisphærio

A gradu Ascens. rectæ 145. 38. min. in
 linea Arcui horario parallelâ in Signis Bo-
 realibus ascende, in Australibus verò descen-

de

de usque ad Eclipticam , & Parallelus ibidem transiens indicabit dictam Declinationem 13. gr. 47. min.

PROBLEMA LVII.

Predictam Declinationem ☉ ex Declin. maxima , & Angulo Eclipticæ cum Meridiano desumere.

Angulum Eclipticæ cum Meridiano sup-

ponimus hîc esse 70. 46. 53. Declinationem verò maximam novimus esse 23. gr. 30. min. & consequenter Complementum illius 66. gr. 30. min. Jam.

S. T. & L. S. C. D. maximæ 1 99623978.
L. S. Ang. Eclipt. cum Merid. — 99750958

99873020.

qui erit L. S. C. D. quæsitæ 76. 12. 44.

In Planisphærio

Axin colloca in Limbo ad Angulum Eclipt. cum Meridiano 70. gr. 47. min. proximè , filum verò promove ad Complementum

tum maximæ Declin. 66. gr. 30. min. pariter
in limbo, filumque in Axi denotabit Com-
plementum Declinationis 76. gr. 13. min.
proximè.

PROBLEMA LVIII.

*Eandem Declinationem ex hora
Ortûs, & Elevatione Poli in-
venire.*

Hora Ortûs, seu Distantia ☉ Orientis
o / //

ab H. 6. erat 15. 48. 56. Elevatio Poli verò
supponitur esse 48. gr. Itaque
S. T. & L. S. Dist. ☉. Orientis ab H. 6.

1.94354325.
L. T. A. P. — 1.00455626.

93898699.

& residuum istud erit L. T. Declin. quæsi-
o / //

tes, 13. 47. 16.

In Planisphærio

Axe ad Elevationem Poli disposito, filum
applica Horizonti, & Parallelus transiens per
pun-

per Problemata demonstratur. 289

punctum Ortus indicabit Declinationem
13. gr. 47. min.

PROBLEMA LIX.

*Sapè dictam Declinationem ex data
Altitudine H. 6. & Elevatione Po-
li investigare.*

Altitudo H. 6. supponitur hîc esse 10.

12. 5. Elev. Poli 48. gr. Nunc igitur

S. T. & L. S. Alt. ☉ H. 6. 1. 92482473.

L. S. A. P. — 98710735.

93771738.

qui est ipsissimus L. S. D. quæsitæ, ut su-
prà.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli 48. gr. constituto,
filum promove ad gradum Altitudinis H. 6.
nim. 10. gr. 12. min. & linea Axis à Cen-
tro indicabit gradum Declinationis 13. cum
47. min.

T

PRO.

PROBLEMA LX.

*Rursus eandem Declinationem ☉
ex Altitudine ejusdem in Circulo
Verticali & Altitudine Poli in-
ferre.*

Altitudo ☉ in Circulo Verticali suppo-
nirur hic 18. 42. 19. Altitudo Poli 48. gr.
Jam
L. S. Alr. ☉ in Circulo Verticali { 95061003.
& L. S. A. P. { 98710735.

S. T. x. 93771738.
& Residuum erit L. S. D. quæsitæ 13. 47. 16.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli disposito, filum
applica Altitudini ☉ in Circulo Vertica-
li 18. 42. 19. in linea Axis à Centro, filum-
que notabit in Limbo Declinationem ☉
ut suprâ.

PRO.

PROBLEMA LXI.

*Complementum Declinationis ☉
ex Complementary Altitudinis ☉ Distan-
cia hujus à Meridie, & Azimuth à Meridie
cognoscere.*

Pro exemplo ponimus H. 9. matutinam,
uti ex infra dicendis hñc supponimus, Altitu-

dinem ☉ in nostro exemplo esse 39. 32. 24.

consequenter Complementum illius 50. 27.

36. Distantiam verò ☉ à Meridie 45. gr. &

Azimuth à Meridie 62. 56. 10. His positis

L. S. Azimuth à Meridie 99496310. &

L. S. C. Alt. ☉ 98871560.

L. S. Dist. ☉ à Meridie 1.98367870.

— 98494850.

99873020.

Productum dat L. S. C. Declin. nim, 76. 12.

44.

In Planisphaerio

Filum applica Distantiæ ☉ à Meridie in Limbo, nim. 45. gr. H. 9. Axim verò ver-
te, quousque lecerur à filo in gradu Com-

plementi Alt. ☉ à Centro, nim. 50. 27. 36.
tūm filum promove ad gradum Azimuth in

Limbo 62. 56. 7. & filum dabit Comple-
mentum Declinationis in linea Axis à Cen-
tro, ut ſuprà.

PROBLEMA LXII.

Declinationem ☉ ex data ejusdem

Distantia ab H. 6. ipsius Altitudine,

& Complementary Elevationis Poli

invenire.

In nostro exemplo H. 9. Distantia præ-

dicta est 45. gr. Altitudo ☉ 39. 32. 24. &
Complementum Elevationis Poli 42. gr.
Itaque

L. S. Dist. ☉ ab H. 6. (98494850. &

L. T. C. A. P. (995 44374.

S. T.

x. 98039224.

& residuum erit L. T. Inv. I. ad operatio-

nem intentam neceſſarij, nim. 32. 29. 3.
Dein

L.

L. S. C. Inv. I. (99261055. &
L. S. A. ☉ (98038831.

L. S. A. P. I. 97299886,
 - 98710735.

98589151.

eritque hoc productum L. S. Inv. II. nim.

o / //

46. 16. 19. Si ergo numerus graduum Inv. I.
subtrahatur à numero Inv. II. vel vicissim
(minor scilicet à majore) habentur gradus
Declinationis hoc modo:

o / //

46. 16. 19.

32. 29. 3.

o / //

13. 47. 16.

& hoc quidem procedit, si ☉ jam est supra
H. 6. si verò adhuc est infra eandem, tunc
gradus utriusque Inventi ad se invicem ad-
dendi sunt.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli disposito, filum ad
gradum Alt. ☉ applicatum in puncto, ubi
secat Arcum Horarium datum, v. g. H. 9.
indicabit Parallelum ☉ videl. 23. gr. Ω.

AI

T 3

quod

quod aded clarum est, ut ulteriori exemplo non egeat.

PROBLEMA LXIII.

*Complementum Declinationis ex
Azimuth à Meridie, Elevatione
Poli, ac Hora diei assignare.*

o. 1. 14

Azimuth à Meridie est 62. 56. 47. Elevatio
Poli 48 gr. Distantia ☉ à meridie H. 9.
45. gr. Igitur
L. T. Azim. à Meridie (1029161. 84
L. S. A. P. 287107.

2016268.

S. T. subtrahatur, abijciendo nim. à primo
numero ad finistram unam unitatem, hoc
modo: 1016268. hocque residuum dabit
E. T. Inv. P. videl. 55. gr. 29. min. Ab his
subtrahe Distantiam ☉ à Meridie, vel vi-
cissim, Sic:

o. 1

55. 29.

45. 0.

remaneat 10. 29. pro Inv. H. Jam

L. S. Inv. I. (991590. &
L T. C. A. P. (995443.

L. S. Inv. II. 1. 987033.
— 925995.

1. 061038.

qui erit L. T. C. D. quælitæ , scil. 76. gr.
13. min. neglectis minutis secundis.

In Planisphærio

Licet facilius Declinatio ☉ haberi possit ex præcedentibus Principijs, ut tamen Planisphærij universalitas & utilitas adhuc magis pateat, ex fundamentis quoque in Probl. positis erui poterit modo sequenti, qui ad plura alia similiter solvenda servire poterit.

Axin pone ad Azimuth à Meridie 62. gr. 56. min. in limbo , filum verò ad Compl. Elevationis Poli 42. gr. in Axi à Centro. Axin remove ad punctum fili in limbo scil. ad 37. gr. filum autem deprime infra Horizontem ad Azimuth ab Ortū (quod est Complementum Azim. à Meridie) nūm 27. gr. in limbo , & filum in Æquatore ab extremitate dat Inv. I. 55. gr 29. min.

Dein ab hoc gradu Inv. I. 55. gr. 29. min. numera in Æquatore retrorsum Distan-

tiam ab H. 6. 45. gr. & habebis Differentiam
utriusque seu Inventum II. 10. gr. 29. min.

His positis filum pone infra Horizontem
ad hos gradus immediatè inventos in Æqua-
tore ab extremitate, Æquatorem verò col-
loca ad punctum fili in limbo, & filum eleva
supra Horizontem ad punctum 37. in Limbo,
ubi pr. us positus fuit Axis, & filum in Axi
à Centro notabit Complementum Declina-
tionis 76. gr. 13. min.

PROBLEMA LXIV.

*Eandem Declinationem datam ex
Azimuth ab Oriente, Complemento :*

*Alt. ☉ & Compl. Elevationis
Poli indagare.*

Azimuth ab Oriente est 27. gr. 4. min.
Complementum. Alt. ☉ 50. gr. & 28. min.
proximiùs, Compl. Elevationis Poli 42. gr.
Itaque

| | |
|------------------------|-------------|
| L. S. Azim. ab Oriente | { 965803. & |
| L. T. C. A. P. | { 9954 + 3. |

S. T. \times 961246.
eritque residuum L. T. Inv. l. neglectis mi-
nutis secundis, scil. 22. gr. 16. min.

Hos

Hos gradus adde Complemento Alt. ☉
v. g. H. 9. in nostro exemplo hoc modo:

22. gr. 16. min.

50. 28.

& provenient 72. 44. pro Inv. II.

Sĩ verò Azimuth est versùs Septentrionem ,
debet minor numerus subtrahi à majore.
Ulteriùs

L. S. C. Inv. II.

{ 947249. &

L. S. A. P.

{ 987107.

1.934356.

L. S. C. Inv. I.

— 996634.

937722.

hòcque residuum dabit L. S. Decl. quæsitæ.
scil. 13. gr. 47. min. neglectis secundis.

In Planisphærio

Filum eleva ad gradum Alt. ☉ 39. gr.
32. min. & Axi in puncto verticali 90. con-
stituto , granum applica ad gradum Azi-
muthalem ab Oriente, nempe 27. gr. in Cir-
culis Horarijs ab Axe quærendum ; tum
Axe ad Elevat. Poli reducto , granum præ-
dictum in Arcu H. 9. indicabit Parallelum
Declinationis ibi transeuntem 13. gr. 47. min.

T 5

PRO.

PROBLEMA LXV.

*Declinationem maximam scire ex
Declinatione currente, ac Distantiâ
☉ ab Æquinoctio proximo.*

Declinatio data est 13. 47. 16. Distantia

☉ ab Æquin. verò 36. 42. 16. Jam
L. S. D. datæ & S. T. 1. 9377. 738.
L. S. Dist. ☉ ab Æquin. — 97764741.

96006997.

& residuum dabit L. S. D. maximæ, nim.
23. gr. 30. min.

In Planisphærio

Filum appone Declinationi datæ 13. gr.
47. min. in limbo, Axin verò tamdiu verte,
donec filum ibidem à Centro abscindat Dist.
☉ ab Æquinoctio 36. gr. 42. min. & Axis
signabit in limbo Declinationem maximam
23. gr. 30. min.

PRO-

PROBLEMA LXVI.

*Eandem Declinationem maximam
dato Angulo Eclipticæ cum Meri-
diano, & Complemento Declinatio-
nis \odot statuere.*

Angulus Eclipticæ cum Meridiano suppo-
nitur 70. 46. 52. Complementum Declina-
tionis verò 76. 12. 44. Itaque
L. S. Anguli meridiani { 99750952. &
L. S. C. D. datæ { 99873020.
S. T. x. 99623978.
Residuum dabit L. S. C. D. maximæ 66. gr.
30. min. proximè.

In Planisphærio

Axin colloca in limbo ad Angulum Ecli-
pticæ cum Meridiano 70. gr. 47. min. filum
verò promove ad Compl. Declinationis
76. gr. 12. min. in Axe à Centro, filumque
in limbo denotabit Compl. Declin. maxi-
mæ, nim, 66. gr. 30. min.

PRO-

PROBLEMA. LXVII.

Maximam Declinationem ex Declin. ☉ currente, & Ascensione recta determinare.

Declinatio ☉ est 13. 47. 16. Ascensio re-
cta

Itaque
S. T. & L. S. Ascens. rectæ I. 97515680.
L. T. D. datæ — 93898699.

I. 03616981.
qui est L. T. C. D. maximæ quæsitæ nim.
66. gr. 30. min.

In Planisphaerio

Æquatorem constirue Horizonti Paralle-
lum, & Tropici in limbo indicabunt De-
clinationem maximam Borealem & Austra-
lem, nim. 23. gr. 30. min.

PROBLEMA LXVIII.

Altitudinem Poli ex Distantia ☉

Orientis ab H. 6. & Declin. ejusdem dignoscere.

Distantia ☉ Orientis ab H. 6. in no-
stro

fitro exemplo est 15. 48. 56. Declinatio

13. 47. 16. Elevatio Poli 48. gr. Nunc igitur

S. T. & L. S. Dist. ☉ ab H. 6. 1. 94354325.

L. T. D. ☉ — 93898699.

residuum erit L. T. A. P. 1. 00455626.

In Planisphærio

A puncto H. 6. seu Centro Planisphærij numerentur in Æquatore retrorsum gradus

Distantiæ ☉ Orientis ab H. 6. nim. 15. 48.

56. & ab hoc gradu Æquatoris invento in linea Arcui Horario parallela ascende usque

ad Parallelum ☉ datum 23. 17. 52. & punctum, in quo fit concurrentia, nota; tum filo regulæ ad Horizontem reducto orbem versatilem hinc inde tam diu verte, donec dictum punctum lineæ Horizontali perfecte congruat, & hoc ipso apparebit, Axin mundi 48. gradibus elevatum esse supra Horizontem.

PROBLEMA LXIX.

Eandem Altitudinem Poli ex Alt.

☉ H. 6. & Declinatione per.
scrutari.

Altitudo ☉ H. 6. in nostro exemplo est
 $\begin{array}{ccc} \circ & / & // \\ 10. & 12. & 5. \end{array}$ Declinatio verò $\begin{array}{ccc} \circ & / & // \\ 13. & 47. & 16. \end{array}$ Jam
 igitur
 S. T. & L. S. Alt. H. 6. 1. 92482473.
 L. S. Declin. ☉ — 93771738.
 remanet L. S. A. P. 98710735. nim.
 48. gr.

In Planisphærio

Filum applica Altitudini H. 6. 10. gr. 12.
 min. in limbo, lineam Axis autem versa, do-
 nec filum ibidem fecer Declinationem datam
 nim. 13. gr. 47. min. à Centro, & Axis in eo-
 dem limbo indicabit Altitudinem Poli 48. gr.

PROBLEMA LXX.

Complementum Altitudinis Poli ex

*Hora diei, & Altitudine ☉ in Æqui-
 noctio determinare.*

Altitudo ☉ in Æquinoctio v. g. H. 9. hîc
 sup.

o / //

supponitur 28. 14. 19. Distantia verò ☉ ab H. 6. est 45. gr. Hinc

S. T. & L. S. Alt. ☉ in Æquin. 1. 96749959.

L. S. Dist. ☉ ab H. 6. — 98494850.

98255109.

eritque hoc residuum L. S. C. A. P. nim. 42. gr.

In Planisphærio

Axin colloca ad Dist. ☉ ab H. 6. 45. gr. in limbo, filum verò promove ad Alt. ☉ in Æquinoctio H. 9. 28. gr. 14. min. & filum in Axe indicabit Complementum Alt. Poli 42. gr.

PROBLEMA LXXI.

Complementum Altitudinis Poli ex Declinatione ☉ & Amplitudine Ortiva inferre.

o / //

Declinatio est 13. 47. 16. Amplitudo Or-

o / //

tiva verò 20. 51. 55. Itaque

S.

S. T. & L. S. Declin. datæ 1. 93771738.

L S. Amplit. Ortivæ — 95516629.

98255109.

eritque hoc residuum L. S. C. A. P. 42. gr.

In Planisphaerio

Filum promove ad gradum Declinationis datæ 13. gr. 47. min. in limbo. Axin verò tamdiu verte, quousque filum ibidem abscindat gradum Amplitudinis Ortivæ 20. gr. 52. min. à Centro, & Axis in limbo denotabit gradum Complementi Altitudinis Poli, seu Altitudinem Æquatoris 42. gr.

PROBLEMA LXXII.

Idem Complementum Altitudinis Poli ex Azimuth ab Oriente, Altitudine ☉ ac Declinatione ejusdem enotare.

Azimuth ab Oriente est 27. gr. 4. min.

Complementum Alt. ☉. verò 50. 27. 36.

Declinatio 13. 47. 16.

L.

L. S. Azimuth ab Oriente { 965803.
L. T. C. Alt. ☉ { 1.008327.

S. T. x. 974130.

0 1 11

critque residuum L. T. Inv. I. scil. 28. 51. 48.

L. S. C. Inv. I. 1994238. &

L. S. Declin. © 1937717.

1931955.

L. S. Alt. © — 980388.

951567.

residuum hoc erit L. S. Inv. II, cui respon.

0 / //

dent 19. 8. 18. Ab hujus Inveni Com-
plemento si subtrahantur gradus Inveni I,
vel, quando Azimuth est versus Septentrio-
nem, addantur, provenient proxime 42. gr.
nim. Complementum Elevationis Poli qua-
simum.

In Planisphaerio

Prænotandum, sæpius in sequentibus præscribi v. g. gradum Azimuth à Meridie in Circulis Horarijs quærendum; unde ne hujus inveniendi modum sæpius repetere

V

οργ- *org-*

oporteat, inter plures alios poſſibiles præmitto ſequentes, quorum primus eſſe po-
teſt, ut dictum gradum Azimuth à Meridie
nim. 63. numeres in Æquatore à Limbo ad ſi-
niſtram ſeu ab V. & ab hoc in linea proximo
Arcui Horario parallela aſcendas uſque ad
filum regulæ, illudque punctum interſectio-
nis erit gradus Azimuth in Arcubus Horarijs
inveniendus.

Alter verò Modus eſſe poteſt, ſi nume-
rationem dicti gradûs incipias à Limbo, &
primo Arcui Horario tribuas 15. gradus,
alteri 30. tertio 45. &c. & in termino nume-
rationis dictorum 63. graduum granum ſeu
gemmam in filo figas. His itaque prænota-
tis

Axin pone ad Alt. ☉ 39. gr. 32. min.
in limbo, filum verò ad Declin. ☉ 13. gr.
47. min. in eodem limbo; tum quære A-
zimuth à Meridie 63. gr. in Arcubus Hora-
rijs alterutro dictorum modorum, & Paral-
lelus tranſiens per punctum notatum erit Pa-
rallelus Altitudinis Poli, nim. 48. gr.

Vel:

Axin accomoda Complemento Altitudi-
nis Solis 50. 28. in Limbo, filum autem di-
ſpo-

spone ad gradus Azimuth à Meridie 62. gr. 56. min. in Linea Axis à centro, & istud

notabit in Limbo 43. 30. circiter pro Inventa primo. Dein filum pone ad Declinationem Solis in Limbo, & Axim tamdiu versa, donec filum secetur à gradibus ibidem præ-

dictis 43. 30. Inventi primi ab extremitate numerandis, & provenient 19. 8. Deni-

que filum pone ad Altitudinem Solis 39. 32. in Limbo, & Axin versa, donec filum in Linea Axis denuò abscindat gradus memo-

ratos Inventi primi, ním. 43. 30. pariter ab extremitate sumendos, filumque in Limbo

monstrabit Complementum 28. 52. qui subtracti à Complemento Inventi II. videlicet

70. 52. relinquent 42. 0. pro Complemento Altitudinis Poli.

Vel:

Axin constitue in vertice 90. filum verò

ad gradum altitudinis Solis 39. 32. granum

ad gradum Azimuth ab Oriente 27. 4. in
Circulo Horario quærendum. Tunc au-
tem Axin versa, donec granum incidat in
Parallelum Declinationis, seu locum Solis,

nim. 23. 17. Ω . & Axis in Limbo denota-
bit gradum Altitudinis Poli.

PROBLEMA LXXIII.

Idem Complementum Altitudinis

*Poli, datâ Dist. \odot ab H. 6. & Alti-
tudine ac Declinatione ejusdem
assignare.*

Distantia \odot ab H. 6. v. g. H. 9. est 45.
gr. Declinatio 13. gr. 47. min. Altitudo \odot

39. 32. 24. Nunc

L. S. Dist. \odot ab H. 6. { 984948. &
L. T. C. Declin. { 1.061013.

2.045961.

S. T.

— 1.045961.

& re manebit L. T. Inv. I. nim. 70. gr.
52. min,

ul

Ulteriùs

L. S. C. Inv. I.
L. S. A. ☉

{ 951566. &
980388.

L. S. Declin. ☉

1.931954

— 937717.

994237.

qui est L. S. Inv. II. nim. 61. gr. 8. min. cujus Complementum est 28. gr. 52. min. qui subtracti (vel infra H. 6. additi) gradibus Inveniti 1. 70. gr. 52. min. dabunt 42. pro Complemento Altitudinis Poli.

In Planisphærio

Axin pone ad Declinationem ☉ 13. gr. 47. min. sinistrorsum in limbo, filum verò ad Alt. ☉ pariter in limbo, & Parallelus transiens per punctum, in quo filum sinistrorsum secuerit Arcum H. 9. datum, exit Parallelus Altitudinis Poli, 48. gr.

Vel:

Axin pone ad Complementum Declinationis 76. gr. 13. min. in Limbo, filum verò

V 3

ad

ad Dist. ☉ à Meridie 45. gr. in Axi à Centro, & Axin pone ad locum fili in Limbo; filum dein deprime infra Horizontem ad Declin. ☉ 13. gr. 47. min. in Limbo, filumque dabit in Æquatore Inv. I. 70. gr. 52. min. ab extremitate. Dein filum move ad Alt. ☉. 39. gr. 32. min. in Limbo pariter infra Horizontem, & filum in Æquatore dabit Inv. II. 61. gr. 8. min. ab extremitate, cujus Complementum est 28. gr. 52. min. qui subtracti (vel si ☉ est infra H. 6. additi) gradibus Inventi I. 70. 52. min. dabunt 42. gr. pro Complemento Alt. Poli.

PROBLEMA LXXIV.

*Complementum Altitudinis Poli
ex Hora Diei, Azimutho à Meridie,
& Complemento Declinationis
detegere.*

Distantia ab H. 6. in exemplo nostro H. 9. est 45. gr. Azimuth à Meridie vero 62. gr. 56. min. & Declinatio ☉ 13. gr. 47. min. His positis

$$\begin{array}{rcl} \text{L. S. Dist. ab H. 6.} & \{ & 984948. \quad \& \\ \text{L. T. C. Declin. } \odot & \{ & 1.061013. \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{S. T.} & & - 2.045961. \\ & & 1.045961. \end{array}$$

& residuum erit L. T. Inv. I. nim. 70. gr.
52. min.

Dein

L. S. Inv. I. & L. T. Dist. \odot à Meridie 45.
gr. (qui hîc est ipse S. T.) adjunctâ unitate
addantur, hoc modo:

$$\begin{array}{rcl} \text{L. T. Az. à Mer.} & & 1.997532. \\ & & - 1.029158. \\ & & \hline & & 968374. \end{array}$$

qui est L. S. Inv. II. nim. 28. gr. 52. min. qui
subtracti à gradibus Inv. I. 70. 52. min. dant
Compl. Elev. Poli 42. gr.

In Planisphærio

Axin pone ad punctum verticale 90. fi-
lum verò ad Declin. \odot in Limbo, cum gra-
num fige in Circulo H. 9. dato à dextris,
Axin autem pariter à dextris hinc inde ver-
re, donec granum coincidat cum puncto
Azimuthi à Mer. 63. gr. proximè in Arcubus
horarijs, suprâ inventi, & Axis in Limbo

dextrorsum dabit Elevationem Poli, 48.
gr.

PROBLEMA LXXV.

*Dictum Complementum Altitudi-
nis Poli ex Distantia ☉ à Meridie,
Azimuth, & Complemento Altitu-
dinis ☉ eruere.*

Distantia ☉ à Mer. H. 9. data est 45. gr.
Azimuth à Mer. 62. gr. 56. min. Azimuth
verò ab Oriente 27. gr. 4. min. & Comple-

mentum Altitudinis ☉ 50. 27. 36. Jam
igitur

| | |
|------------------|--------------|
| L. S. Az. ab Or. | { 965803. &c |
| L. T. C. Alt. ☉ | { 1.008338. |

S. T. 4.974141.
& residuum erit L. T. Inv. I. nim. 28. gr.
52. min.

Ulterius.

| | |
|------------------|--------------|
| L. S. Inv. I. | { 968374. &c |
| L. T. Az. à Mer. | { 1.029158. |

L. T. Dist. ☉ à Mer. qui simul est

| | |
|----------|-----------|
| L. S. T. | 4.997532. |
|----------|-----------|

re-

remanet ergò L. S. Inv. II. vid. 70. gr. 52. min.
à quib⁹ si subtrah. grad. Inv. I. 28. 52. min. re-
stabunt pro Comple. Alt. Poli. 42. gr.
Si Azimuth est versùs Septentrionem, tunc
gradus utriusque Inventi addendi sunt.

In Planisphærio

Axin statue sub puncto verticali 90. filum
applica Altitudini ☉ 39. gr. 32. min. in
Limbo, granum fige in puncto Azimuthi à
Mer. in Arcubus horariis suprà invento,
Axin verò versa finistrorsum, donec gra-
num tangat Circulum H. 9. datum à dextris,
& Axis indicabit Elevationem Poli 48. gr.
in Limbo.

PROBLEMA LXXVI.

Elevationem Poli ex Altitudine

☉ *in Circulo verticali, & Declinatio-
ne eiusdem cognoscere.*

Altitudo ☉ in Circulo verticali est
10. 42. 19. Declinatio 13. 47. 16. Ita-
que

V 5

S.

S. T. & L. S. Declin. ☉ 1. 93771738.
L. S. Alt. verticalis — 95061003.

98710735.

qui est L. S. Alt. Poli 48. gr.

In Planisphaerio

Filum pone ad Declinationis gradum 13. 47. min. in Limbo; tum Axin versa, donec filum in linea. Axis abscindat gradum Altitudinis verticalis 18. 42. min. à Centro, & Axis in Limbo indicabit Altitudinem Poli, 48. gr.

PROBLEMA LXXVII.

Data duplici Altitudine ☉ vel Stellae, diversis temporibus observatâ, & Differentia temporis, ac Azimuthali, cum Complemento Declinationis, Elevationem Poli statuere.

Operosior est resolutio hujus Problematis, at tamen ab Authoribus singulariter commendata, ob insignem commoditatem ac utilitatem, quam habet in ordine ad Poli Elevationem, Lineam Meridianam, ac Sub-

sty.

stylarem in quocunque Plano quomodocunque declinante aut inclinato, mediante duplici ☉ Altitudine, ac bina umbra styli ibidem perpendiculariter erecti, inveniendam. Cum enim Planum hujusmodi alicujus denique Loci Meridiano vel Horizonti congruere debeat, Sol haud secus in tali Plano umbram projicit, ac in loco, cujus Horizonti vel Meridiano responderet; unde sicut ex Altitudine ☉ ac duplici styli umbrâ in Plano Horizontali nostrate colligere possumus Lineam Meridianam, Azimuthum, Elevationem Poli ac Substylarem, ita etiam possumus in Plano taliter declinante vel inclinato, ut ex dicendis magis patebit. Hoc tamen discrimine, quod in Plano perfecte Horizontali sufficiat, binam Altitudinem ☉ observari Quadrante, in inclinato autem stylus debeat poni 100. vel 1000. partium, & umbra mensurari, quot similes partes contineat; harum enim numerus in Tabula Tangentium quaesitus, dabit Complementum Altitudinis ☉ ut patet ex Fig. II. hîc appositâ, ubi umbra longior ponitur 1722. brevior verò 1211. partium, has si in Tabula Tangentium inquiram, invenio quoad primam 59. gr. 52. min. quod est Complementum Altitudinis ☉ 30. gr. 8. min. quoad alteram verò 50. gr. 28. min. seu Complementum Al-

u.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.





Fig. 8.



itudinis ☉ 39. gr. 32. min. Imò servire etiam potest in Mari, si latus Pyxidis Nauticæ applicetur lineæ umbræ à stylo perpendiculari proiectæ, & gradus à Lingula Magnetica abscissus notetur, ac post temporis intervallum quodcunque ad secundam umbram denuò observetur gradus Magnetis; habebitur enim tali ratione Differentia Azimuthalis & reliqua annexa, ut supra.

Ut autem etiam Operationes in resolutione Problematis intervenientes obiter declaremus, suppono hic, in quocunque Triangulo notis duobus lateribus & uno Angulo, innotescere etiam tertium latus Angulo illi oppositum. Sic in Fig. I. hic appositâ sine v. g. nota duo latera Trianguli ABC. nimirum AB. seu Complementum Declinationis, & BC. seu Complementum Altitudinis ☉ primò observatæ; si ergò volo scire etiam tertium latus seu Complementum Altitudinis Poli, debeo priùs scire Angulum DBF. Hunc autem ut inveniam, ab initio inquirō Angulum primum DBE postea etiam secundum FBE ex quo sponte sequitur etiam tertius DBF qui erat inquirendus. Tres igitur operationes hic principaliter interveniunt, pro duobus scilicet Angulis, & uno latere inquirendis.

*Operatio 1. pro 1. Angulo inveni-
endo ita instituitur.*

In nostro exemplo ante Meridiem sit ob-

servata Altitudo \odot 30. 8. 5. dein post ali-
quod temporis intervallum v. g. post horam

denuò sit notata Altitudo \odot 39. 32. 24. sic-
que Differentia temporis ponitur esse 15.
graduum. Rursus Differentia Azimutha-
lis inter duas umbræ lineas binis observatio-

nibus notata fuit 13. 35. 53. His positis
L. S. C. Diff. horariæ { 998494. &
L. T. C. Declin. datæ { 1. 061013.

S. T. abjecta una unitate — 2. 059507.

reliquum \odot / // 1. 059507.

dabit L. T. 75. 44. 43. pro Invento I. qui sub-
tracti ex Complemento Declinationis \odot

\odot / // \odot /
76. 12. 44. dabunt \odot . 28. pro Invento II.
Dein

L. S. Inv. I. { 998641. &
L. T. Diff. horariæ { 942805.

L. S. Inv. II.

1. 941446.

— 791087.

1. 150359.

erit.

eritque L. T. Anguli I. Operationis, nim.

88. 12. 13.

In Planisphærio

Axin pone ad punctum verticale 90. filum verò ad Declinationem 13. gr. 47. min. in Limbo, & gemmam fige in gradu 15. Diff. temporis in Arcubus horar. à sinistra numerando; tum Axe sinistrorsum ad gradum Declin. 13. 47. min. revolutò, gemma in Circulis horarijs monstrabit dictos 88. gr. 12. min. eos à Limbo deorsum Axin versus numerando.

Vel:

Axin pone ad Complementum Declinationis 76. gr. 13. min. in Limbo, filum verò ad Differentiam horar. 15. gr. in Axi à Centro; Axin remove ad locum fili in Limbo, hocque deprime infra Horizontem ad Declin. ☉ 13. gr. 47. min. in Limbo, & dabit in Æquatore ab extremitate Inv. I. 75. gr. 44. min. Differentia autem inter hos gradus Inv. I. & dictos gradus Complementi Declinationis dabit Inv. II. nim. 6. gr. 18. min.

De-

Denique filum applica ad hoc Inventum II. in Æquatore ab extremitate, Æquatorem verò ad locum fili in Limbo, hoc autem pone ad priorem locum Axis supra Horizontem, & filum in Linea Axis à Centro dabit Angulum quæsitum 88. gr. 12. min.

Operatio II. pro 2. & 3. Angulo investigando.

L. S. C. Differ. Azimuth. } 998764.8
L. T. C. Alt. ☉ secundò obser. { 1.008327.

S. T. subtrahatur 2.007091.
abjectâ unâ Unitate 1.007091.
& residuum erit L. T. Inv. I. hujus 2. Ope-

o / // rationis nempe 49. 39. 27. qui subtracti ex
Complemento Altitudinis primitus observa-

o / // o / // tæ 59. 51. 55. dabunt 10. 12. 28. pro Inv. II.
hujus 2. operationis. Jam verò

L. S. Inv. I. } 988206. &
L. T. Diff. Azimuthalis { 938361.

1.926567.
L. S. Inv. II. - 924850.

1.001717.
eritque L. T. Anguli 2. hujus Operationis

\circ 1 //
 46. 7. 57. qui subtracti ex Angulo 1. Ope-
 \circ 1 // \circ 1 //
 rationis 88. 12. 13. dant 42. 4. 16. pro
 Angulo III.

In Planisphærio

Axe ad punctum vert. 90. constituto ,
 filum applica 2. Alt. \odot 39. gr. 23. min. in
 Limbo , granum verò fige in Circulo Diffe-
 rentiæ Azimuthalis 13, gr. 36. min. eam ab
 V numerando; cum Axin versa ad 1. Alt.
 \odot 30. gr. 8. min. versùs sinistram; & gra-
 num in Circulo horario à ∞ indicabit An-
 gulum II. Differentia verò inter hunc &
 Ang. I. dabit Ang. III. ut suprà.

Vel:

Axin pone ad Complementum 2. Alt. \odot
 50. gr. 37. min. in Limbo , filum admove
 ad Differentiam Azimuthalem 13. gr. 36.
 min. in Axi à Centro. Axin versa ad locum
 fili in Limbo , filum verò deprime infra Ho-
 rizontem ad 2. Altitud. \odot 39. gr. 23. min.
 in Limbo, filumque in Equatore ab extremi-
 tate dat Inv. I. 49. gr. 39. min. Differen-
 tia

X

tia

tia graduum Inv. I. & Complementi I. Alt.
 ☉ 59. gr. 52. min. dat Inv. II. 10. gr. 12.
 min. Tum filum applica ad Inv. II. in Æ-
 quatore ab extremitate, Æquatorem verò
 repone ad locum fili in Limbo, & filum re-
 move ad punctum, in quo priùs fuerat Axis
 supra Horizontem, filumque in linea Axis
 dabit quæsitum Angulum à Centro, scil. 46.
 gr. 7. min. Differentia Anguli I. & II. est
 Angulus III. nim. 42. gr.

*Operatio III. ad Latus Angulo III.
 oppositum, seu Complementum Alt.*

Poli inveniendum.

Compl. I. Alt. ☉ est 59. 51. 55. Compl.
 o / //

Ang. III. 47. 55 44.

Igitur

L. T. C. Alt. I.

L. S. C. Ang. III.

{ 1. 023619. &
 987058.

S. T.

— 2. 010677.

restabit

1. 010677.

qui est L. T. Inv. I. hujus 3. Operationis,

o / //
 nim. 51. 58. 25. quibus subtractis ex Com-

plemento Declinationis 76. 12. 44. rema-

o / //
 nent 24. 14. 19. pro Inv. II. hujus 3. Ope-
 rationis. Denique

L.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| L. S. C. Inv. II. | { 995991. & 970073. |
| L. S. Alt. primò observatæ | |

| | |
|------------------|------------|
| L. S. C. Inv. I. | 1. 966064. |
| | — 978959. |

987105.

qui tandem erit L. S. A. P. 48. gr. proxime.

In Planisphærio

Axin pone ad verticem 90. filum ad 1. Alt. ☉ in Limbo 30. gr. 8. min. granum verò fige in Circulo horar. Ang. III. 42. gr. 4. min. ab V numerando; tum Axin repone ad Declinationem 13. gr. 47. min. & granum dabit Parallelum Elevationis Poli 48. gr. & simul Circulum horar. H. 8. datæ.

Vel:

Axin pone ad Complementum Altitudinis ☉ primò observatæ, scil. 59. gr. 32. min. in Limbo, filum move ad Angulum III. in Axi à Centro 42. gr. 4. min. Axin remove ad punctum fili, filum deprime ad Altitudinem ☉ primò observatæ 30. gr. 8. min. in Limbo infra Horizontem; filum in Æquatore ab extremitate dat Inv. 1. scil. 51 gr.

X 2

58.

58. min. Differentia graduum Inv. I. & Com-
plementi Declinationis \odot erit Inven-
tum II. 24. gr. 14. min. Filum dein pone
ad Inv II. in Æquatore ab extremitate, fi-
lum in Limbo dat Elevationem Poli 48. gr.

PROBLEMA LXXVIII.

*Resolutionem Problematis praece-
dentis aliâ breviori viâ perficere, &
imprimis quidem Angulum I. invenire.*

o 1 //

Declinatio \odot 13. 47. 16. Semissis Diff.
horariae 7. gr. 30. Hinc
L. S. Declin. \odot { 93771738.8
L. T. Semissis Diff. horariae { 91194291.

S. T. 84966029.

o 1 //

qui est L. T. C. Anguli I. scil. 1. 47. 49.
Complem. 88. gr. 12. min. 11 sec.

In Planisphaerio

Axe ad Compl. Declin. 76. gr. 13 min.
posito, filum admove gradui Semissis ho-
rariae 7. 30. min. in linea Axis à Centro;
tum Axin reduc ad locum filii, hoc autem
de-

deprime ad Compl dictæ Semissis 82. gr.
30. min. in Limbo, filumque in Æquatore
ab extremitate dat Complementum Ang. I.
nim. 88. gr. 12. min.

Angulum II. indagare.

| | | |
|--|--------|-------------|
| Differentia Azimuthalis est | 0 1 // | 13. 35. 53. |
| Compl. Altitudinis secundæ | 0 1 // | 50. 27. 36. |
| Itaque | | |
| L. S. Diff. Azimuthalis | | 937126 &c |
| L. S. C. Alt. secundæ | | 988715. |
| | | <hr/> |
| | | 1. 925841. |
| L. S. Diff. horariæ | | — 941299. |
| | | <hr/> |
| addito Sinu Toto provenit | | 1. 984542. |
| L. S. C. Declin. | | — 998730. |
| | | <hr/> |
| | | 985812. |
| qui est L. S. Anguli II. 46. gr. qui subtracti à | | |
| I. Angulo 88. gr. relinquunt 42. gr. pro | | |
| III. Angulo, non attentis minutis. | | |

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Altitudinis secundæ
X 3 dæ

dæ 50 gr. 27. min. in Limbo, ſilum move ad differentiam Azimuthalem 13. gr 36. min. in Axis à Centro, Axis volve ad Diff. hor. 15 gr. in Limbo, ſilum in linea Axis à Centro dat 44. gr. 27. min. ad hos poſtea ſilum diſpone in Limbo, Axis verò ad Compl. Declinationis 76. gr. & 12. min. ſilum in linea Axis à Centro dabit Angulum II. 46. gr. 8. min. Differentia hujus Ang. II. & Ang. I. 88 gr 12. min. erit Angulus III. nim. 42. gr. 4. min.

PROBLEMA LXXIX.

Angulum II. datâ ſolâ Differentiâ horariâ, & duplici ☉ Altitudine inveſtigare.

Compl. Declin. ☉ est 76. 12. 44. Dist.

hor. 15. gr. Compl. Alt. I. 59. 51. 55.

Compl. Alt. II. 50. 27. 36. Itaque

L. S. C. Declin. ☉ { 998730. &
L. S. Diff. hor. { 941299.

(S.T.)

reſiduum erit Inv. I. L. S. 940029.

Po.

| | | | |
|-----------------------|---|-----|---------|
| | 0 | / | // |
| Postea gradus Inv. I. | { | 14. | 33. 28. |
| C. Alt. II. | { | 59. | 51 55. |
| C. Alt. .I. | { | 50. | 27. 36. |

124. 52. 59.

| | |
|----------------------|---------------|
| Productum divid. per | 2. |
| Semissis erit | 62 26. 29 |
| Compl. Alt. II. | — 50. 27. 36. |

| | | |
|-------------------------|-------------|-----|
| remanent grad. Inv. II. | 11. 58. 53. | Jam |
| L. S. Semissis | { 994770. | & |
| L. S. Inv. II. | { 931721. | |

1.926491.

| | |
|------------------|-----------|
| L. S. C. Alt. I. | — 993693. |
|------------------|-----------|

addito Sinu Toro 1.932798.

| | |
|---------------|-----------|
| L. S. Inv. I. | — 940029. |
|---------------|-----------|

Denuò addito S. T. 1.992769 (996385.

Summa dividatur per 2.

qui est L. S. graduum 66. 57. min. qui duplicati dant 133 gr. 54. min. pro Compl. Anguli II. subtracti verò ex 180. (vel si Summa esset minor, ex 90.) dant Ang. II. prope verum ; modica enim Differentia propter multiplices Operationes intervenientes, ac minuta sec. hinc inde neglecta, in similibus curanda non est, prout jam supra fol. 212. monuimus.

In Planisphaerio

Axin pone ad Dist. hor. 15. gr. in Limbo, filum verò ad Compl. Declin. 76. gr. 12. min. in linea Axis à Centro, filumque in Limbo dabit Inv. I. nim. 14. gr. 33. min. Ad hos gradus pone Æquatorem, filum autem ad gradus Alt. I. 30. in Limbo, & granum fige in gradu Alt. II. 39. 32. min. in Circulis horarijs quærendo; tum Axin colloca ad punctum verticale 90. & granum in Circulis horarijs ab Axe dat Angulum II. 40. gr.

PROBLEMA. LXXX.

*Differentiam Azimutbalem ex sola
Differentia Temporis v. g. horaria,
ac duplici ☉ Alitudine conclu-
dere.*

Inventum I. ac Semissis sunt eadem, quæ in Probl. præcedente, adeoque eodem modo indaganda. Proinde

| | |
|---|--------|
| o / // | o / // |
| Inv. I. fuit 14. 33. 28. Semissis 62. 26. 29. | Com- |

Compl. Alt. I. 59. 51. 55. Compl. Alt. II.

50. 27. 36. Itaque

A Semisse 62. 26. 29.

Inv. I. — 14. 33. 28.

erit hoc Inv. II. 47. 53. 1. Jam

L. S. Semissis { 994770 &

L. S. Inv. II. { 987027.

1. 981797.

L. S. Comp. Alt. I. — 993693.

S. T. 1. 988104.

L. S. C. Alt II. — 988715.

S. T. 1. 999389 (999695.

Summa divid. per 2

Productum erit L. S. 83. gr. 13. min. adeo-
que ejus duplum 166. gr. 26. min. qui sub-
tracti ex 180. (vel si Summa dupli est minor,
ex 90.) dant Diff. Azimuthalem prope ve-
rum, ut prius.

In Planisphaerio

Axin pone ad Alt. II. 39. gr. 32 min. fi-
lum verò ad Compl. Inv. I. 75. gr. 47. min.

X 5

&

& filum in Parallelo Alt. I. 30. gr. dat Circulum horarium Diff. Azimuthalis 13. gr.

PROBLEMA LXXXI.

*Differentiam horariam ex duplici
Altitudine ☉, ac Differentia Azi-
muthali inferre.*

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| | ° / // |
| Compl. Alt. I. est | 59. 51. 55. Compl. |
| | ° / // |
| Alt II. 50. 27. 36. | Compl. Diff. Azim. |
| | ° / // |
| 76. 24. 7. | Compl. Declin. 76. 12. 44. |
| Itaque | |
| L. S. C. Diff. Azim. | { 998764. & |
| L. T. C. Alt. II. | { 1.008327. |
| | <hr/> |
| S. T. | — 2.007091. |
| manent | 1.007091. |
| | ° / // |
| qui est L. T. Inv. I. nīm. | 49. 39. 25. Ulteriùs. |
| | ° / // |
| A gradibus Compl. Alt. I. | 59. 51. 55. |
| subtrah. gradus Inv. I. | 49. 39. 25. |
| | <hr/> |
| erit Inventum II. | 10. 12. 30. Jam |

L.

L. S. C. Inv. II. { 999307. &
L. S. Alt. II. { 980388.

1. 979695.

L. S. C. Inv. I. — 981114.

erit L. S. Inv. III. 998581. ni. 75. gr. 26. m.

Ex L. S. C. Inv. II. 1. 940054.

addito S. T.

L. S. C. Declin. — 998730.

erit L. S. Diff. horariae 941324. nim. 15. gr. proximè.

In Planisphærio

○ / //

Axin pone ad Compl. Alt. II. 50. 27. 36.
filum verò ad Diff. Azim. 13. gr. 36. min. in
Axi à Centro; dein Axin pone ad locum
fili, & filum deprime ad Alt. II. 39. gr.
32. min. in Limbo infra Horizontem, filum-
que in Æquatore ab extremitate dat Inv. I.

○ / //

49. 39. 25. Differentia graduum dicti

○ / //

Inv. I. & Compl. Alt. I. 59. 51. 55. dant

○ / //

Inv II. 10. 12. 30. Præterea filum pone ad
Inv. II. in Æquatore ab extremitate, & dabit
in Limbo Inventum III. nim. 75. gr. 26.
min.

min. Dein filum promove ad Compl. Inv.
III. in Limbo 14. gr. 34. min. Axin verte,
donec filum in eo à Centro abscindat Com-
plementum Declinationis 76. gr. 12. min.
& Axis in Limbo monstrabit Diff. horariam
15. gr.

PROBLEMA LXXXII.

*Angulum III. ex Azimuth à Me-
ridie v. g. H. 8. in nostro exemplo,
Elevationem Poli & Compl. Declina-
tionis eruere.*

Azimuth à Meridie H. 8. est 76. gr 32.
min. Compl. Elevationis Poli 42. gr. Compl.

| | |
|---------------------------|-------------|
| Declinationis 76. 12. 44. | Jam |
| L. S. Azimuth à Mer. | { 998789. & |
| L. S. C. A. P. | { 982551. |

| | |
|------------------------|--------------|
| | 1. 981340. |
| L. S. C. Declinationis | — 998730. |
| erit L. S. Anguli III. | 982610. nim. |
| 0 / // | |
| 42. 4. 13. | |

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Elevationis Poli
42.

42. gr. filum ad Azimuth à Meridie 76. gr.
32. min. in Axì à Centro, Axin dein pone ad
Compl. Declinationis 76. gr. 12. min. fi-
lúmque in Axe dat Angulum III. 42. gr.
4. min.

PROBLEMA LXXXIII.

*Angulum III. ex hora Diei, Com-
plemento Alt. 1. & Compl. Eleva-
tionis Poli invenire,*

Distantia ☉ à Meridie H. 8. est 60. gr.
Compl. Elev. Poli 42. Compl Alt. 1. 59.
gr. 52. min. Itaque

L. S. Dist ☉ à Meridie H. 8. { 993753 &
L. S. C. Elev. Poli { 982551.

L. S. C. Alt. 1.

1. 976304

— 993694 —

erit L. S. Ang. III.
nim. 42. gr. 4. min.

982610.

In Planisphærio

Axin dispone ad Compl. Elev. Poli 42.
gr. filum ad Dist. ☉ à Meridie 60. gr. in li-
nea

nea Axis à Centro, & Axe ad Compl. Alt. I. 59. gr. 52. min. converſo, filum in linea Axis à Centro dabit Angulum III. nim. 42. gr. 4. min.

Quòd ſi dictum Angulum III. 42. gr. 4. min. ſubtrahas ab Angulo I. 88. gr. 12. min. habebis Angulum II. 46. gr. 8. min.

PROBLEMA LXXXIV.

Diſtantiã à Meridie ex Angulo III. Complemento Elevationis

Poli, & Compl. Alt. I. colligere.

Angulus III. eſt 42. gr. 4. min. Compl. Elev. Poli 42. gr. & Compl. Alt. I. 59. gr. 52. min. Igitur

L. S. Anguli III.

L. S. C. Alt. I.

{ 982610 &
993694.

L. S. C. Elev. Poli

i. 976304.

— 982551.

erit L. S. Diſt. ☉ à Mer.
60. gr.

993753. nim.

In Planiſphærio

Axin pone ad Compl. Alt. I. 59. gr. 52. min.

min. filum verò ad Angulum III. 42 gr. 4 min. in linea Axis à Centro, & Axe ad Compl. Elev. Poli 42. gr. disposito, filum in Axi indicabit Distantiam à Meridie, nim. 60. gr.

PROBLEMA LXXXV.

Azimuth à Meridie v. g. in nostro exemplo H. 8. ex Angulo III. Compl.

Declinationis, & Compl. Elev. Poli invenire.

Angulus III. est 42. gr. 4. min. Compl.
 $\circ \quad / \quad //$

Declinationis 76. 12. 44. Compl. Elev. Poli 42. gr. Itaque

L. S. Ang. III.

L. S. C. Declin.

{ 98261020. &
 { 99873020.

L. S. C. A. P.

1. 98134040.
 — 98255109.

erit L. S. Azimuth à Mer. 99878931. nim.

$\circ \quad / \quad //$

76. 32. 2.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Declinationis

$\circ \quad / \quad //$

76. 12. 44. filum verò ad Ang. III. 42. gr. 4. min.

4. min. in linea Axis à Centro ; tum Axin
revolve ad Compl. Elev. Poli 42. gr. filum
in linea Axis dat Azimuth à Meridie 76. gr.
32. min.

PROBLEMA LXXXVI.

*Altitudinem ☉ H. 6. ex Declina-
tione ejusdem, & Elevatione Poli
indagare.*

| | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-------------|
| | 0 | 1 | 11. |
| Declinatio ☉ est | 13. | 47. | 16. |
| Elevatio Poli 48. gr. Nunc ergo | | | |
| L. S. Elev. Poli | | | 598710735 & |
| L. S. Declin. ☉ | | | 93771738. |

S. T. 4.92482473.

residuum erit L. S. A. ☉ H. 6. nim. 10 12. 5.

In Planisphaerio

Idipsum invenitur ; filum enim in pun-
cto lineæ H. 6. ubi Parallelum ☉ datum
23. gr. 17. min. Ω interfecat , constitu-
tum abscinder in Limbo gradus Alt. quæsi-
tæ nim. dictos 10. 12. min.

PRO-

PROBLEMA LXXXVII.

Eandem Alt. H. 6. ex Alt. ☉ Meridiana, & Sinu Dimidij determinare.

Constat ex Problemate 10. & modus facillimus illam inveniendi, & eam in nostro

exemplo esse $55^{\circ} 47' 26''$. Sinus verò Dimidij utriusque Alt. Merid. Maximæ & Minimæ, nim. Borealis & Australis (de quo postea)

est $40^{\circ} 31' 49''$. His positis

A Sinu Alt. Meridianæ $81695.$

subtrah. Sinus Dimidij, $64984.$

vel vicissim, $17711.$ nim.

10. gr. 12. min.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli disposito, filum applica gradui Declinationis $13^{\circ} 47'$ min. in Linea Axis à Centro, & filum in Limbo monstrabit Altitudinem H. 6. nim. 10. gr. 12. min.

Y

PRO.

PROBLEMA LXXXVIII.

Altitudinem ☉ in Circulo Verticali Primario, seu in Linea veri Orientis, ex Declinatione ejusdem, & Altitudine Poli deprehendere.

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------------|-----|
| | o | / | // |
| Declinatio ☉ est | 13. | 47. | 16. |
| Altitudo Poli | 48. | gr. | Jam |
| S. T. & L. S. Declin. addantur | 1. | 93771738. | |
| L. S. A. Poli | | — 98710735. | |

95061003.

hócque residuum erit L. S. Alt. ☉ in Circulo Verticali, nempe 18. 42. 19.

In Planisphærio

Ductâ lineâ verticali, saltem occultâ, à Zenith seu gradu 90. per Centrum Planisphærij, tanquam punctum H. 6. filum regulæ promoveatur ad punctum, ubi Parallelus datus, nim. 13. gr. 47. min. ☉ lineam illam occultam seu Circulum Verticalem intersectat, & filum in Limbo abscindet

det dictos gradus Altitudinis 18. 42. min.
Vel :

Etiā absque linea verticali, Axin dirige ad gradum Elevationis Poli, filum verò ad gradum Declinationis 13. 47. min. in Limbo, & filum in linea Axis à Centro notabit dictos 18. gr. 42. min. pro Altitudine.
☉ in Circulo Verticali,

PROBLEMA LXXXIX.

*Altitudinem ☉ in Æquinoctio ex
Complemento Elevationis Poli, & Di-
stantia ☉ ab H. 6. reperire.*

Complementum Elevationis Poli est 42. gr.
Distantia ☉ ab H. 6. v. g. H. 9. verò
45. gr. Igitur

L. S. C. A. P. { 98255109. &
L. S. Dist. ☉ ab H. 6. { 98494850.

S. T. x. 96749959.
residuum erit L. S. A. ☉ H. 9. in Æquino-
ctio, nim. 28. 14. 19.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli 48. gr. disposito,

1721

Y 2

fr.

filum promove ad punctum, ubi Arcus H. 9. Equatorem intersecat, & filum in Limbo monstrabit dictam Altitudinem ☉ in Equinoctio.

PROBLEMA XC.

Sinum Dimidij Altitudinis Meridiana, nim. Borealis & Australis ex Complementary Elevationis Poli, & Compl. Declin. ☉ calculare.

Servit hoc ad Problemata sequentia.
Elevatio Poli est 48. gr. Compl. Declin. ☉

0 / //

76. 12. 44. Itaque

| | | |
|---------------------|------------|---|
| L. S. C. Elev. Poli | 598255109. | & |
| L. S. C. Declin. ☉ | 59873020. | |

S. T.

4. 98128129.

& residuum erit L. S. Dimidij, cujus Sinus

0 / //

simplex est 64985. seu 40. 31. 49.

In Planisphaerio

Axin pone ad Compl. Elev. Poli 42. gr. filum vero ad Compl. Declin. 76. gr. 12. min. in Axi à Centro, & filum in Limbo notabit dictos gradus Dimidij.

PRO.

PROBLEMA XCI.

*Idem Dimidium alio modo ex
Compl. Elev. Poli, & Declinatione da-
ta invenire.*

Compl. Elev. Poli est 42. gr. Declinatio
data 13. gr. 47. min. Itaque

Gradibus Compl. Elev. Poli 42. semel
adde, & semel subtrahe Declinationem da-
tam, v. g. in nostro exemplo, hoc modo:

$$\begin{array}{r} 42. \text{ — } \cdot \quad 42. \text{ — } \cdot \\ 13. \quad 47 \quad 13. \quad 47. \\ \hline \end{array}$$

addendo 55. 47. 28. 13. subtrahendo:
Hujus utriusq; producti Sinus adde, videlicet:

82691.

47280.

129971.

qui Numerus divisus per 2. dabit Sinum Dimi-

dij, nim. 64985 $\frac{1}{2}$, cui respondent 40. 31. 49.

In Planisphaerio

Gradibus Aequatoris 42. adde gradus De-
clin. 13. 47. min. & habebis 55. gr. 47.

Y 3

min.

min. pro Altitudine Meridiana Boreali; si
 verò eandem Declin. subtrahas ab Alt. Æ-
 quatoris invenies 28. gr. 13. min. pro Alt.
 Australi. Ut autem ex Planisphaerio erua-
 tur Sinus Dimidij dictæ utriusque Altitudi-
 nis, supponendum est, Sinum Totum Plani-
 sphaerij, seu Radium vel Semidiametrum
 ejusdem jam haberi divisam in 1000. v. g.
 partes, vel hujus defectum per scalam toti-
 dem partium passim notam, ac eidem com-
 mensuratam, vel etiam per Instrumentum
 Proportionum suppleri. Jam itaque unus
 pes Circini ponitur in Meridiano seu Limbo
 ad dictam Altitudinis Boreæ gradum 55.
 47. min. altero pede ita distento, ut line-
 am Horizontalem præcisè radat, & scalæ di-
 ctarum 1000. partium applicatus abscindet
 ibidem 826. partes. Rursus ponatur pes
 unus Circini ad gradum Alt. Australis 28.
 13. min. & altero pede Circini linea Hori-
 zontalis præcisè radatur, & in scala abscin-
 det hæc apertura Circini 472. partes, qui
 duo numeri in unam Summam redacti con-
 ficiunt 1298. cujus Summæ dimidium 649.
 dabit Sinum Dimidij utriusque dictæ Alt.
 Merid. quæsitum. Quod si Sinus Totus po-
 neretur divisus in 10000000. partes (pro-
 ut in Tabula Sinuum divisus supponitur)

prodiret totus numerus 6498497. Dimidio respondens.

PROBLEMA XCII.

Altitudinem ☉ currentem ex hora Diei, Sinu Dimidij, ac Elev. Poli supputare.

Dist. ☉ ab H. 6. v. g. H. 9. est 45. gr.

Sinus Dimidij 40. 31. 49. & Alt. H. 6.

10. 12. 5. Itaque

L. S. Dimidij

L. S. Dist. ☉ ab H. 6.

98128129 &

98494850.

S.T.

x. 96622979.

& residui Sinus simplex erit

4595109.

qui additus Sinu Alt. H. 6.

1771085.

6366194

dat Sinum Alt. ☉ quæsitæ, nim. 39. 32. 24.

In Planisphærio

Ad Elevationem Poli disposito , filum
Regulæ promoveatur , usquedum Paralle-
lus

Ius \odot datus (in nostro exemplo 13. gr. 47. min. Ω) ſecet H. 9. propoſitam, & ſilum in Limbo abſcindet dictos gradus Alt. \odot quaſitae.

PROBLEMA XCIII.

Eandem Altitudinem \odot ex Alt. H. 6. Compl. Declin. \odot & Compl. Elev. Poli, ac hora Diei metiri.

Alt. H. 6. eſt 10. 12. 5. Compl. Declin.

76. 12. 44. Compl. Elev. Poli 42. gr. & Diſt. \odot ab H. 6. v. g. H. 9. 45. gr. Igitur
 L. S. C. A. P. { 982551.
 L. S. C. Declin. \odot { 998730. &
 L. S. Diſt. \odot ab H. 6. v. g. H. 9. 984948.

2. 966229.

Hinc autem abjeſta tota prima figura ſeu numero 2. ad ſiniſtram, reſiduum erit L. S. cujus Sinus Simplex addendus eſt Sinui Alt. H. 6. (in Hyeme vero, & infra H. 6. ſubtrahendus) v. g. in nostro exemplo

45942.

17710.

63652.

Cui

Cui Sinui respondent 39. gr. 32. min. pro
Alt. ☉ quæsitæ.

In Planisphærio

Ad Elev. Poli disposito filum subleva ad
Arcum H. q. ubi cum Parallelus ☉ 23. gr.
☉ interfecat, & filum in Limbo signabit
gradus Alt. quæsitæ 39. 32. min.

PROBLEMA XCIV.

Complementum Alt. ☉ ex Dist.

☉ à Meridie, Compl. Declinationis,
& Azimuth à Meridie metiri.

Dist. ☉ à Meridie H. q. est 45. gr. Compl.

☉ 1. //

Declin. 76. 12. 44. & Azimuth à Meridie
62. gr. 56. min. Iraque

L. S. Dist. ☉ à Meridie { 98494850. &

L. S. C. Declin. ☉ { 99873020.

1. 98367870.

L. S. Azimuth à Meridie — 99496310.

98871560.

☉ 1. //

qui est L. S. C. A. ☉ nim. 50. 27. 36.

Y f

In

In Planisphærio

Filum applica gradui Azimuthali à Meridie 62. 56. min. in Limbo, Axin verò versa, donec in eo filum abscindat gradum Complementi Declin. 76. 13. min. à Centro; tum filum retrahe ad gradum Dist. ☉ à Meridie 45. in Limbo, & istud in linea Axis à Centro indicabit Complementum Alt. ☉ 50. gr. 28. min.

PROBLEMA XCV.

Altitudinem ☉ ex Compl. Elev. Poli, Dist. ☉ ab H. 6. & Compl. Declin. dignoscere.

Compl. Elev. Poli est 42. gr. Dist. ☉ ab H. 6. in nostro exemplo 45. gr. Compl.

Declin. 76. 12. 44. Jam L. T. C. A. P.. L. S. Dist. ☉ ab H. 6. v. g. H. 9. 98494850.

S. T.

x. 98039224

residuum erit L. T. Inv. I. nim. 32. 29. 3. Hos gradus subtrahe à Compl. Declin. hoc modo:

76.

0 1 11
76. 12. 44.
32. 29. 3.

Inventum II. 43. 43. 41.

si verò est infra H. 6. manè aut vesperi, ad-
de.

L. S. C. Inv. II.

L. S. A. P.

{ 98589152. &

{ 98710735.

L. S. C. Inv. I.

1. 97299887.

— 99201056.

98038831.

eritque L. S. Alt. quæ sitæ scil. 39. 32.

In Planisphærio

Axin accommoda Complemento Elev.
Poli 42. gr. in linea Axis à Centro, filum
verò gradui distantie \odot à Meridie 45. gr.
dein Axin pone ad punctum seu locum fili
in Limbo, filum autem deprime infra Ho-
rizontem ad gradum Elev. Poli 48. in Lim-
bo, & hoc indicabit in Æquatore ab extre-
mitate Inv. I. 32. gr. 29. min. Differentia
Inventi I. & Complementi Declinationis
76. gr. 13. min. (vel infra H. 6. eorum Sum-
ma) erit Invent. II. 43. gr. 43. min. Deni-
que

348 *Usus & utilitas Planisphaerii*

que filum infra Horizontem colloca ad Inv.
II. in Æquatore in priori suo situ relicto ab
extremitate, filumque in Limbo infra Ho-
rizontem monstrabit 39. gr. 32. min. pro
Alt. ☉ quæsitâ. Vels

Axi ad Alt. Poli 48. gr. constituto, filum
eleva ad Arcum H. 9. datæ in puncto, in quo
Parallelus ☉ 23. 8. dictum Arcum interse-
cat, filumque in Limbo dabit dictam Alt. ☉

PROBLEMA XCVI.

*Eandem Alt. ☉ ex Hora Diei, seu
Dist. ☉ ab H. 6. Declinatione ejus-
dem, & Complemento Alt. Poli
elicere.*

Dist. ☉ ab H. 6. v. gr. H. 9. est 45. gr.

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|
| Declinatio ☉ | 13. 47. 16. | Complem. Alt. |
| Poli | 42. gr. | Jam |
| L. S. Dist. ☉ ab H. 6. | | { 984948.86 1.061013. |
| L. T. C. Declin. | | |

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| S. T. | | -2.045961. |
| remanet L. T. Inv. L. | | 1.045961. |

| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| min. | 70. | 51. | 39. |
| C. A. Poli | 42. | | |

| | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------|
| erit Inv. II. | 28. | 51. | 39. | Dein |
| | | | | L. |

per Problemata demonstratur. 349

| | |
|-------------------|-------------|
| L. S. C. Inv. II. | { 994239. & |
| L. S. Declin. ☉ | |

1.931956.

| | |
|------------------|-----------|
| L. S. C. Inv. I. | — 951569. |
|------------------|-----------|

erit L. S. Alt. ☉ quæsitæ 980387. ☉
nim. 39. gr. 32. min.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Declin. ☉ 76. gr. 13. min. filum verò ad Dist. ☉ à Meridie 45. gr. in Axi; hunc dein pone ad locum fili; hoc autem deprime infra Horizontem ad Declin. ☉ in Limbo 13. gr. 47. min & filum in Æquatore ab extremitate dat Inv. I.

o / //
nim. 70. 51. 39. Differentia autem horum graduum Inv. I. & Complementi Elev. Poli 42. gr. (vel infra H. 6. eorum Summa) dabit Inv. II. Denique filum pone ad gradus Inv. II. 28. 51. min. in Æquatore ab extremitate, & filum in Limbo indicabit Alt. ☉ quæsitam, videl. 39. gr. 32. min. Vel brevius:

Axin dirige ad Elev. Poli, filum verò ad punctum H. 9. datæ, ubi Parallelum ☉

23. gr. \odot intersecat, & filum in Limbo monstrabit dictam Alt. \odot .

PROBLEMA XCVII.

Altitudinem \odot ex Azimuth ab Oriente, Declinatione \odot & Elevatione Poli determinare.

o 7 //

Azimuth ab Oriente est 27. 3. 50. & consequenter à Meridie, cujus est Complementum,

o 1 //

erit 62. 56. 10. Declin. \odot 13. 47. 16. & Elevatio Poli 48. gr. His positis

L. S. Azim. ab Oriente { 965799. &
L. T. C. A. P. { 995443.

S. T.

1. 961242.

o 1 //

residuum erit L. T. Inv. I. 22. 16. 36. Dein

L. S. C. Inv. I. { 996632. &
L. S. Declin. \odot { 937717.

L. S. Elev. Poli

1. 934349.

- 987107.

947242.

o 1 //

qui est L. S. Inv. II. scil. 17. 15. 49. qui gradus additi Invento I. dabunt Alt. \odot

o / //

39. 32. 24. si verò Azimuth est versùs Septentrionem, subtrahendi erunt.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl Elev. Poli 42. gr. filum verò ad Azimuth à Meridie in Axi 62. gr. 56. min. Axin dein verte ad locum fili in Limbo, filum deprime infra Horizontem ad Elev. Poli 48. gr. in Limbo, & filum in Æquatore dabit Inv. I. 22. gr. 16. min. Porro filum move ad Declin. ☉ 13. gr. 47. min. in Limbo infra Horizontem, & filum in Æquatore à Centro indicabit Inv. II. 17. gr. 15. min. qui additi Invento I. dant Alt. ☉ 39. gr. 32. min. Vel :

Axi ad Elev. Poli disposito, filum pone ad Declin. ☉ & filum in Circulo Horario dicti Azimuth à Mer. à sinistris dabit Paralelum Alt. ☉.

PROBLEMA XCVIII.

Eandem Alt. ☉ ex Azimuth à Septentrione, Horâ Diei, ac Elev. Poli statuere.

Azimuth à Septentrione habetur, si Azimutho

mutho ab Oriente $\overset{\circ}{17} \overset{/}{3} \overset{//}{50}$. addantur $\overset{\circ}{93}$.

gr. adeoque Azimuth à Sept. erit $\overset{\circ}{117} \overset{/}{3} \overset{//}{50}$.
 Hora Diei data est H. 9. & sic Dist. ☉ à Mer.
 erit 45. gr. Elevatio Poli 48. Jam L. S.
 Elev. Poli, & L. T. Dist. ☉ à Mer. addun-
 tur, & S. T. subtrahitur: quia verò in no-
 ſtro exemplo L. T. Dist. ☉ à Mer. eſt i-
 pſe Sinus Totus, ne in hoc particulari caſu
 nunc addi, ac denuò abjici debeat, ideo hîc
 & nunc ſolus L. S. Elev. Poli 987107.

jam erit L. T. Inv. I. $\overset{\circ}{36} \overset{/}{37} \overset{//}{4}$ cujus

Compl. eſt $\overset{\circ}{53} \overset{/}{22} \overset{//}{56}$. qui ſi ſubtrahantur
 ex gradibus Azimuth à Sept. hoc modo:

$$\begin{array}{r} \overset{\circ}{117} \overset{/}{3} \overset{//}{50} \\ \underline{\overset{\circ}{53} \overset{/}{22} \overset{//}{56}} \end{array}$$

remanebunt pro Inv. II. $\overset{\circ}{63} \overset{/}{40} \overset{//}{54}$.
 Denique L. S. Inv. L. $\{ 977559 \}$ &
 L. T. C. A. P. $\{ 995443 \}$.

L. S. C. Inv. II. $\begin{array}{r} 1.973002. \\ - 964674. \\ \hline \end{array}$

qui eſt L. T. C. Alt. ☉ quaſitæ, nim. $\overset{\circ}{50}$
 gr. 28. min. proximè.

In

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Elev. Poli 48. gr. filum verò ad Dist. \odot à Mer. 45. gr. Axin dein colloca ad locum fili in Limbo, filum autem deprime infra Horizontem ad Dist. \odot ab H. 6. 45. gr. & filum in Æquatore à Centro dabit Compl. Inv. I. 53. gr. 23. min. Differentia horum graduum, & Azi-

muti à Sept. 117. 3. 50. (vel eorum Summa, si \odot est infra H. 6.) erit Inventum II.

63. 40. 54. Prætereà filum deprime infra Horizontem ad hos gradus Inv. II. in Æquatore à Centro, Æquatorem applica ad locum fili, filum verò pone ad punctum, ubi antea erat Axis supra Horizontem, filumque in linea Axis dabit Compl. Alt. \odot nim. 50. gr. 28. min.

PROBLEMA XCIX.

Depressionem \odot infra Horizontem, datâ Horâ Noctis, Alt. \odot H. 6. ac Declinatione ejusdem reperire.

Ponamus H. 9. Noctis, Alt. verò \odot

Z

H.

o + //

H. 6. esse 10. 12. 5. & Declinationem
 o / //

13. 47. 16.

Operatio pro Depressione ☉ infra Horizontem invenienda de Nocte, procedit sicut pro Elevatione ejusdem de Die infra H. 6. Sicut enim juxta Probl. 93. ad eruendam Alt. ☉ Sinus Simplex 45942. addi debuit Sinui Alt. H. 6. ita hîc ad habendam Depressionem ☉ v. g. H. 9. Noctis, reliquis omnibus manentibus Sinus Simplex Alt. H. 6. loco additionis subtrahi debet à dicto Sinu, hoc modo:

45942.

17710.

28232. nim. 16. gr. 24. min.

in Hyeme tamen, quando ☉ jam est infra H. 6. addendus erit.

Idem juxta alia Problemata haberi potest, contrario modo procedendo, & fingendo nos, dum operamur, quasi Antipodes, quæ ulterius exemplificare supervacaneum ducimus.

In Planisphærio

Ad Elev. Poli disposito, filum deprime, donec in Parallelo ☉ dato abscindat H. 9.
No.

Noctis; tunc enim in Limbo abscindet gradus suprà inventos 16. 24. min.

PROBLEMA C.

Horam Diei ex Alt. H. 6. & Alt.

☉ datâ, ac Sinu Dimidij cognoscere.

Alt. ☉ in nostro exemplo est ^{0 1 //} 39. 32. 24.

Alt. H. 6. verò ^{0 1 //} 10. 12. & 5. Sinus Dimidij

^{0 1 //} 40. 31. 49.

A Sinu Alt. ☉ datæ 63661.

S. Alt. ☉ H. 6. — 17710.

45951.

Hujus producti L. S. &

S. T. addantur 1. 966229.

L. S. Dimidij — 981281.

984948.

qui est ipsissimus L. S. Dist. ☉ ab H. 6. nim;

45. gr. qui in tempus conversi dant H. 9.

In Planisphærio

Ad Elev. Poli disposito, filum applica

Z 2

Alt.

Alt. \odot datae 39. gr. 32. min. & in puncto,
ubi secuerit Parallelum \odot 23. gr. 17. min.
 Ω , indicabit in casu nostro H. 9.

PROBLEMA. CI.

*Ex Alt. \odot datâ, & Alt. H. 6. inde-
pendenter à Sinu Dimidij, Horam
Diei concludere.*

Alt. \odot data est 39. 32. 24. Alt. H. 6.

10. 12. 5. Sinus Dimidij 40. 31. 49.

Diximus suprâ fol. 201. Complemen-
tum Arithmeticum haberi, si Logarithmus
datus subtrahatur à Sinu Toto. Subtraha-
tur ergò L. S. Alt. Aequatoris à S. T. hoc
modo :

$$\begin{array}{r} 1000000. \\ - 982551. \\ \hline \end{array}$$

017449.

Hoc igitur Compl. Arith. addatur in Hye-
me Summæ, in Æstate verò Differentiæ Si-
num Alt. \odot datae, & Alt. H. 6. qui juxta
Probl. præcedens, additâ unitate ad fini-
stram, dabunt

huic addatur præf. C. Arith. 1. 966229.
017449.

L. S. Compl. Declin. 1. 983678.
— 998730.

984948.
quies L. S. Dist. ☉ ab H. 6. nim. 45. gr.
qui in tempus conversi exhibent H. 9.

In Planisphaerio

Ut in Probl. præcedenti.

PROBLEMA CII.

*Horam Diei, etiam sine Comple-
mento Arithmetico, ex Altitudine ☉,
Alt. H. 6. Elevatione Æquatoris, & Com-
plemento Declinationis determi-
nare.*

☉ / //

Alt. ☉ est 39. 32. 24. Alt. H. 6. verò
☉ / //

10. 12. 5. Elev. Æquatoris 42. gr. Compl.

☉ / //

Declin. 76. 12. 44. Jam à Sinu Alt. ☉
datae 63661.

S. Alt. H. 6. in Æst. — 17710. in Hyeme adda-
tur

45951.

Z 3

Ab

358 *Usus & utilitas Planisphærij*

Ab hujus producti Logarithmo Sinûs, addi-
dito S. T.

1. 966229.

L. S. Alc. Æquat.

- 982551.

additâ denud unitate

1. 983678.

L. S. C. Declin. ☉

- 998730.

984948.

qui iterum est ipsissimus Log. Sinûs Dist. ☉
ab H. 6. nim. 45. gr. seu H. 9.

In Planisphærio

Sicut in Problemate 100.

PROBLEMA CIII.

*Distantiam ☉ à Meridie, seu Ho-
ram Diei, ex Compl. Declin. Complemen-
to Alt. ☉ data, & Azimutho à Meridie
indagare.*

Compl. Declin. est 76. 12. 44. Compl.

Alt. ☉ 50. 27. 36. Azimuth à Meridie

62. 56. 10. Igitur

L.

L. S. Azim. a Merid. { 994963. &
L. S. C. Alt. ☉ { 988715.

L. S. C. Declin. ☉ 1. 983678.
— 998730.

984948.
qui denuò est L. S. Dist. ☉ à Mer. nim.
45. gr. seu H. 9.

In Planisphærio

Filum admove gradui Azimuth à Meri-
die 62. 56. min. in Limbo, Axin verò ver-
sa, donec filum ibidem abscindat grad.
Compl. Declin. 76. 13. min. à Centro; fi-
lum dein retrahere ad grad. Compl. Alt. ☉
50. 28. min. in linea Axis à Centro, filum-
que in Limbo monstrabit Dist. à Merid. vi-
del. 45. gr. seu H. 9.

PROBLEMA CIV.

Horam Diei ex Altitudine Æqua-
toris, & Altitudine ☉ in Æquinoctio
elicere.

Alt. Æquatoris est 42. gr. Alt. verò ☉ in
Æquinoctio 28. 14. 19. Jam
Z 4 S.

S. T. & L. S. Alt. \odot in Aequin. 1. 967499.
L. S. Alt. Aequatoris — 982551.

984948.
qui est L. S. Dist. \odot à Mer. 45. gr. seu H. 9.

In Planisphaerio

Aequatore ad suam Altitudinem 42. gr. constituto, filum ad grad. Alt. \odot in Aequinoctio 28. 14. min. applicatum indicabit in Aequatore in nostro exemplo H. 9. quaesitam.

PROBLEMA CV.

Horam Diei, datâ Altitudine & Declin. \odot ac Elevatione Poli, numerare.

Alt. \odot est 39. 31. 24. Declinatio verò

eiusdem 13. 47. 16. Elev. Poli 48. gr. Itaque

L. S. A. P. 987107. 86
L. S. Declin. \odot 937717.

S. T. 924814.
residuum erit L. S. Inv. I. Sinus verò Simplex eiusdem 17710. cujus gradus 10. 12. 5. sunt Alt. \odot H. 6.

Pre-

Præterea L. S. C. A. P. { 982551. &
L. S. C. Declin. ☉ { 998730.

S. T. x. 981281.

& remanebit L. S. Inv. II. cujus Sinus Sim-
plex 64984. est Sinus Dimidij utriusque Al-
titudinis Meridianæ, Borealis & Australis.

Jam

A Sinu Simplici Alt. ☉ 63661.

Subtrahatur Sinus Inv. I. 17710.

in Æstate, in Hyeme verò 45951.

addatur,

residuum erit Sinus Inv. III. Denique

L. S. Inv. III. & S. T. addantur 1. 966229.

L. S. Inv. II. — 981281.

984948.

qui iterum est L. S. Dist. ☉ ab H. 6. nim.

45. gr. seu H. 9.

In Planisphærio

Ad Elev. Poli disposito, & filo ad Alt. ☉

39. gr. 32. minut. applicato in Limbo, ubi

Parallelus ☉ (in nostra casu 23. gr. 17.

min. ☉) filum tanget, ibi apparebit H. 9.

quæsit.

PROBLEMA CVI.

*Horam Diei, datis Complementis
Elev. Poli, Alt. & Declin. ☉
reperire.*

Gradus horum trium, videlicet

| | 0 | I | II |
|---------------|-----|-----|-----|
| C. Elev. Poli | 42. | 0 | 0 |
| C. Alt. ☉ & | 50. | 27. | 36. |
| C. Declin. | 76. | 12. | 44. |

168. 40. 20 (84. 20. 10.

Hæc Summa div. per 2.

| | 0 | I | II |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| Ex Semisse invento | 84. | 20. | 10. |
| Subtrahatur Compl. Alt. | 50. | 27. | 36. |

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| Jam L. S. Semissis | 33. | 52. | 34. |
| L. S. Differentiæ ultimò inventæ | 99 | 97 | 87. |
| & C. Arith. Alt. Æquat. | 97 | 46 | 16. |
| | 101 | 74 | 49. |

| | | | |
|----------------------|------|----|-----|
| L. S. Compl. Declin. | 199 | 18 | 52. |
| | — 99 | 87 | 30. |

Summa addit. S. T. divisa per 2. 1. 99 3 1 2 2.
dabit 996 56 1.

qui

qui est L. S. cujus Complementi gradus
22½. duplicati dant Dist. ☉ à Mer. 45. gr.
id est, H. 9.

In Planisphærio

Sicut suprà in Probl. 100.

PROBLEMA CVII.

Eandem Horam Diei, seu Dist.

☉ à Mer. ex Compl. Declin. ejusdem,
Azimutho, Compl. & Elevatione Poli
invenire.

Compl. Declin. ☉ est 76. 12. 44. Azi-
muth verò à Mer. 62. 56. 10. Compl. Elev.
Poli 42. gr. Igitur
L. T. Azim. à Mer. { 1029163.82
L. S. A. P. { 987107.

S. T. abijciatur

qui est L. T. Inv. L. nempe 55. 29. 24.
Jam

L.

L. S. Inv. I. { 991593. &
L. T. C. A. P. { 995443.

1987036.

L. T. Com. Declin. — 1061013.

926023.

0 / //

qui erit L. S. Inv. II. nim. 10. 29. 24.

Hi gradus subtracti à gradibus Inv. I.

0 / //

55. 29. 24. dant 45. gr. pro Dist. à Merid.
seu H. 9. Infra H. 6. vel in Hyeme addendi
sunt.

In Planisphaerio

Axin pone à dextris ad Elevationem Poli
48. gr. filum verò ad Declin. ☉ 13. gr. 47.
min. in Limbo, & granum fige in gradu A-
zimuthali 63. in Circulis Horarijs à ☉. si-
nistorsum numerando; tum Axi in Vertice 90.
constituto, granum signabit Circulum Ho-
rarium 45. gr. seu H. 9.

PROBLEMA CVIII.

*Azimuth à Meridie ex Complemen-
to Alt. & Declinationis ☉ ac Eleva-
tionis Poli colligere.*

Adde gradus simplices horum trium,
vi-

videlicet, Complementi Alt. \odot

| | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|
| | 50. | 17. | 36. |
| Elev. Poli | 42. | — | — |
| Declin. \odot | 76. | 12. | 44. |

| | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|
| | 168. | 40. | 20. |
| Hæc Sum. div. per 2 dat. | 84. | 20. | 10. |
| hinc verò subtrah. C. D. | 76. | 12. | 44. |

| | | | |
|-----------------------------|----|----|------------|
| | 8. | 7. | 16. Jam |
| L. S. Semissis | | | 1999787. |
| L. S. ultimi producti | | | 1915018. & |
| Compl. Arith. Elev. Aequat. | | | 1017449. |

| | |
|-----------------------|----------|
| | 1932254. |
| L. S. C. Alt. \odot | —988715. |

| | |
|---------------|-----------|
| S. T. addatur | 1.943539. |
|---------------|-----------|

& Summa hæc divisa per 2.
dabit L. S. Semissis Azimuth quæsitum, nim.
31. gr. 28. min. quæ duplicata dant inte-
grum Azimuth 62. gr. 56. min.

In Planisphærio

Ad Elev. Poli disposito, filum pone ad gra-
dum Alt. \odot 39. 32. min. in Limbo, gra-
num verò fige in puncto, ubi Parallelus \odot
23. Ω filum intersecat, & Axe ad Verticem
90. converso, granum in Circulo Horario
in.

indicabit Azimuth à Meridie vel Septentrione, cui nim. fuerit propinquius.

PROBLEMA CIX.

Azimuth ab Oriente ex Alt. ☉

Verticali, ejusque Altitudine datâ,

ac Elevatione Poli evincere.

Alt. ☉ in Circulo Verticali est 18. 42. 19.

ejusdem Alt. data 39. 32. 24 Elev. Poli 48. gr. Itaque

Quærat^r Differentia (subtrahendo minorem à majore) inter Sinum Alt. ☉ datæ

| | |
|--------------------|--------|
| | 63661. |
| & Sinum Alt. Verr. | 32069. |

| | |
|-----------------------|--------------|
| | 31592. |
| Iam L. S. hujus Diff. | { 949958. |
| L. T. Elev. Poli | { 1. 004556. |

| | |
|--------------------|------------|
| | 1. 954514. |
| L. S. C. Alt. datæ | — 988715. |

eritque hoc residuum L. S. Azimuth ab Ori-

ente versùs Merid. nim. 27. 3. 50. siquidem Alt. ☉ data (quod bene notandum est) sit

major Altitudine Verticali, & in Hyeme universim; si autem fuerit minor, Azimuth erit versus Septentrionem.

In Planisphærio

Ad Elev. Poli disposito, filum pone ad Alt. ☉ 39. gr. 32. min. & granum fige in puncto, ubi Parallelum ☉ 23. Ω secuerit; tum Aximmove ad granum, eumque unacum filo tandiu hinc inde verte, donec granum coincidat cum Complemento Altit. ☉ 50. gr. 27. min. in linea Axis, & Axis in Limbo dabit Azimuth à Meridie, vel Septentrione.

PROBLEMA CX.

Azimuth à Meridie ex Compl. Declinationis & Altitudinis ☉ ac Distantia ejusdem à Meridie desumere.

Compl. Declin. est 76. 12. 44. Distantia ☉ à Meridie 45. gr. Compl. Alt. ☉ 50. 27. 36. Itaque

L.

368 *Uſus & utilitas Planisphæriſ*

L. S. C. Declin. $\left\{ \begin{array}{l} 998730. \& \\ 984948. \end{array} \right.$
 L. S. Diſt. ☉ à Mer.

L. S. C. Alt. ☉ $\left\{ \begin{array}{l} 1.983678. \\ -988719. \end{array} \right.$

994963.

eritque hoc reſiduum L. S. Azimuth à Mer.

◦ / //
 nim. 62. 56. 10.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Declin. 76. gr. 12. min. ſilum verò ad Diſt. ☉ à Merid. 45. gr. in linea Axis; tum Axin revolve ad Compl. Alt. ☉ 50. gr. 27. min. ſilumque in Axi indicabit Azimuth à Mer. 62. gr. 56. min.

PROBLEMA CXI.

*Azimuth à Mer. vel Septentrione
 ex Compl. Declin. Elevatione Poli,
 ac Diſtantia ☉ à Meridie eruere.*

◦ / //
 Compl. Declin. eſt 76. 12. 44. Elev. Poli
 48. gr. Diſt. ☉ à Meridie 45. gr. Jam

$$\begin{array}{rcl} \text{L. S. Dist. } \odot \text{ à Mer.} & \{ & 984948. \& \\ \text{L. T. C. Declin.} & \{ & 1061013. \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{S. T.} & - & 2.045961. \\ & & 1.045961. \end{array}$$

eritque hoc resid. L. T. Inv. I. scil. 70. 51. 39.
inde verò subtrah. grad. C. A. P. 42. —. —.

in Hyeme verò addantur, 28. 51. 39.
& productum erit Inv. II.

$$\begin{array}{rcl} \text{Dein L. S. Inv. I.} & \{ & 997530. \& \\ \text{L. T. Dist. } \odot \text{ à Mer.} & \{ & 1.000000. \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{L. S. Inv. II.} & - & 1.997530. \\ & & 968366. \end{array}$$

resid. erit L. T. Azimuth à Mer. 62. gr.
56. min.

In Planisphaerio

Axin dispone ad Verticem 90. filum verò
ad Declin. 13. gr. 47. min. & granum fige
in Circulo hor. Dist. \odot à Merid. 45. gr. tum
Axin revolve dextrorsum ad Elev. Poli
48. gr. granumque in Circulo hor. notabit
Azimuth à Merid. vel Septentrione 62. gr.
56. min.

PROBLEMA CXII.

Idem Azimuth à Merid. vel Septent. ex Compl. Alt. ☉ ejusdem Dist. à Merid. ac Elev. Poli concludere.

0 1 11

Compl. Alt. ☉ est 50. 27. 36. Dist. à Merid. 45. gr. Elev. Poli 48. gr. Jam
 L. S. A. Poli { 987107. &
 L. T. Dist. ☉ à Mer. { 1.000000.

S. T. x. 987107.

0 1 11

Resid. erit L. T. Inv. I. nim. 36. 37. 5.
 Tum L. T. C. A. P. { 995443. &
 L. S. Inv. I. { 977559.

1.973002.
 — 1.008327.
 964675.

L. T. C. Alt ☉

0 1 11

dabitque resid. L. S. Inv. II. nempe 26. 19. 5.
 Hi in Hyeme, & infra H. 6. subtrah. in æstate
 verò add. gradibus Inv. I. nim. 36. 37. 5.
 & habetur Azimuth à Merid. 62. 56. 10.

In Planisphaerio

Ad Elevationem Poli disposito, filum appli-

plica Alt. ☉ 39. gr. 32. min. granum verò
fige in Circulo horario Dist. ☉ à Mer. 45. gr.
tum Axin erige ad punctum Verticale 90. &
granum in Circulo hor. notabit Azimuth à
Mer. vel Septentrione 62. gr. 56. min.

PROBLEMA CXIII.

*Complementum Dist. ☉ à Nonage-
simo, ex Altitudine ejusdem, & Alti-
tudine Nonagesimi deducere.*

De hoc vide, quæ diximus suprà fol. 264.

& seqq. Interim Alt. ☉ est 39. 32. 24. Alti-
tudo Nonagesimi verò 65. 12. 40. Jam

L. S. Alt. ☉ & S. T. 1. 980388.

L. S. Alt. Nonag. — 995801.

984587.

qui erit L. S. C. Dist. ☉ à Nonagesimo ,

scil. 44. 31. 40. sicque ipsa Dist. ☉ à No-
nagesimo erit 45. 28. 20.

In Planisphærio

Axin verte ad Alt. Nonag. 65. gr. 12. min. fi-
lum

lum promove ad Alt. ☉ in Limbo 39. gr. 32. min. hocque in linea Axis indicabit Compl. Dist. ☉ à Nonagesimo, nim. 45. gr. 28. min.

PROBLEMA CXIV.

*Altitudinem Nonagesimi ex Alti-
tudo ☉ & Dist. ☉ à Nonagesimo
colligere.*

Alt. ☉ est 39. 32. 24. Complementum

Dist. ☉ à Nonagesimo verò 44. 31. 40.
Jam

S. T. & L. S. Alt. ☉ 1.980388.

L. S. C. Dist. — 984587.

995801.

qui est L. S. Alt. Nonagesimi, nim. 65. 12. 40.

In Planisphærio

Axin applica Complemento Dist. ☉ à Nonagesimo 44. gr. 32. min. filum verò Altitu-
dini ☉ 39. gr. 32. min. in Limbo, & hoc in

linea Axis dabit Alt. Nonag. 65. 12. 40.

PRO-

PROBLEMA CXV.

Altitudinem ☉ ex Alt. Nonagesimi, & Dist. ☉ à Nonagesimo calculare.

| | |
|---|--------------|
| | ° / // |
| Alt. Nonagesimi est 65. 12. 40. Comple- | |
| mentum Dist. ☉ ab eodem | ° / // |
| | 44. 31. 40° |
| Igitur | |
| L. S. Alt. Nonagesimi | { 995801. &c |
| L. S. C. Dist. ☉ à Nonag. | { 984587. |
| | ----- |
| S. T. | x. 980388. |
| | ° / // |
| resid. erit L. S. Alt. ☉ nim. | 39 32. 24. |

In Planisphærio

Axin pone ad Alt. Nonagesimi 65. gr. 12. min. filum ad Compl. Dist. ☉ à Nonag. 44. gr. 31. min. in Axi à Centro, filumque in Limbo notabit Alt. ☉ 39. gr. 32. min.

PROBLEMA CÆVI.

Complementum Altitudinis Nonagesimi, ex Compl. Alt. Medij Cœli, & Angulo Gradûs Eclipticæ Culminantis desumere.

Angulus Gradûs Culminantis Eclipticæ

$\begin{array}{r} 0 \\ 85.47.0. \end{array} \begin{array}{r} / \\ 11 \end{array}$ Compl. Alt. Medij Cœli
 $\begin{array}{r} 0 \\ 24.51.40. \end{array} \begin{array}{r} / \\ 11 \end{array}$ adeoque Alt. Medij Cœli

65. 8. 19. Nunc igitur
 L. S. C. Alt. Medij Cœli $\left\{ \begin{array}{l} 962368. \& \\ 999882. \end{array} \right.$
 L. S. Anguli Culm. Eclipt.

S. T. $\times 962250.$
 residuum erit L. S. C. Alt. Nonagesimi
 $\begin{array}{r} 0 \\ 24.47.20. \end{array} \begin{array}{r} / \\ 11 \end{array}$

In Planisphærio

Axin colloca ad Angulum Gradûs Eclipt. Culmin. 85. gr. 47. min. filum ad Compl. Alt. Medij Cœli 24. gr 51. min. in Axi, & filum in Limbo indicabit Compl. Alt. Nonagesimi, nim. dictos 24. gr. 47. min.

PRO.

PROBLEMA CXVII,
Complementum Alt. Med. Cœli ,
ex Angulo Culm. Eclipticæ, & Com-
plem. Alt. Nonag. dignoscere.

Angulus Eclipt. est 85. 47. 0. Comple-
 mentum Alt. Nonagesimi 24. 47. 20. Ita-
 que
 S. T. & L. S. C. Alt. Nonag. 1. 962250.
 L. S. Ang. Culm. Eclipt. —999882.

962368.
 qui erit L. S. C. Alt. Med. Cœli, nim.
 24. 51. 40.

In Planisphærio

Axin pone ad Angulum Gradus Culm.
 Eclipt. 85. gr. 47. min. filum ad Compl.
 Alt. Nonag. 24. gr. 47. min. in Limbo, &
 filum in linea Axis dabit Complementum
 Alt. Med. Cœli, nim. dictos 24. gr. 51.
 min.

PROBLEMA CXVIII

*Angulum Gradûs Culm. Eclipticæ,
ex Compl. Alt. Med. Cœli, & Compl.
Alt. Nonageſimi edicere.*

Compl. Alt. Med. Cœli est 24. 51. 40. &

Compl. Alt. Nonageſimi 24. 47. 20. Jam
L. S. C. Alt. Nonag. & S. T. 1.962250.
L. S. C. Alt. Med. Cœli — 962368.

999882.
reſiduum erit L. S. Anguli Gradûs Edipt.
Culmin. nim. 85. 47. 0.

In Planisphærio

Axin converte ad Complem. Alt. Med.
Cœli 24. 51. 40. filum promove ad Compl.
Alt. Nonageſimi 24. 47. 20. & hoc in linea
Axis dabit Angulum Gradûs Eclipticæ Cul-
min. quæſitum, videl. 85. gr. 47. min.

PRO-

PROBLEMA CXIX.

Eundem Angulum Gradûs Eclipticæ Culminantis cum Meridiano ex Complemento Declinationis ejusdem, & Complem. Declin. Maximæ determinare.

Complem. Declinationis Gradûs Culmi-

nantis est 66. 51. 41. Complem. Declin. Maximæ 66. gr. 30. min. Itaque

L. S. C. Declin. Maximæ, & S. T. 996239.

L. S. C. Declin. datæ — 996357.

999882.


qui est L. S. Anguli Gradûs Culmin. Eclipticæ cum Meridiano, nim. 85. gr. 47. min.

In Planisphærio

Æquatore in Vertice constituto, sicut appositæ figura monstrat, ubi aliàs est Tropicus ☊. finge V. in Tropico ☋. verò finge ☊. in ipso autem Æquatore pone utrumque Tropicum ☊. & ☋. & sic de reliquis Signis loquendo, & juxta hoc Sîstema Paral-

A a 5

le.



Ielus datus signabit in Limbo Angulum
Eclipticæ quæsitum 85. gr. 47. min.

PROBLEMA CXX.

*Distantiam Gradûs Culminantis
ab Æquin. proximo, ex Ascens. Recta Med.
Celi, à prox. Æquinoctio, & Compl. Declin.
Maximæ indagare.*

**Ascensio Recta Mediij Cœlij à prox. Æqui-
no-**

o / //

noctio est 79. 22. 9. Complem. Declin.
 Maximæ 66. gr. 30. min. Nunc ergò
 L. T. Ascensionis Rectæ & S. T. addantur;
 duplicando unitatem ad sinistram 2.072653.
 L. S. C. Declin. Maximæ - 996239.

1.076414.

eritque hoc residuum L. T. Dist. Gradûs
 Culmin. à prox. Æquin. nim. 80. gr. 14.
 min.

In Planisphærio

In Æquatore à gradu Ascensionis Rectæ à
 principio V numeratæ nim. 100. 38. min.
 perge secundum lineam Arcui horario paral-
 lelam usque ad Eclipticam, & incidēs in pun-
 ctum Gradûs Culmin. à quo usque ad ☊,
 seu prox. Æquinoctium, numerabis dictos
 80. gr. 14. min. Dist. scil. quæsitæ.

PROBLEMA CXXI.

*Ascensionem Rectam Gradûs Cul-
 min. ex Dist. ejusdem à prox. Æqui-
 noctio, & Compl. Declin. Maximæ
 invenire.*

Dist. Gradûs Culmin. à prox. Æquinoctio
 est

est 80. gr. 14. min. & Compl. Declin. Maximæ 66. gr. 30. min. Nunc ergo

L. T. Dist. Grad. Cul. ab Æq. $\left\{ \begin{array}{l} 1.076414. \& \\ 996239. \end{array} \right.$

S. T. — 2.072653.

& residuum 1.072653.

erit L. T. Ascens. Rectæ à prox. Æquin.
o / //

79. 22. 9 quia verò Gradus Culminans ponitur esse in 2. Quadrante Eclipticæ, utpote in ☾. idèò gradus inventi juxta dicta fol. 274. & seq. subtrahendi sunt à semicirculo, seu

o / // 180. & proveniunt 100. 37. 51.

In Planisphærio

A Gradu Culmin. descende in linea Arcui hor. parallela ad Æquatorem, & incidēs in dictos 100. gr. 38. min. vel antrosum numerando usque ad ☿. invenies Ascens. Rect. à prox. Æq. 79. gr. 22. min.

PROBLEMA CXXII.

Complementum Anguli Gradus Eclipticæ Culmin. cum Meridiano, &c Compl. Dist. ejusdem Gradus ab Æq. prox. & Declin. Maxima mensurare.

Compl. Dist. Gradus Culm. ab Æquin. pro-

proximo est 9. gr. 46. min. Declin. Maxi-
ma 23. gr. 30. min. Itaque
L. S. C. Dist. Grad. Culm. ab Æq. 922951. &
L. T. Declin. Max. 963830.

S. T. 886781.
resid. erit L. T. C. Anguli Gr. Culm. Eclipt.
o / //
nim. 4. 13. 6.

In Planisphærio

Filum applica Complemento Dist. à prox.
Æquin. 9 gr. 46. min. in Limbo, Axin ve-
rò versa, donec filum fecer Compl. Declin.
Max. 66. gr. 30. min. in Axi: cum filum
constitue ad punctum Æquatoris in Limbo,
& Axin versa, donec filum in Axi radar
Dist. à prox. Æquin. 80. gr. 14. min. & Axis
in Limbo dabit Angulum quæsitum 85. 47.

PROBLEMA CXXIII.

*Complementum Distantia Gradus
Culmin. ab Æquin. proximo, ex Compl.
Anguli ejusdem Gradus cum Meridiano &
Declinatione Maxima metiri.*

Compl. Anguli Gradus Culmin. Eclipticæ
cum

⁰ / ^{//}
 cum Merid. eſt 4. 13. 6. adeoque ipſe Angu-
⁰ / ^{//}
 lus 85. 47. 0. Declin. Maxima 23. gr. 30.
 min. Jam.
 L. T. Com. Ang. præfati, & S. T. 1. 886781.
 L. T. Declin. Maximæ — 963830

922951.
 qui erit L. S. Compl. Diſt. Gradûs Culmin.
 ab Æquin. proximo, nim. 9. gr. 46. min.

In Planisphærio

⁰ 7
 Axin pone ad Compl. Decl. Max. 66. 30.
 filum ad Angulum præfatum 85. gr. 47. n. in.
 in Axi. Æquatorem applica ad locum fili in
 Limbo, filum colloca ad Declin. Max. 23.
 30. in Limbo etiam, filum in Axi dat Diſt.
 à prox. Æquin.

PROBLEMA CXXIV.

*Ex Compl. Anguli Gradûs Eclipt.
 Culm. cum Merid. & Compl. Diſt. ejus-
 dem Gradûs ab Æquin. proximo, Declinationem
 Maximam dignoſcere.*

⁰ / ^{//}
 Compl. Anguli prædicti eſt 4. 13. 6.
 Com.

Compl. Dist. Gradûs Culm. ab Æquin. 9. gr.
46. min. Igitur

L. T. C. Ang. Grad. Culm. & S. T. 1. 886781.

L. S. C. Dist. Grad. Culm. ab Æq. — 922951.

963830.

residuum erit L. T. Declin. Max. 23. gr. 30.
min.

In Planisphærio

Axin pone ad Dist. Grad. Culm. ab Æ.
quin. filum ad Angulum Eclipticæ datum
in Axi, Æquatorem applica ad locum fili in
Limbo, filum dispone ad Compl. Dist. à prox.
Æquin. 9. gr. 46. min. in Limbo, filum hoc in

Axi indicabit Compl. Declin. Max. 66. 30.

PROBLEMA CXXV.

Angulum Eclipticæ ☉ cum Circulo

Verticali ex Compl. Alt. Nonagesimi,

& Dist. ☉ à Nonagesimo investigare.

0 1 11

Compl. Alt. Nonagesimi est 24. 47. 20.
Dist. ☉ à Nonagesimo 45. gr. 28. min.
Itaque

S.

S. T. & L. T. C. Alt. Nonag. 1. 966448.
L. S. Dist. ☉ à Nonagesimo — 985299.

9811456

qui est L. T. Anguli, scil. 32. 56. 19.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Dist. à 90. 45. 28.
filum ad Alt. 90. 65. gr. 12. min. in Axi,
Æquatorem colloca ad punctum fili, filum-
que ad Compl. Alt. 90. 24. gr. 47. min. in
Limbo, filum in Axi monstrabit Angulum
quæsitum.

PROBLEMA CXXVI.

*Datis Alt. ☉ & Dist. ejusdem a
90. invenire Compl. Anguli Eclipt.
cum Verticali.*

Alt. ☉ ponitur 39. 32. 24. Dist. ☉ à 90.

45. 28.

L. T. Alt. ☉

L. T. Dist. ☉ à 90.

{ 991679.
1000707.

S. T.

x. 992386.

re-

residuum erit L. S. C. Anguli quæsitum, nim,
57. gr. 4. min.

In Planisphærio

Filum pone ad Alt. ☉ 39. gr. 32. min,
Axin versa, donec filum radat Compl. Dist. ☉
à Non. g. 44. gr. 32. min. filum move ad
punctum Æquatoris in Limbo, Axin verò
versa, donec filum abscindat Compl. Alt. ☉
50. gr. 27. min. in eodem Axi, & Axis in
Limbo notabit Angulum quæsitum.

PROBLEMA CXXVII.

Distantiam Nonagesimi à Medio

*Cælo ex Complem. Anguli Eclipt. Gra-
dus Culm. & Compl. Alt. Medij Cæli
ejusdem Gradus eruere.*

Compl. Anguli Eclipt. est 4. gr. 13. min.

Compl. Alt. Medij Cæli 24. 51. 40. Jam
L. S. C. Ang. Eclipt. { 886645. &
L. T. C. Alt. Medij Cæli { 966592.

S. T. 1. 853237.
residuum erit L. T. Dist. Non. g. à Medio
Cælo, videl. 1. gr. 57. min.

B b

In

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Alt. Medij Cœli

24. 51. filum ad Ang. Eclipt. 85. gr. 47. min.
in Axi, Equatorem diſpone ad punctum ſili
in Limbo, filum econtrâ ad Alt. Med. Cœli
65. gr. 8. min. in Limbo, quod filum in
Axi dabit Compl. Diſt. Medij Cœli à Nonageſimo, nim. 88. gr. 3. min.

PROBLEMA CXXVIII.

*Ipfum Gradum Nonageſimum ex
precedente Problemate facillimè
deſumere.*

Gradus Diſt. Medij Cœli à Nonag. 1. gr.
57. min. in Signis Deſcendentibus nim. à
90. ad 70. ſubtracti Gradibus Medij Cœli,
dant Gradum Nonag. verſus Occalum, in Si-
gnis Aſcendentibus verò, id eſt à 70. ad 90.
additi diſtis Gradibus Medij Cœli, dant Gra-
dum Nonag. verſus Ortum

In Planisphærio

A Gradibus Medij Cœli in Ecliptica nu-

mera dictam Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr. 57. min. in Signis Ascendentibus antrorsum, in Descendentibus verò, ut sit in nostro exemplo, retrorsum, & habebis Gradum Nonag. 7. gr. 49. min. ☿.

PROBLEMA CXXIX.

Distantiam Medij Cœli ab Horizonte proximiori, sicque Gradum Orientem ex prædicto Problemate eadem facilitate reperire.

Dist. Med. Cœli à Nonag. subtrahe ex 90. gr. residuum erit Dist. Med. Cœli ab Horizonte Ortivo, si Nonagesimus est versùs Occasum, aut si Med. Cœli invenitur in Signis Descendentibus (secùs verò ab Occiduo) uti contingit in nostro exemplo, quia Med. Cœli ponitur in Signis Descendentibus, hinc si subtrahatur 1. gr. 57. min. ex 90. restabunt 88. gr. 3. min. pro Distantia Med. Cœli ab Horizonte Ortivo. Hæc porrò Distantia 88. gr. 3. min. addita Gradibus Medij Cœli in Signis Descendentibus, scil. 9. gr. 46. min. ☿. dabunt 7. gr. 49. min. ☿. in Horizonte Ortivo tunc constitutos. In Signis Ascend. verò fiat subtractio à Gradibus Medij Cœli, & habebitur Gradus constitutus in Occasu.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Alt. Medij Cœli

24. 51. filum ad Ang. Eclipt. 85. gr. 47. min.
in Axi, Æquatorem dispone ad punctum fili
in Limbo, filum econtrâ ad Alt. Med. Cœli
65. gr. 8. min. in Limbo, quod filum in
Axi dabit Compl. Dist. Medij Cœli à Nonag.
esimo, nim. 88. gr. 3. min.

PROBLEMA CXXVIII.

*Ipsum Gradum Nonagesimum ex
precedente Problemate facillimè
deducere.*

Gradus Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr.
57. min. in Signis Descendentibus nim. à
☉. ad ☿. subtracti Gradibus Medij Cœli,
dant Gradum Nonag. versùs Occasum, in Si-
gnis Ascendentibus verò, id est à ☿. ad ☉.
additi dictis Gradibus Medij Cœli, dant Gra-
dum Nonag. versùs Ortum.

In Planisphærio

A Gradibus Medij Cœli in Ecliptica nu-
me-

mera dictam Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr. 57. min. in Signis Ascendentibus antroorsum, in Descendentibus verò, ut fit in nostro exemplo; retroorsum, & habebis Gradum Nonag. 7. gr. 49. min. ☿.

PROBLEMA CXXIX.

*Distantiam Medij Cœli ab Horizonte
et proximiori, sicque Gradum Orientem
ex prædicto Problemate eadem facilitate
reperire.*

Dist. Med. Cœli à Nonag. subtrahe ex 90. gr. residuum erit Dist. Med. Cœli ab Horizonte Ortivo, si Nonagesimus est versùs Occasum, aut si Med. Cœli invenitur in Signis Descendentibus (secùs verò ab Occiduo) uti contingit in nostro exemplo, quia Med. Cœli ponitur in Signis Descendentibus, hinc si subtrahatur 1. gr. 57. min. ex 90. restabunt 88. gr. 3. min. pro Distantia Med. Cœli ab Horizonte Ortivo. Hæc porrò Distantia 88. gr. 3. min. addita Gradibus Medij Cœli in Signis Descendentibus, scil. 9. gr. 46. min. ☿. dabunt 7. gr. 49. min. ☿. in Horizonte Ortivo tunc constitutos. In Signis Ascend. verò fiat subtractio à Gradibus Medij Cœli, & habebitur Gradus constitutus in Occasu.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Alt. Medij Cœli

24. 51. filum ad Ang. Eclipt. 85. gr. 47. min.
in Axi, Æquatorem dispone ad punctum fili
in Limbo, filum econtrâ ad Alt. Med. Cœli
65. gr. 8. min. in Limbo, quod filum in
Axi dabit Compl. Dist. Medij Cœli à Nonag-
esimo, nim. 88. gr. 3. min.

PROBLEMA CXXVIII.

*Ipsum Gradum Nonagesimum ex
precedente Problemate facillimè
deducere.*

Gradus Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr.
57. min. in Signis Descendentibus nim. à
☿. ad ♄. subtracti Gradibus Medij Cœli,
dant Gradum Nonag. versùs Occasum, in Si-
gnis Ascendentibus verò, id est à ♄. ad ☿.
additi dictis Gradibus Medij Cœli, dant Gra-
dum Nonag. versùs Ortum.

In Planisphærio

A Gradibus Medij Cœli in Ecliptica nu-
me-

mera dictam Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr. 57. min. in Signis Ascendentibus antroꝛsum, in Descendentibus verò, ut fit in nostro exemplo, retrorsum, & habebis Gradum Nonag. 7. gr. 49. min. ☿.

PROBLEMA CXXIX.

Distantiam Medij Cœli ab Horizonte proximiori, sicque Gradum Orientem ex prædicto Problemate eadem facilitate reperire.

Dist. Med. Cœli à Nonag. subtrahere ex 90. gr. residuum erit Dist. Med. Cœli ab Horizonte Ortivo, si Nonagesimus est versùs Occasum, aut si Med. Cœli invenitur in Signis Descendentibus (secùs verò ab Occiduo) uti contingit in nostro exemplo, quia Med. Cœli ponitur in Signis Descendentibus, hinc si subtrahatur 1. gr. 57. min. ex 90. restabunt 88. gr. 3. min. pro Distantia Med. Cœli ab Horizonte Ortivo. Hæc porro Distantia 88. gr. 3. min. addita Gradibus Medij Cœli in Signis Descendentibus, scil. 9. gr. 46. min. ☿. dabunt 7. gr. 49. min. ☿. in Horizonte Ortivo tunc constitutos. In Signis Ascend. verò fiat subtractio à Gradibus Medij Cœli, & habebitur Gradus constitutus in Occasu.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Alt. Medij Cœli

24. 51. filum ad Ang. Eclipt. 85. gr. 47. min.
in Axi, Æquatorem dispone ad punctum fili
in Limbo, filum econtrâ ad Alt. Med. Cœli
65. gr. 8. min. in Limbo, quod filum in
Axi dabit Compl. Dist. Medij Cœli à Nonag-
esimo, nim. 88. gr. 3. min.

PROBLEMA CXXVIII.

*Ipsum Gradum Nonagesimum ex
precedente Problemate facillimè
deducere.*

Gradus Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr.
57. min. in Signis Descendentibus nim. à
☊. ad ☊. subtracti Gradibus Medij Cœli,
dant Gradum Nonag. versùs Occasum, in Si-
gnis Ascendentibus verò, id est à ☊. ad ☊.
additi dictis Gradibus Medij Cœli, dant Gra-
dum Nonag. versùs Ortum.

In Planisphærio

A Gradibus Medij Cœli in Ecliptica nu-
me-

mera dictam Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr. 57. min. in Signis Ascendentibus antrorsum, in Descendentibus verò, ut sit in nostro exemplo; retrorsum, & habebis Gradum Nonag. 7. gr. 49. min. ☞

PROBLEMA CXXIX.

*Distantiam Medij Cœli ab Horizonte
te proximiori, sicque Gradum Orientem
ex prædicto Problemate eadem facilitate
reperire.*

Dist. Med. Cœli à Nonag. subtrahe ex 90. gr. residuum erit Dist. Med. Cœli ab Horizonte Ortivo, si Nonagesimus est versùs Occasum, aut si Med. Cœli invenitur in Signis Descendentibus (secùs verò ab Occiduo) uti contingit in nostro exemplo, quia Med. Cœli ponitur in Signis Descendentibus, hinc si subtrahatur 1. gr. 57. min. ex 90. restabunt 88. gr. 3. min. pro Distantia Med. Cœli ab Horizonte Ortivo. Hæc porro Distantia 88. gr. 3. min. addita Gradibus Medij Cœli in Signis Descendentibus, scil. 9. gr. 46. min. ☞ dabunt 7. gr. 49. min. ☞ in Horizonte Ortivo tunc constitutos. In Signis Ascend. verò fiat subtractio à Gradibus Medij Cœli, & habebitur Gradus constitutus in Occasu;

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Alt. Medij Cœli

24. 51. filum ad Ang. Eclipt. 85. gr. 47. min.
in Axi, Æquatorem dispone ad punctum fili
in Limbo, filum econtrâ ad Alt. Med. Cœli
65. gr. 8. min. in Limbo, quod filum in
Axi dabit Compl. Dist. Medij Cœli à Nonag-
esimo, nim. 88. gr. 3. min.

PROBLEMA CXXVIII.

*Ipsum Gradum Nonagesimum ex
precedente Problemate facillimè
deducere.*

Gradus Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr.
57. min. in Signis Descendentibus nim. à
☉. ad ☿. subtracti Gradibus Medij Cœli,
dant Gradum Nonag. versùs Occasum, in Si-
gnis Ascendentibus verò, id est à ☿. ad ☉.
additi dictis Gradibus Medij Cœli, dant Gra-
dum Nonag. versùs Ortum.

In Planisphærio

A Gradibus Medij Cœli in Ecliptica nu-
me-

mera dictam Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr. 57. min. in Signis Ascendentibus antrorsum, in Descendentibus verò, ut fit in nostro exemplo, retrorsum, & habebis Gradum Nonag. 7. gr. 49. min. ☿.

PROBLEMA CXXIX.

*Distantiam Medij Cœli ab Horizonte
tē proximiori, sicque Gradum Orientem
ex prædicto Problemate eadem facilitate
reperire.*

Dist. Med. Cœli à Nonag. subtrahere ex 90. gr. residuum erit Dist. Med. Cœli ab Horizonte Ortivo, si Nonagesimus est versus Occasum, aut si Med. Cœli invenitur in Signis Descendentibus (secus verò ab Occiduo) uti contingit in nostro exemplo, quia Med. Cœli ponitur in Signis Descendentibus, hinc si subtrahatur 1. gr. 57. min. ex 90. restabunt 88. gr. 3. min. pro Distantia Med. Cœli ab Horizonte Ortivo. Hæc porro Distantia 88. gr. 3. min. addita Gradibus Medij Cœli in Signis Descendentibus, scil. 9. gr. 46. min. ☿. dabunt 7. gr. 49. min. ☿. in Horizonte Ortivo tunc constitutos. In Signis Ascend. verò fiat subtractio à Gradibus Medij Cœli, & habebitur Gradus constitutus in Occidu.

In Planisphærio

A Gradu Med. Cœli in Ecliptica numerentur Gradus Dist. Med. Cœli ab Horizonte in Signis Descend. antiorsum, & occurret Gradus Ortivus scil. 7. gr. 49. min. $\frac{1}{2}$ in Signis Ascend. autem numeratio fiat retrorsum, & offendet Gradum Occiduum.

PROBLEMA CXXX.

Altitudinem Med. Cœli ex Compl.

Ang. Eclipt. Gradus Culm cum Meridiano, & ex Compl. Dist. Nonag. à Med. Cœlo elicere.

Compl. Ang. Eclipt. est 4. gr. 13. min.
 Compl. Dist. à Nonag. 88. gr. 3. min. Jam
 L. S. C. Ang. Eclipt. { 886645. &
 L. T. C. Dist. Nonag. à M. C. { 1. 146792.

S. T. — 2. 033437.
 residuum erit L. T. Alt. Med. Cœli scil.
 65. gr. 8. min.

In Planisphærio

Axin pone ad Angulum Eclipticæ 85. gr.

47.

47. min. filum ad Compl. Dist. Medij Cœli à Nonag. 88. gr. 3. min. in Axi, Æquatorem colloca ad punctum fili in Limbo, filum verò promove ad Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr. 57. min. filumque in Axi indicabit Compl. Alt. Medij Cœli 24. gr. 52. min.

PROBLEMA CXXXI.

*Com. Ang. Eclipt. ex Dist. Nonag.
à Medio Cœlo, & Alt. Med. Cœli in-
dagare.*

Dist. Nonag. à Med. Cœlo 1. gr. 57. min.
Alt. Medij Cœli 65. gr. 8. min. Itaque
L. T. Dist. Non. à Med. Cœlo { 853207. &
L. T. Alt. Med. Cœli { 1.033437.

S. T. x. 886644.
residuum erit L. S. C. Ang. Eclipt. quæsitum
4 gr. 13. min.

In Planisphærio

Filum dispone ad Dist. Medij Cœli à Nonag. 1. gr. 57. min. Axia versa, donec filum abscindat Compl. Alt. Med. Cœli 24. gr. 52. min. in linea Axis, filum pone ad punctum Æquatoris in Limbo, Axique com-

move, donec ſilum radat Compl. Diſt. Med. Cœli à Nonag. 88. gr. 3. min. & Axis in Limbo dabit Angulum quæſitum ſcil. 85. gr. 47. min.

Quæ haſtenùs propoſuimus, Solaria potiſſimùm fnère Problemata, nunc verò, ut Universalitas Uſus Planisphærij tantò magis pateſcat, quædam etiam Lunaria, quæ omnibus Planetis, imò & Cometis, applicari poſſunt, ſubjungemus. Circa quæ tamen

Notandum eſt I. Locum ſeu Signum D , item Declinationem, Latitudinem ejusdem &c. (quouſque ſimilia inveniendi modum in ſequentibus ex inſtituto tradamus) ex Calendarijs, ac præſertim ex Ephemeridibus D. Ioannis Gauppii Auguſtæ Vindelic. recens in lucem editis, & jam uſque ad A. 1720. continuatis, petenda eſſe.

II. Supputationem Similium in Calendarijs & Ephemeridibus ordinariè inſtrui pro Meridie Solari; unde quando v. g. Ortus D vel Occaſus contingit in Media nocte, Differentia graduum unius diei ab altero quærenda, & ſolum Dimidium ejusdem retinendum erit, & ſic de rato tertiæ, quartæ vel ſextæ partis diei &c. loquendo.

III. D Singulis diebus 12. circiter gradus, conſequenter ſingulis duabus horis unum gradum Eclipticæ conficere, adeoque etiam

in

in hoc raturum horarum à Meridie elapsarum attendendum, & gradus Declin. vel Longitudinis \mathcal{D} juxta illud supputandos esse.

IV. Quia exemplum, quod posuimus de \odot , cui pleraque Problemata accommodavimus, in \mathcal{D} catenùs difficultatem facit, quòd gradus ex Planisphærio inquirendi plerumque ejusdem extremitates contingant, ubi gradus difficilè discernuntur, idèd aliud hîc exemplum pono, nim. diem 6. Martij, quo hæc scribo, incidentem in Dominicam 1. Quadragesimæ.

V. Sicut in \odot Longitudinem ejusdem accepimus à proximo Æquinoctio, ita in \mathcal{D} eam ordinariè sumimus à proximo Tropico.

VI. Denique ut aliquo tempore saltem Ortus vel Occasus \mathcal{D} sciatur, modum ejusdem faciliorem ex Planisphærio præmittimus sequentem. Sit itaque

PROBLEMA CXXXII.

Horam \mathcal{D} seu Distantiam illius à Meridie in Ortus & Occasu ejusdem explorare.

In Planisphærio

Si quæras Horam Ortûs vel Occasûs ☽, pone ſilum ad Horizontem; hoc enim in Parallelo Declinationis ☽ v. g. in noſtro exemplo 9. gr. 18. min. ubi ſcil. ſilum interſecat, exhibebit pro Ortû ejusdem H. 5. cum 18 circiter min. horarijs, adeoque paulò plus, quàm Quadrantem poſt H. 5. pro Occaſu verò H. 6. cum 41. min. ſeu paulo minus, quàm tertium Quadrantem ad H. 7. His poſitis, quære in Calendario Æratem ☽ numerando dies à Novilunio, & ſiquidem hoc contingat ante Meridiem, computando etiam ipſum diem Novilunij, omittendo autem, ſi primum contingat poſt Meridiem. Habitâ ergò Ærate ☽ v. g. in noſtro exemplo diem 5. & invenies in Tabula ſequentè dictæ Ærati ☽ correfpondentes 4. gr. cum 2. min. qui additi H. 6. v. g. Occasûs ☽ cum 42. min. dabunt H. 10. cum aliquot minutis, quæ hîc, quouſque modum idem exactiùs inveniendi tradamus, ſcrupuloſiùs haud inquirenda, & juxta dicta ratum temporis à Meridie præterito uſque ad punctum Novilunij negligendum non eſt.

| Ætas ☽ | Horæ ☉ |
|-------------------------|----------|
| seu Dies ab Horis ☽ ad- | undendæ. |
| uno Novilu- | |
| nio ad alte- | |
| rum nume- | H. M. |
| randi. | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| | 15. | 0. | 0. |
| 1. | 16. | 0. | 49. |
| 2. | 17. | 1. | 37. |
| 3. | 18. | 2. | 25. |
| 4. | 19. | 3. | 13. |
| 5. | 20. | 4. | 2. |
| 6. | 21. | 4. | 52. |
| 7. | 22. | 5. | 37. |
| 8. | 23. | 6. | 29. |
| 9. | 24. | 7. | 13. |
| 10. | 25. | 8. | 5. |
| 11. | 26. | 8. | 56. |
| 12. | 27. | 9. | 45. |
| 13. | 28. | 10. | 33. |
| 14. | 29. | 11. | 10. |

Quòd si scia-
tur solùm Si-
gnum ☽ ,
tunc Paral-
lelo Signi
addendi sunt
gradus La-
titudinis ☽
sursùm , si
Latitudo est
Borealis, vel
deorsùm , si
est Australis,
& Parallelus
ibi transiens
notabit in
Horiz. Ho-
ram ☽ , quâ
habitâ habe-
tur etiam
Hora ☉ ex
præsenti Ta-
bula modo
prædicto.

PROBLEMA CXXXIII.

Quovis tempore, etiam extra Ortum & Occaſum, Horam ☽ ex Planisphærio deprehendere.

Filum applica in Limbo Altitudini ☽ Quadrante, vel alio quovis modo obſervato v. g. 35. gr. 30. min. & dictus Parallelus Declinationis ☽ 9. gr. 18. min. in puncto interſectionis cum filo monſtrabit H. 9. cui ſi addas 4. gr. 2. min. ſuprà ex Tabula inventos, dabunt 13. horas, ſeu H. 1. pomeridianam, & ſic de alijs loquendo.

PROBLEMA CXXXIV.

Datâ Declin. ☽ & Elevatione Poli, Horam Ortus poſt ☿. ſeu Plenilunium, vel Horam Occaſus poſt ☿. ſeu Novilunium determinare.

Solent Aſtronomi non utrumque, id eſt, tam Ortum, quàm Occaſum ☽ in ſuis Calendarijs ponere, ſed tantùm alterutrum, nimirum Ortum Veſpertinum poſt Plenilunium, & in proximo Quadrante Ortum Matutinum; poſt Novilunium verò Occaſum Veſpertinum.

num, & in sequenti Quadrante Occasum Matutinum. Utrumque ergo invenire docet præsens Problema, cujus resolutio ut ritè instruatur, observandum est I. ex Probl. 132. Horam occasûs \gg circiter H. 10. vespertina contingere, adeoque juxta superius dicta \gg à Meridie præterito jam 5. gradus Ecliptæ absolvisse, consequenter locum \gg 2. gr. 19. min. 8. in laudatis Calendarijs vel Ephemeridibus inventum 5. gradibus augendum esse, sicque provenire 7. gr. 19. min. 8. II. Declinationem ibidem expressam, attentâ Differentiâ diei 6. Martis nobis propositi cum septimo seq. fore 10. gr. 38. min. Latitudinem verò proportionaliter 3. gr. 34. min. III. Supponendum ex instituto adhuc dicendis, Ascensionem Rectam \gg juxta dictam supputationem fore ab \vee . 36. gr. 8. min. Ascensio denique Recta \odot hîc etiam scitu necessaria pro rata temporis erit 347. gr. 9. min. His suppositis

L. T. Elev. Poli

L. T. Declin. \gg

1004556. &

927357.

S. T.

931913.

residuum erit L. S. Dist. \gg ab H. 6. nîm.

0 / //

0 / //

12. 2. 8. hujus verò Compl. 77. 57. 52. \gg

Oriente vel Occidente post H. 6 dat Dist. \gg

à Culmine, infra H. 6. verò, ut in nostro exem.

exemplo , Distantia \bowtie ab H. 6. addita 90.
gradibus , producet Distantiam \bowtie à Culmi.

o / //

ne , nim. 102. 2. 8. & hoc ipſo etiam Arcum ſemidiurnum.

Jam ſi \bowtie eſt in Parte Occidentali , ſicut in noſtro calu , diſta Diſt. à Culm. addita Aſc. Rectæ \bowtie (vel Orientali ſubtracta) dat Aſcenſionem Rectam Medij Cœli. Ab hac (auctâ 360. ſi neceſſe eſt) ſi ſubtrahatur Aſcenſio Recta \odot , reſtabit Distantia \odot à Meridie præterito , quæ in tempus converſa dabit Horam Aſtron. quæque ſimul erit Hora Ortûs vel Occaſûs \bowtie .

Itaque in noſtro exemplo ſupputatio iſtæ hæc taliter inſtituitur.

o / //

Diſt. \bowtie à Culmine

{ 102. 2. 8. &

Aſc. Rect. ab γ .

{ 36. 8. — .

erit Aſc. R. Med. Cœli.

138. 10. 8.

ab hac auctâ 360. adeoque

498. 10. 8.

Aſc. Recta \odot

— 347. — 9. — .

151. — 1. 8.

quæ erit Distantia \odot à Meridie præterito.

Hæc in horas converſa dabit Horam Aſtron.

10. cum 4. min. quibus ſi addantur 3. minuta juxta Diff. inter Ortum & Occaſum Planetarum pro Elev. Poli 47. gr. 30. min.

qui.

quibus accommodatae sunt dictae Ephemerides, provenient 7. minuta ibidem expressa.

PROBLEMA. CXXXV.

Ascensionem Rectam D ex Longitudine, Latitudine, & Compl. Declin. ejusdem perscrutari.

Long. D à prox. Tropico est 57. gr. 41. min. Compl. Latitudinis 86. gr. 47. min. Compl. Declin. 80. gr. 42. min. Jam
 L. S. Long. à prox. Tropico { 992691. &
 L. S. Compl. Latitudinis { 999931.

L. S. Declin. 1. 992622.
 — 999425.

993197.
 querit L. S. Ascens. Rectae D à prox. Tropico scilicet 58. gr. 45. min. cujus Compl. 31. gr. 14. min. est Ascensio Recta ab V.

In Planisphaerio

Axin applica ad Compl. Latit. D 86. gr. 47. min. filum verò pone ad Long. à prox. Tropico 57. gr. 41. min. in linea Axis, filum.

lūmque in Axī monstrabit Ascens. Rectamā
prox. Tropico 58. gr. 45. min.

PROBLEMA CXXXVI.

*Eandem Ascensionem Rectam D a
prox. Tropico ex Compl. Declin. & La-
titudinis ejusdem, ac Declin. Ma-
xima statuere.*

Hæc tria addantur, scil.

Compl. Lat. subtrahendo Latitudinem D
ex 90. vel addendo ad 90. si Latitudo est
Australis, & Declinatio Borealis, ut in
nostro casu, vel vicissim hoc modo:

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| Compl. Lat. D | { | 93. gr. 13. min. |
| Declin. Max. | { | 23. 30. & |
| Compl. Declin. datæ | { | 80. 42. |
| | | <hr/> |
| | | 197. 25. |

Hæc Summa dividatur per 2.

& prodibunt

Compl. Lat.

erit Differentia Semiss.

Jam

| | |
|-------|---------|
| 98. | 42. 30. |
| - 93. | 13. |
| | <hr/> |
| 5. | 29. 30. |

| | |
|-------------------------------|---|
| L. S. Semissis | $\left\{ \begin{array}{l} 999497. \\ 398091. \text{ \& } \\ 39930. \end{array} \right.$ |
| L. S. Differentiæ | |
| Compl. Arith. 23. gr. 30. min | |

| | |
|---------------------|------------|
| | 1. 937518. |
| L. S. C. Decl. datæ | — 999425. |

| | |
|---------------------|------------|
| resid. addito S. T. | 1. 938093. |
| dividatur per | 2. |

969047.

hòcque ultimum productum erit L. S. Semissis graduum Ascens. Rectæ \gg à proximo Tropico, nim. 29. gr. 22. min. qui proinde duplicati dant totam Summam graduum Ascens. Rectæ quæsitæ, videl. 58. gr. 44. min. modica enim differentia in minutis, ob multiples Operationes intervenientes hîc attendi non debet, ut sæpiùs dictum.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Declin. Maximæ 66. gr. 30. min. versùs sinistram, filum ad Lat. \gg 3. gr. 13. min. supra Horizontem, si est Borealis, infra eundem verò, si est Australis, uti hîc, & filum in Parallelo Declin. \gg 9. gr. 18. min. indicabit Circulum horar.

trans

tranſeuntem per Aſcenſionem Rectam à Limbo, nim. 58. gr. 45. min.

PROBLEMA CXXXVII.

*Prædictam Aſcenſionem Rectam D
à Tropico ex Longit. D à prox. Tropico,
Complemento Declin. datæ, ac Declin.
Maxima deducere,*

Long. D à prox. Tropico eſt 57. gr. 41. min. Complementum verò Declin. datæ 80. gr. 42. min. & Declin. Max. 23. gr. 30. min. His poſitis

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| L. S. C. Declin. Max. | { 996239. & 1019886. |
| L. T. Long. à prox. Tropico | |

| | |
|-------|------------|
| S. T. | — 2016127. |
| | 1016127. |

& reliquum erit L. T. Inv. I. nim. 55. 24. 6.

| | |
|--------------------|----------------------|
| L. T. Declin. Max. | { 963830. 991547. |
| L. S. Inv. I. | |

| | |
|-----------------------|-------------|
| L. T. C. Declin. datæ | — 1.955377. |
| | 1.078580. |

| | |
|--|---------|
| | 876797. |
| eritque hic L. S. Inv. II. videl. 3. 21. 36. | |
| | Gra- |

| | | | | |
|----------------|-------|-----|-----|---|
| | 0 | 1 | 11 | |
| Gradus Inv. I. | { 55. | 21. | 45. | & |
| Inv. II. | { 3. | 21. | 36. | |

58. 45. 40.

quæ Summa dabit Ascens. Rectam \gg quæ-
sitam, non attentis rigorosè secundis.

In Planisphærio

Filum pone ad Declin. \gg 9. gr. 18. min.
infra Horizontem, si est Australis, supra
Horizontem verò, si est Borealis, uti hîc, A-
xin versa ad Complem. Declin. Maximæ
dextrorsum; tum granum fige in Circulo
horario Longitudinis \gg à prox. Tropico
57. gr. 41. min. Axin eleva ad 90. & gra-
num in Circulo hor. dabit Ascens. Rectam
quæsitam, scil. 58. gr. 45. min!

PROBLEMA CXXXVIII.

*Eandem Ascensionem Rectam \gg ex
Compl. Long. à prox. Tropico, Compl.
Latitudinis, ac Declinatione Maxima
desumere.*

Compl. Long. est 32. gr. 19. min. Compl.
Lat. verò 86. gr. 47. min. & Declin.
Maxima 23. gr. 30. min. Hinc

C c

L.

L.S.C.Long. prædictæ

L. T. Compl. Latitud.

{ 972802. &c

{ 1125026.

S. T.

— 2097828.

1097828.

qui erit L. T. Inv. I. nim. 84. gr. proximè ,
 hi additi Decl. Maximæ, si D est in Signis
 Australibus, vel etiam si sola Latitudo est
 Australis, uti hic, dabunt Inv. II. secus
 ipsa Differentia unius ab alio, adeoque in
 nostro casu

{ 84. — .
 { 23. 30.

107. 30.

L. S. Inv. I.

{ 999761. &c

L. T. Long. à prox. Trop. { 1019888.

2019649.

L. S. Inv. II.

— 997941.

1.021708.

qui erit L. T. Ascens. Rectæ, nim. 58. gr.
 45. min.

In Planisphaerio

Axin constitue in Vertice 90. filum ad
 Lat. 3. gr. 13. min. in Limbo infra Horizon-
 tem, si est Australis, uti in nostro casu, supra
 verò, si est Borealis, tum granum fige in
 Cir.

Circulo hor. Long. 57. gr. 41. min. Axin
autem revolve ad Compl. Declin. Maximæ,
& granum in Circulo hor. notabit Ascens.
Rectam 58. gr. 45. min.

PROBLEMA CXXXIX.

*Datâ Ascensione Rectâ, & Compl. La-
titudinis ▷ inquirere Compl. Declin.
ejusdem.*

Ascens. Recta ▷ à prox. Tropico inventa
est 58. gr. 45. min. Latitudo verò 3. gr. 13.
min. Jam

| | |
|---------------------------|-------------|
| L. S. C. Latitud. | { 999931. & |
| L. S. Long. à prox. Trop. | { 992691. |

| | |
|---------------------------|-----------|
| | 1.992622. |
| L. S. Asc. R. à pr. Trop. | — 993197. |

| | |
|---|---------|
| | 999425. |
| residuum erit L. S. C. Declin. nim. 80. gr. | |
| 42. min. | |

In Planisphærio

Axin statue ad Compl. Declin. Maximæ
66. gr. 30. min. filum ad Latit. 3 gr. 13.
min. in Limbo supra Horizontem, si est Bo-
realis, si autem est Australis, uti in nostro

casu, infra Horizontem, flúmque in Circulo
hor. Ascens. Rectæ 58. gr. 45. min. mon-
strabit Parallelum Declinationis \mathcal{D} 9. gr. 18.
min.

PROBLEMA CXL.

*Declinationem \mathcal{D} ex Compl. Ascens.
Rectæ, & Latitudine ejusdem, ac De-
clinatione Max. colligere.*

o / o

/ Compl. Ascens. Rectæ est 31. 12. Lar. 3.
13. & Declin. Max. 23. gr. 30. min. Ita-
que

L. S. C. Asc. Rectæ { 971487 &
L. T. Declin. Max. { 963830.

S. T. x. 935327
qui erit L. T. Inv. I. nim. 12. gr. 43. min.
proximè.

L. S. C. Inv. I. { 998921. &
L. S. Latitudinis { 874905.

1873826.

L. S. C. Declin. Max. — 996239.

877587.

eritque residuum L. S. Inv. II. scil. 3. gr.
25. min.

Dis.

Differentia igitur utriusque Inventi, si Lat. est Meridionalis, uti hîc, vel etsi Latitudo sit Borealis, \mathcal{D} tamen sit in Signo Australi, dabit Declinationem, hoc modo:

Inv. I. 12. gr. 43. min.

Inv. II. —3. 25.

9. gr. 18. min.

Si autem \mathcal{D} est in Signo Boreali, tunc Summa graduum utriusque Inventi indicabit Declin. quæsitam.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Declin. Max. 66. gr. 30. min. filum verò ad Latitudinem in Limbo supra Horizontem, si sit Borealis, si autem Meridionalis, uti hîc, infra Horizontem, & filum in Circulo horario Complementi Ascens. Rectæ 31. gr. 14. min denotabit Declin. 9. gr. 18. min.

PROBLEMA CXLI.

Declinationem \mathcal{D} ex Latitudine & Longitudine ejusdem à prox. Equinoctio eruere.

Lat. \mathcal{D} 3. gr. 13. min. Long. 32. gr. 19.

C c 3

406 *Uſus & utilitas Planispherij*

min. Compl. Declin. Max. 66. gr. 30. min.

Igitur

S. T. & L. S. Diſt. à prox. Æq. 1.972802.

L. T. C. Declin. Max. — 1.036169.

936633.

o / //

qui erit L. T. Inv. I. nim. 13. 5. 10.

Gradus Inv. I. in Signis Australibus adde,
in Borealibus verò, uti hîc, ſubtrahe à Compl.
Latitudinis, quod habetur, ſi Latitudo eſt
Borealis, eam ſubtrahendo ex 90. ſi verò La-
titudo eſt Australis, ſicut in noſtro exemplo,
addendo Latitudinem ad 90. adeoque

o / H

Compl. erit

93. 13. —

Inv. I.

— 13. 5. 10.

80. — 7. 50.

Productum hoc erit Inv. II. cujus Compl.

o / //

erit 9. 53. 10.

L. S. C. Inv. II,

L. S. C. Declin. Max.

{ 923493.
996239.

L. S. C. Inv. I.

1.919539.

— 998856.

920683.

reſiduum erit L. S. Declin. quælitæ, nim. 9.
gr. 18. min. proximè.

In Planisphærio

Axin constitue in vertice 90. filum applica ad gradum Lat. 3. 13. min. granum verò fige in Circulo horario Longitudinis 57. gr. 41. min. à Limbo; interim Axin reduc ad Complementum Declin. Max. 66. gr. 30. min. sinistrorsum, & granum dabit Parallelum Declinationis D 9. gr. 18. min.

PROBLEMA CXLII.

Complementum Declin. D ex Ascensione ejusdem, & Longit. à prox.

*Tropico, ac Declin. Maximâ
investigare.*

Ascensio Recta D est 58. gr. 45. min.
Longitudo 57. gr. 41. min. Declinatio Max.
23. gr. 30. min. adeoque ejus Compl. 66.
gr. 30. min. Itaque

L. S. C. Declin. Max.

L. T. Longit. à prox. Trop.

$$\left\{ \begin{array}{l} 996239 \ 82 \\ 1019888. \end{array} \right.$$

S. T.

$$\begin{array}{r} 2016127. \\ \hline 0 \end{array}$$

eritque L. Inv. I. videl. 55. 24.

Gradus Inv. I. in Signis Borealibus addantur

C c 4

Ascen-

408 *Usus & utilitas Planispharij*

Ascensioni Rectæ à prox. Æquin. 31. gr. 15.

min. uti hîc $\begin{cases} 55.24. \\ 31.15. \end{cases}$

86. 39. In Australibus subtrahantur. Productum erit Inv. II.

L. T. Declin. Max. $\begin{cases} 963830. \\ 991547. \end{cases}$

L. S. Inv. I. $\begin{cases} 963830. \\ 991547. \end{cases}$

L. S. Compl. Inv. II. $\begin{matrix} 1955377. \\ -876667. \\ \hline 1078710. \end{matrix}$

residuum erit L. T. Com. Declin. scil. 80. 43. proxime.

In Planisphærio

Axin pone ad Longitudinem à prox. Tropi

feu Limbo scil. 57. 41. filum ad Declinatio-

nem Maximam 23. 30. in Axi, Axin revol-
ve ad locum fili in Limbo, filum deprime in-
fra Horizontem ad Longitudinem à prox.
Æquinoctio 32. gr. 19. min. in Limbo, filum in
Æquatore ab extremitate dat Inv. I. scil.
55. gr. 24. min. horum Complementum ad-
de, vel subtrahe Ascensioni Rectæ à ~~60~~ jux-

ra dicta, eritque Inv. II. 86. gr. 39. min.
 Filum deprime infra Horizontem ad Inv. II.
 in Aequatore ab extremitate, Aequatorem
 pone ad locum fili, & filum ad locum Axis
 prius bene notandum filum in Axis à Centro
 dabit Complementum Declinationis.

PROBLEMA CXLIII.

*Data Longitudine & Declinatione
 invenire Latitudinem.*

Longitudo Δ à prox. Aequin. 32. 19. ^{0 /}

Declinatio 9. 18. ^{0 /}

L. S. Longitud. à prox. Aequin. { 972802.

L. T. Declin. Max. { 963830.

S. T. x. 936632.

residuum erit L. T. Inv. I. 13. 5. 9. ^{0 / //}

L. S. Compl. Inv. I. { 998856.

L. S. Declin. { 920845.

1919701

L. S. Compl. Declin. Max. — 996239.

923462.

eritque L. S. Inv. II. cujus Complementum

C c 5

80.

80. gr. 8. min. additum gradibus Inv. I.
 13. gr. 5. min. dabit Latitudinem Lunæ 93.
 gr. 13. min. adeoque 90. abjectis Meridiona-
 lem.

In Signis verò Australibus subtrahatur, nisi
 Declinatio pariter sit Australis.

In Planisphærio

Axin pone ad Verticem 90. filum ad De-
 clin. \searrow infra Horizontem, si est Australis,
 vel supra, si est Borealis, granum fige in Cir-
 culo horario Long. à proximo Tropico 57.
 gr. 41. min. eam numerando à Limbo fini-
 stro; tum Axin verte ad Complementum
 Declin. Maximæ 66. gr. 30. min. & granum
 in Parallelo, quem contingit, indicabit Lat.
 Borealem supra Æquatorem 3. gr. 13. min.
 Australem verò infra eundem.

PROBLEMA CXLIV.

*Complem. Latitudinis \searrow ex Ascens.
 ejusdem Recta à prox. Tropico, Comple-
 mento Declinationis, & Longitudine à prox.
 Tropico perscrutari.*

Ascens. Recta \searrow est 58. gr. 45. min. Compl.
 De-

Declinationis 80. gr. 42. min. Longitudo D
57. gr. 41. min. Jam

L. S. C. Longit. { 999425. &

L. S. Asc. Rectæ à prox. Trop. { 993192.

1. 992617.

L. S. Long. à prox. Trop. — 992691.

999926.

Residuum erit L. S. Complementi Lat. circiter, nim. 86. gr. 40. min. quòd autem aliàs ponamus 47. min. differentiam faciunt Minuta secunda in Ephemeridibus omitti solita, quæ in Complementis ejusmodi majoribus non solummodò minuta, sed etiam unum & alterum gradum importare possunt, prout tentanti facile apparebit.

In Planisphærio

Axin verte ad Compl. Declin. 80. gr. 42. min. filum ad Ascens. Rectam D 58. gr. 45. min. in Axi, Axin reduc ad Longit. à prox. Tropico 57. gr. 41. min. & filum in Axi dabit Compl. Lat. 86. gr. 47. min.

PRO-

PROBLEMA CXLV.

*Complementum Latitudinis D ex
Declinatione, & Longitudine ejusdem
à prox. Æquinoctio deducere.*

Declinatio D est 9. gr. 18. min. Longi-
tudo 32. gr. 19. min. Igitur
S. T. & L. S. Long. D à prox. Æq. 1. 972802.
L. T. C. Declin. Max. — 1. 036169.

936633.

• / //
qui erit L. T. Inv. I. nim. 13. 5. 9. Dein
L. S. C. Inv. I. { 998856. &
L. S. Declin. D { 920845.

1. 919701.
L. S. C. Declin. Max. — 996239.

923462.
residuum erit L. S. Inv. II. nim. 9. gr. 53.
min. cujus Compl. 80. gr. 7. min. in Signis
Borealibus addatur Inv. I. nisi Declinatio sit
Australis, in Signis verò Australibus sub-
trahatur, nisi Declinatio sit Borealis, conse-
quenter in nostro exemplo

Gra-

| | | | |
|-------------------|-----|----|----|
| | 0 | 1 | 11 |
| Gradus Inv. I. | 13. | 5. | 9. |
| & gr. C. Inv. II. | 80. | 7. | —. |

& proveniunt 93. 12. 9. qui subtrahit
ex 180. relinquunt Compl. Latit. Merid.
86. gr. 47. min.

In Planisphærio

Axin applica Complemento Declin. Ma-
ximæ 66. gr. 30. min. filum verò Declina-
tioni in Limbo 9. gr. 18. min. flumque in
Circulo horario Longitudinis 57. gr. 41. min.
à Limbo dextro dabit Latitud. Australem in-
fra Æquatorem 3. gr. 13. min.

PROBLEMA CXLVI.

*Eandem Latitudinem D ex Latit-
udine Maxima, & Distantia ejus à pro-
ximo Nodo, seu Capite vel Cauda Draconis
invenire.*

Lat. Max. D supponitur hîc 5. gr. 26.
min. Distantia à prox. Nodo 38. 34. 45.
Itaque

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| L. S. Dist. à prox. Nodo | { 97° 52. & 89° 63. 83. |
| L. S. Lat. Max. | |

S. T. x. 874905.
residuum erit L. S. Lat. D 3. gr. 13. min.

In Planisphærio

Axin pone ad Dist. à proximo Nodo 34. gr. 34. min. filum move ad Lat. Max. in Axii 5. gr. 06. min. filum in Limbo dat Latitudinem 3. gr. 13. min.

PROBLEMA CXLVII.

Latitudinem Max. D ex Latitudine & Distantia ejusdem à prox. Nodo enodare.

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----|-----|
| | o | I | II |
| Dist. à proximo Nodo est | 34. | 34. | 45. |
| Lat. 3. gr. 13. min. | Nunc ergo | | |
| L. S. Lat. datæ, & S. T. | 1. 874905. | | |
| L. S. Dist. à prox. Nodo | — 97° 52. | | |
| | 89° 63. 83. | | |

eritque L. S. Lat. Maximæ, nim. 5. gr. 13. min. 45. sec.

In Planisphærio

Axin pone ad Dist. \mathcal{D} à prox. Nodo 37.
gr. 34. min. filum verò ad Lat. datam, 3. gr.
13. min. in Limbo, filumque in linea Axis
dat Latitudinem Max. 5. gr. 16. min. 45. sec.

PROBLEMA CXLVIII.

*Distantiam à prox. Nodo ex Lat.
Maxima, & Lat. data assignare.*

Lat. Maxima \mathcal{D} est 5. gr. 16. min. Lat.
data 3. gr. 13. min. Itaque

L. S. Lat. datæ, & S. T. 1.874905.

L. S. Lat. Maximæ — 896383.

978522.

qui erit L. S. Dist. à prox. Nodo, nim.

37. 34. 45.

In Planisphærio

Axin pone ad Lat. Maximam 5. gr. 16.
min. filum autem ad Lat. datam in Limbo,
3. gr. 13. min. filumque in Axi dabit Dist.
à prox. Nodo quæsitam 37. gr. 34. min.

PRO.

PROBLEMA CXLIX.

*Longitudinem D ex Ascensione
ejusdem Recta à prox. Tropico, & Compl.
Latitudinis & Declinationis
arguere.*

Asc. Recta D est 58. gr. 45. min Compl.
Lat. 86. gr. 47. min. Compl. Declin. 80. gr.
42. min. Igitur

| | |
|----------------------|-----------|
| L. S. Ascens. Rectæ | 993192. & |
| L. S. Compl. Declin. | 999425. |

| | |
|-----------------------|-----------|
| | 992617. |
| L. S. Compl. Latitud. | — 999931. |

992686.

Resid. erit L. S. Longit. D à prox. Tropico,
nim. 57. gr. 41. min. proximè.

In Planisphaerio

Axin colloca ad Compl. Declinationis
80. gr. 42. min. filum ad Ascens. Rectam
à prox. Tropico 58. gr. 45. min. Axin verò
revolve ad Compl. Latitudinis 86. gr. 47.
min. & filum in linea Axis dabit Longit.
à prox. Tropico 57. gr. 41. min.

PRO-

PROBLEMA CL.

*Longitudinem Dex Compl. Declin.
& Latitudinis ejusdem, ac Declina-
tione Max. inferre.*

Complementum Latitudinis habetur, si hæc subtrahatur ex 90. nisi Lat. sit Australis, & Declinatio Borealis, uti fit in nostro exemplo, vel vicissim, tunc enim addenda est Latitudo ad 90. Hoc notato, addantur hæc tria, videlicet

Compl. Latit. in casu nostro 93. gr. 13. min.

Compl. Declin. datæ 80. 42.

& Declinatio Max. 23. 30.

197. 25.

Summa dividatur per

2

eritque Semissis Summæ 98. 42.

inde verò Com. Decl. datæ 80. 42.

quæ erit Differentia 18. — Jam

L. S. Semissis subtractæ ex 90 { 999497.

L. S. Differentiæ Semissis { 948998. &

Compl. Arith. Declin. Max. { 39931.

1988426.

L. S. C. Latit.

— 999931.

1988495.

Summa præfixâ unitate divid. per 2

994247,

hæc.

hæcque ultima ſemiſumma erit L. S. Dimi-
 $\begin{matrix} 0 & 1 & 11 \end{matrix}$
 dij graduum Longitudinis 61. 9. 25. cujus
 duplum dat 122. gr. 19. min. proximè, quæ
 ſubtracta ex 180. relinquunt 57. gr. 41. min.
 pro Longitudine \mathcal{D} quæſita.

In Planisphærio

Axin accommoda Complemento Declin.
 Maximæ 66. gr. 30. min. ſilum verò Lati-
 tudini \mathcal{D} 3. gr. 13. min. & quidem ſupra
 Horizontem, ſi Latitudo eſt Borealis, infra
 verò, ſi eſt Australis, uri hîc; tum granum
 ſige in Circulo hor. Aſcenſ. Rectæ 58. gr. 45.
 min. & Axe ad 90. reducto, granum in Cir-
 culo hor. notabit Longitudinem \mathcal{D} à Limbo
 57. gr. 41. min.

PROBLEMA CLI.

*Eandem \mathcal{D} Longitudinem ex Aſc.
 Recta, Complemento Declin. data, &
 Declin. Maxima deſumere.*

Aſc Recta à prox. Æquin. eſt 31. gr. 15.
 min. Compl. Declinationis datæ 80. gr. 42.
 min. Declin. Maxima 23. gr. 30. min.
 Itaque

L

L. S. Ascens. Rectæ à prox. Æq. { 971497. &
L. T. Compl. Declin. datæ { 1078580.

S. T. — 2050077.
qui erit L. T. Inv. I. 1050077.

o / //
nim. 72. 28. 51. his gradib. add. grad. Decl.
Max 23. 30. — .

95. 58. 51. eritq; hoc Inv. II. quod sub-
tractum ex 180. dat 84. gr. 1. min. 9. sec.

L. S. Inv. I. { 997936.
L. T. Asc. R. à prox. Trop. { 1021694.

2019630.
L. S. Inv. II. — 999763.

1019867.
qui erit L. T. Longit. D quæsitæ, nim. 57.
gr. 41. min. proximè.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Declin. Maximæ
66. gr. 30. min. filum verò ad punctum, in
quo Parallelus Declin. datæ 9. gr. 18. min.
secuerit Circulum hor. Ascens. Rectæ 58. gr.
45. min. ibique granum fige; tum Axin
constitue ad verticem 90. & granum in Cir-
culo horario indicabit Longitudinem D.

PROBLEMA CLII.

*Longitudinem D ex Ascensione Recta, ac Latitudine ejusdem, & Declin.
Maxima elicere.*

Ascensio Recta D est 58. gr. 45. min. Latitudo 3. gr. 13. min. Declinatio Max. 23. gr. 30. min. & Compl. illius 66. gr. 30. min. His positis

L. S. C. Declin. Maximæ { 996239. &
L. T. Asc. Rectæ à prox. Trop. { 1021694.

S. T.

2017933.

1017933.

0 / //

Residuum erit L. T. Inv. I. 56. 30. 25.

Dein

L. T. Declin. Max.

{ 963830. &

L. S. Inv. I.

{ 992113.

1.955943.

L. T. C. Latitudinis — 1.125026.

830917.

0 / //

Residuum erit L. S. Inv. II. nim. 1. 10. 3.

Gradus Inv. I. & II. in Signis Australibus addantur, in Borealibus verò subtrahantur, ni-

si Latitudo sit Australis, uti contingit in casu nostro, in quo proinde

$$\begin{array}{rcl} \text{Gr. Inv. I.} & \left\{ \begin{array}{l} 56. \quad 30. \quad 25. \quad \& \\ -1. \quad 10. \quad 3. \end{array} \right. & \\ \text{Gr. Inventi II.} & & \\ \hline & 57. \quad 40. \quad 28. & \end{array}$$

adeoque exhibent Longit. \bowtie quæsitam 57. gr. 41. min. propè verum.

In Planisphærio

Axin verte ad Compl. Declin. Maximæ 66. gr. 30. min. filum ad Latitudinem \bowtie 3. gr. 13. min. in Limbo supra Horizontem, si Lat. est Borealis, vel infra, si est Australis, uti hîc, granum verò fige in Circulo horario Asc. Rectæ \bowtie 58. gr. 45. min. & Axe ad 90. reducto, granum in Circulo hor. monstrabit Longitudinem \bowtie quæsitam 57. gr. 47. min.

PROBLEMA CLIII.

Distantiam \bowtie à Meridie, ex Dist.

\odot à Meridie præterito, ac Ascensione

Rectâ utriusque colligere.

Distantia \odot à Meridie præterito positus hîc esse 75. gr. Asc. ejusdem Recta 346. gr.

D d 3

50.

50. min. Asc. verò Recta \bowtie 31. gr. 15. min.
Jam

Ascensioni Rectæ \odot adde ejusdem Distan-
tiam à Meridie præterito, eritque Asc. Recta
Medij Cœli; ab hac auctâ 360. si necesse est,
subtrahe Asc. Rectam \bowtie , restabitque Distan-
tia \bowtie à Meridie præterito, rejectis scil. 360.
si excêdit. Sic in exemplo posito

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Asc. Recta \odot | { 346. gr. 50. min. &c |
| Dist. \odot à Meridie | { 75. 00. |

| | |
|----------------------|-----------|
| | 421. 50. |
| Asc. Recta \bowtie | — 31. 15. |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| | 390. 35. |
| Residuum, subtractis 360. | erit Dist. \bowtie |
| à Meridie, videl. 30. gr. 35. min. | |

In Planisphaerio

A puncto Asc. Rectæ \odot in linea Æquato-
ris numera antroorsum gradus Distantiæ \odot
à Meridie præterito, & habebis Asc. Medij
Cœli; ab hac denuò retrorsum numera gra-
dus Ascens. Rectæ \bowtie & incidēs in Dist. \bowtie
à Meridie.

PRO-

PROBLEMA CLIV.

Datâ Dist. ☽ à Meridie, & Ascens.

*Rectâ tam ☉ quàm ☽ Distantiam ☉
à Meridie deducere.*

Dist. ☽ à Meridie ponitur hîc esse 30. gr.
35. min. Ascensio ejusdem Recta 31. gr. 15.
min. Ascensio Recta ☉ 346. gr. 50. min.

Gradus itaque Distantiæ ☽ à Meridie sub-
trahe ab ejus Asc. Recta, si ☽ est Orientalis ,
vel si est Occidentalis , uti hîc , adde , & ha-
bebis Asc. Rectam Medij Cœli, ab hac autem
auctâ 360. gr. si necesse est , subtrahe Asc.
Rectam ☉, & dabitur Dist. ☉ à Meridie præ-
terito. Sic in exemplo dato

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dist. ☽ à Meridie | { 30. gr. 35. min. & |
| Asc. Recta ☽ | { 31. 15. |

| | |
|--------------------------|-----------|
| erit hæc Asc. R. M. Cœli | { 61. 50. |
| Ab hac aucta | { 360. |

| | |
|--------------|------------|
| | 421. 50. |
| Asc. Recta ☉ | — 346. 50. |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| | 75. 00. |
| eritque Dist. ☉ à Meridie | Hora 7. ve- spertina. |

In Planisphærio

Ab Ascens. Recta ☽ numera in Æquatore (secundum ordinem Signorum, si ☽ est Orientalis, vel contra ordinem illorum, si est Occidentalis) gradus Dist. ☽ à Meridie, & habebis Mediationem Cœli 61. gr. 50. min. abhinc si contra ordinem Signorum numeres gradus Ascens. Rectæ ☉ 346. 50. min. invenies gradus Dist. ☉ à Meridie 75.

Circa hæc Problemata Lunaria sine numero multiplicabilia, ut tempori, & chartæ parcamus, obiter solummodò adhuc observo

I. Ut ex Hora Lunari v. g. inveniaturs ejus Altitudo, Azimuth &c. vel vicissim, eodem modo procedendum esse, sicut supra in Problematis Solaribus indicatum est.

II. Quæcunque dicta sunt de ☽, eodem prorsus modo reliquis Planetis, imò etiam Cometis ac Stellis Fixis applicari posse.

III. Denique cum ex dictis locus, vel etiam Ascensio tam ☉ quàm ☽ per Calculum æquè, ac ex ipso Planisphærio inveniaturs, haud difficile erit, etiam Novi- & Plenilunia, imò etiam ipsas Eclipses suo modo ex Planisphærio invenire posse; quando enim ☉ & ☽ eundem in Ecliptica locum ob-

nient,

nent, adeoque etiam in Ascensione Recta conveniunt, erit Novilunium, si verò inveniuntur esse in Signis oppositis, adeoque distare 180. gr. erit Plenilunium; & siquidem utrumque contingat in Nodis ☽ seu Capite, ut vocant, vel Cauda Draconis (quod ex Calendarijs sciri poterit) hoc ipso fiet Eclipsis, Solaris quidem in Novilunio, Lunaris verò in Plenilunio. Nunc ad Problemata Horographica, ut promissis stemus, pergendum erit. Sit itaque

PROBLEMA CLV.

Per Planispharium in Plano Horizontali dato Azimuth, Lineam Meridianam describere.

Ultra 9. modos in I. Parte fol. 123. & seqq. assignatos, promissimus ibidem fol. 129. inferius adhuc ostendere, quomodo Linea Meridiana ex ipso Planisphærio erui possit, quod proinde hic breviter præstamus. Itaque Axe Planisphærij in Horizonte constituto, in Centro ipsius perpendiculariter erigatur stylus, vel Centro ejusdem imponatur Corpus v. g. lineale quadratum Plano illius perpendiculariter insistent, & Planisphærium tamdiu hinc inde vertatur, donec stylus

Q d 5

vel

vel Corpus perpendiculare prædictum gradum Azimuth aliunde inventum umbrâ suâ perfectè attingat, hoc ipso enim linea Axis, & consequenter etiam latus Planisphærij in præfato situ eidem parallelum exhibebit Lineam Meridianam.

PROBLEMA CLVI.

*Inventâ, ac in Plano Horizontali
descriptâ Lineâ Meridianâ, Azi-
muth quovis tempore dicto citius
reperire.*

Planisphærio inventæ Lineæ Meridianæ applicato, stylus vel Corpus perpendiculare Centro ejusdem insistens gradum Azimuth in Limbo singulis momentis exhibebit, magno certè & ad plurimas Operationes utili compendio.

PROBLEMA CLVII.

*Datô Azimuth à Meridie Declina-
tionem Plani Verticalis v. g. Muri
Planisphærio explorare.*

Planisphærium stylo perpendiculati, ut suprà, instructum secundum latus, ubi Arcus Signorum ac Mensium descripti inveniuntur,
Mu.

Muro applicetur, & liquidem umbra Styli gradum Azimuth aliunde inventum perfectè attingat, nulla erit Declinatio; si nondum attingit, Declinatio Muri erit versùs Occasum tot graduum, quot gradibus à dato Azimuth adhuc distat linea umbræ; si verò excedat gradus Azimuth dati, Declinatio Muri erit versùs Ortum totidem gradibus.

PROBLEMA CLVIII.

*Data Declinatione Muri invenire
Altitudinem Styli supra Lineam
Substylarem.*

Ponamus, Declinationem Muri inveniri

40. gr. versùs Ortum.

Itaque

L. S. C. Elevat. Poli

982551. &c

L. S. C. Declin. Muri

988425.

S. T.

x. 970976.

residuum erit L. S. Altitudinis Styli nim.

o 1 //

30. 50. 11.

In Planisphærio

Ad Elevat. Poli disposito filum deprime,
donec in linea Æquatoris, seu Ascensionum
Rectarum gradum Declin. Muri 40. attingat,
filum.

filumque in Limbo dabit Altitudinem Styli,
scil. 30. gr. 50. min.

PROBLEMA CLIX.

*Datâ Altit. Styli indagare Distan-
tiam Linea Substylaris à Meridionali.*

| | | |
|--------------------------|---------|----------|
| Altitudo Styli fuit | 0 / // | Elevatio |
| Poli verò supponitur | 48. gr. | Jam |
| L. S. Elev. Poli & S. T. | I | 987107. |
| L. S. C. Alt. Styli | ← | 993380. |

993727.

residuum erit L. S. C. Dist. Substylaris à Linea

0 / //

Meridiana nim. 59. 56. 30. atque adeò ipsa

0 / //

Distantia erit 30. 3. 30.

In Planisphaerio

Axin pone ad Compl. Alt. Styli 59. gr.
10. min. proximè, filum ad Elevationem
Poli, 48. gr. filumque in linea Axis nota-
bit Compl. Distantiæ Substylaris à Meri-
diana 59. gr. 56. min.

PRO.

PROBLEMA CLX.

*Datâ Distantiâ Lineæ Substylaris
à Meridianâ deprehendere Horam,
per quam transit Linea Sub-
stylaris.*

o / //

Dist. Substylaris fuit 30. 3. 30. Alt. Styli
o / //
verò 30. 50. 11. Nunc ergò
L. T. Dist. Substylaris & S. T. 1. 976246.
L. S. Alt. Styli - 970976.

1. 005270.

qui erit L. T. Dist. Substylaris à Meridie seu
o / //
Horæ prædictæ nim. 48. 28. 5. qui est terti-
us quadrans ad H. 9. proximè.

In Planisphærio

Axin pone ad Altit. Styli 30. gr. 50. min.
filum ad Distantiam Substylaris à Meridiana,
seu à linea H. 12. in Limbo, & in eodem gra-
du Limbi dextrorsum fige gemmam, filoque
ad Horizontem reducto, gemma in Circulis
hor. à Limbo dabit Dist. quæsitam Substy-
laris à Meridie, seu Horam, per quam tran-
sit, Marutinam quidem, si Declinatio Mari
est

est Orientalis, uti hîc, Vespertinam verò, ſi
est Occidentalis.

PROBLEMA CLXI.

*Distantias omnium Horarum à Li-
nea Substylari, ex Altitudine Styli, &
Distantiâ hor. communiter 15. gr. compu-
tatâ, determinare.*

Alt. Styli est 30. gr. 50. min. Distantia
hor. Lineæ Substylaris v. g. ab H. 10. juxta
communem horarum pro 15. gradibus com-

putationem est 18. 28. 5. Itaque
L. S. Alt. Styli 970976. &
L. T. Dist. horar. Lin. Substyl. 952370.

S. T. x. 923346.
residuum erit L. T. Distantiæ Substylaris
à Verticali H. 10. quæſito, nim. 9. 42. 50.

In Planisphærio

Supponatur Limb⁹ dexter esse Linea Substyl. ;
ab hoc ergo in Circulis hor. quærat^r Dist. hor.
communis à Linea Substylari v. g. 18. gr. 28.
min. ibique ſige granum. Filum deineleva,
do-

per Problemata demonstratur. 431

donec granum attingat ipsum Limbum, & gradus à grano attactus in Limbo indicabit Dist. Substylaris à Verticali H. 10. nim. 9. gr. 43. min. proximè.

PROBLEMA CLXII.

Mensurare Arcus singularum horarum pro Horologijs Horizontalibus.

L. T. Dist. ☉ à Meridie v. g. H. 2. Pomerid. seu 30. gr. { 976143. &
L. S. A. P. { 987107.

S T. x. 963250.
residuum erit L. T. Arcus H. 2. quæsitum
 0 / //
nim. 23. 13. 17.

In Planisphærio

Ad Elev. Poli directo, accipe in linea Horizontali Circino Dist. Arcus v. g. H. 2. quæsitum à Meridie seu Limbo, hancque Distantiam, seu Circini aperturam applica gradibus Æquatoris ab V. seu Extremitate, & incidēs in dictos 23. gr. 13. min.

PRO,

PROBLEMA CLXIII.

Mensurare Arcus singularum horarum pro Horologijs Verticalibus.

L. T. Dist. ☉ à Meridie v. g. H. 2. Pomerid.
 feu 30. gr. { 976143. &
 L. S. C. Elev. Poli { 982551.

S. T. x. 958694.
 eritque residuum L. T. Arcûs H. 2. quæsitî,
 0 / //
 nim. 21. 7. 20.

In Planisphærio

Fiat, ut in Problemate præcedenti ; hoc solo excepto , quòd Axis hîc dirigatur ad Compl. Alt. Poli 42. gr.

PROBLEMA CLXIV.

Ope Planisphærij Horologium Horizontale describere.

Inventâ ac descriptâ Lineâ Meridianâ
 in

In Plano Horizontali, ex quodam ejusdem puncto describe Circulum Limbo Planisphærij æqualem, & per centrum hujus Circuli duc Lineæ Meridianæ perpendicularem, quæ erit Linea H. 6. tum Planisphærio ad Elevationem Poli disposito, filoque ad Horizontem reducto, granum fige in puncto, ubi Arcus Horæ v. g. 2. inscribendæ filum secat, filumque sursum promove, donec granum Planisphærij Limbum attingat, & abscindes ibidem 23. gr. 13. min. qualem nimirum in Probl. 162. invenimus esse Distantiam Arcus Horæ 2. Tot itaque gradus cape in Limbo Planisphærij, & transfer è Linea Meridiana utrinque in Circulum ibidem descriptum, & habebis puncta H. 2. &c. & sic de alijs loquendo. Quòd si aliunde juxta Probl. cit. jam scias Distantiam Arcuum singularum horarum, præfato grano opus non erit, sed gradus singularum horarum jam notos immediatè ex Limbo Planisphærij capere, & à Linea Meridiana utrinque dicto modo in Circulum in Plano descriptum immediatè transferre poteris. Quantum ad Stylum, erigendus is erit supra Lineam Meridianam ad Elevationem Poli 48. gr.

PROBLEMA CLXV.*Verticale non Declinans designare.*

Planisphærio ad Com. Elev. Poli disposito, operare per omnia, ut prius, nisi quod Stylus ad dictum Complementum Elev. Poli erigendus sit.

PROBLEMA CLXVI.*Verticale Declinans ope Planisphærii construere.*

In omni Verticali quomodocunque Declinante Linea H. 12. semper debet duci ad Horizontem perpendicularis, unde haud difficile erit, ducere Lineam Substylarem juxta cognitam ex Probl. 159. ejus à Meridianâ Distantiam. Planisphærio itaque ad Altitudinem Styli disposito duc Lineam Substylari perpendicularem, quæ proinde erit Linea Æquinoctialis, & in puncto decussationis describe Circulum, in quem à Linea Substylari transferes intervalla singularum horarum, juxta Distantias earum à Substylari supra inventas, modo supra dicto. Stylus erigendus est super Linea Substylari.

Stylari juxta Altitudinem ejusdem ex suprà dictis jam notam, eritque Horologium absolute solutum.

PROBLEMA CLXVII.

*Declinationem Muri ex Altitudine
Styli colligere.*

Servire potest hoc Problema ad antiqua Horologia, ubi solus Stylus superest, quoad Lineas horarias renovanda. Sit itaque Al-

titudo Styli superstitis 30. 50. 60.

L. S. Alt. Styli, & S. T. 1. 970976.

L. S. C. Elev. Poli — 982551.

988425.

qui est L. S. C. Declin. Muri, nim. 50. gr. adeoque Declinatio Muri erit 40. gr. & quidem versùs Ortum, si Stylus tendit sinistrossum, versùs Occasum autem, si dextrorsum.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Elev. Poli 42. gr. flum ad Alt. Styli in Limbo 30. gr. 50. min. flumque in Axide dabit Compl. Decl. Muri

Es 1

50.

50. gr. adeoque ipsa Declinatio Muri erit
40. gr. Diff. gr. Azimuthi & Dist. umbræ
styli recti à perpendiculari ad Horiz. & Declin.

PROBLEMA CLXVIII.

Datâ Distantiâ Substylaris à Meridianâ, scire etiam Altitudinem Styli.

Dist. Substylaris à Meridiana sit in Horologio, in quo solæ Lineæ absque Stylo sunt

superstites, w. g. 30. 3. 36. Compl. ve-

rò hujus Dist. 59 56. 30. Jam
L. S. Elev. Poli, & S. T. 1.987107.
L. S. C. distæ Dist. — 993727.

993380.
residuum erit L. S. C. Alt. Styli, nim.
59. 56. 30. sicque ipsa Alt. erit, 30. 50.

In Planisphaerio

Axin eleva ad Compl. Dist. à Meridiana

59. 56. 30. filum verò ad Elev. Poli in Limbo, & hoc in Linea Axis abscinder 59. gr. 10. min. pro Compl. Altitudinis Styli.

PRO.

PROBLEMA CLXIX.

*Invenire, quo tempore Sol incipiat,
vel desinat illuminare Murum.*

Si Declinatio Muri est versus Ortum, Di-
stantia Substylaris à Meridiana, nim.

0 / //

30. 3. 30. subtrahatur ex 90. & provenient

0 / //

59. 56. 30. pro ultimo puncto illuminati-
onis ante Occasum, qui in horas redacti, indi-

1 / //

cant H. 3. 59. 4. consequenter Murus illu-
minabitur adhuc paululum ante H. 4.

Quòd si locò dictæ subtractionis fiat additio
Distantiæ Substylaris à Meridiana ad 90.

0 / //

prodibunt 120. 3. 30. qui in tempus redacti

1 / //

habunt 8. h. 0. 14. adeoque Mu-
ret illuminari paulò ante H. 4. si ☉ ibi jam
esset supra Horizontem. Si verò Declina-
tio Muri est versus Occasum, contrario mo-
do procedendum, & locò Ortus in priori
exemplo accipiendus est Occasus, ac
vicissim.

In Planisphaerio

Axe ad Elev. Styli 30. gr. 50. min. posito, filum eleverur ad Compl. Distantiæ Substylaris à Meridiana 59. gr. 56. min. dextrorsum, ibique granum fige; rum reducto filo ad Horizontem, à grano numera sinistrorsum horas interceptas usque punctum Arcus horarij, per quem transit Linea Substylaris, nim. 48. gr. 28. min. à Limbo computati, & invenies 4. horas proximè, scil. post Meridiem, si Declin. est versùs Ortum, ante Meridiem verò, si est versùs Occasum.

PROBLEMA CLXX.

Data Distantiâ cujuscunque Verticalis à Linea Substylari, invenire Arcum horarium, seu Horam illi convenientem.

Sit v. g. Distantia Verticalis $9^{\circ} 42' 50''$. Alt.
 tit. Styli $30^{\circ} 50' 41''$. Jam ergo
 S. T. & L. T. dictæ Dist. 1. 923346.
 L. S. Alt. Styli — 970976.

 952370.
 qui

qui erit L. T. Distantiæ Arcûs horarij à
Substylari, videl. 18. 28. 5. qui gradus sub-
tracti à Dist. Substylaris à Meridiana 48. 28. 5.
relinquunt 30. gr. seu 2. horas à Meridie, in-
fra Substylarem, vel si dicta Distantia sit su-
pra eandem, debent addi Distantiæ Substyla-
ris à Meridiana, & provenient 66. 56. 10.
seu $4\frac{1}{2}$ hor. proximè.

In Planisphærio

Axin applica Altitudini Styli 30. gr. 50.
min. filum ad dictam Verticalis à Substylari
Dist. 9. gr. 43. min. ibique fige granum, &
filo ad Horizontem reducto granum in Circu-
lis horarijs à Limbo dabit Dist. Arcûs hor.
à Substylari 18. gr. 28. min. Cætera, ut prius.

PROBLEMA CLXXI.

*Dato Arcu Distantia à Linea Me-
ridiana in Plano Horizontali, & Al-
titudine Styli repèrire Horam eidem con-
gruentem.*

Arcus dictæ Distantiæ sit 23. 13. 17. Alt.
E c 4 Sty.

440 *Uſus & utilitas Planisphærij*

Styli 48. gr. utpote, quæ in Plano Horizontali ſemper coincidit cum Elevatione Pol. Jam ſic

L. T. dictæ Diſt. & S. T. 1. 963250.

L. S. Alt. Styli — 987107.

976143.

reſiduum erit L. T. Diſtantiæ ☉ à Meridie, nim. 30. gr. ſeu H. 10. ac 2.

In Planisphærio

Axin pone ad Alt. Styli 30. gr. 50. min. ſilum ad Diſt. Horizontalem 23. gr. 13. min. ibique fige granum, quod filo ad Horizontem reducto in Arcubus horarijs à Limbo indicabit Horam quæſitam 2. vel 10.

PROBLEMA CLXXII.

Data Diſtantia à Linea Subſtylari, invenire Diſtantiā à Linea Meridiana, ſeu Horam Diei.

Diſt. à Subſtylari ſit 9. 42. 50. & Diſt.

Subſtylaris à Meridiana ſit 30. 3. 30. Hi gradus ab invicem ſubtracti dant Diſtantiā à Mer-

à Meridiana infra Substylarem , additi verò supra eandem. Quod idem in Planisphærio inveniri poterit in Æquatore, locò subtractionis dictos gradus numerando retrorsum, vel antorsum locò additionis. Atque hâc ipsâ ratione datâ Dist. à Linea Meridiana , inveniri etiam poterit Distantia à Substylari, ut consideranti patebit.

Problematis Horographicis coronidis locò addimus adhuc sequens , quod P. Dechales Tom. 4. lib. 2. Gnomon. Propos. 37. merito dicit esse magni momenti , cum eo mediante in quovis Plano describi possit Horologium , etiam si nec Inclinatio ejusdem , nec Declinatio , nec Linea Meridiana, nec Altitudo Poli sciatur. Est autem hujusmodi.

PROBLEMA CLXXIII.


Tribus umbræ punctis eodem die observatis , absque omnibus alijs præcognitis, in quovis Plano Horologium describere.

In Plano quocunque perpendiculariter erigatur Stylus AB, cujus tres umbræ eodem Die observentur , nempe C. D. E. ita tamen, ut umbra D. sit alijs brevior. Ad hæc 3. puncta ducantur ex A. tres Lineæ AC, AD,

Ee 5

AE.

AE. & ad has describantur tres perpendiculares æquales Stylo AF. AG. AH. Tum abscindantur FL. & HO. Lineæ DG. æquales, ducanturque KO. & LS. Lineis AC. & AE. perpendiculares. Ducatur etiam SK. cui Lineæ SN. & KM. sint perpendiculares, Lineis SL. & KO. æquales. Præterea ducatur Linea NM. quæ si cum Linea SK. sit parallela, erit ipsa Linea Æquinoctialis; si verò concurrat cum Linea SK. in puncto v.g. P. tunc Linea PD. erit Æquinoctialis, & consequenter Linea AR. utpote ipsi perpendicularis, erit Substylaris.



Idem

Idem per Logarithmos eruitur hoc modo.
Accipiantur tria intervalla à dictis punctis
C. D. E. usque ad extremitatem Styli, ac vi-
deatur ex scala v. g. 1000. partium, quor
partes quodvis hujusmodi intervallum con-
tineat, & minimum illorum subtrahatur à
reliquis duobus, ut habeantur duæ eorum
Differentiæ, scil. major & minor. Simili-
ter mensura etiam ipsum Stylum, quem po-
namus continere 400. partes, minimum ve-
rò ex dictis intervallis 690. medium 860. &
maximum 1080. adeoque dictæ duæ Diffe-
rentiæ erunt 170. & 390. His positis

$$\begin{array}{r} \text{L. Numeri Longit. Styli} \\ \text{L. Numeri Diff. majoris} \end{array} \quad \begin{array}{r} \{ 260206. \& \\ \{ 259106. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 519312. \\ \text{L. Numeri Intervalli majoris} - 303342. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 215970. \\ \text{residuum erit L. Numeri Lineæ LS. nim. 144.} \end{array}$$

$$\text{S. T. \& L. Numeri LS.} \quad 1. 215970.$$

$$\text{L. Numeri Diff. majoris} \quad - 259106.$$

$$\begin{array}{r} 956864. \\ \text{eritque hic L. S. Alt. } \odot \text{ supra Planum,} \\ \text{scil. 21. gr. 44. min.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{L. S. C. Alt. } \odot \\ \text{L. Numeri Diff. majoris} \end{array} \quad \begin{array}{r} \{ 996797. \& \\ \{ 259106. \end{array}$$

$$\text{S. T.} \quad 4.255903.$$

&

444 *Uſus & utilitas Planispherij*

& remanebit L. Numeri CS. videl. 362.
Ulteriùs

L. Numeri Longit. Styli { 260206. &
L. Numeri Diff. minoris { 223044.

L. Num. Intervalli medij — 483250.
— 293449.

residuum erit L. Numeri KO. nim. 79.
ab hoc L. addito S. T. 1189801.

L. Num. Diff. minoris — 223044.

eritque L. S. Alt. ☉ alterius supra Planum,
27. gr. 43. min.

Denique L. S. C. Alt. ☉ { 994707. &
L. Num. Diff. minoris. { 223044.

S. T. * 217751.

eritque Log. Numeri Lineæ EK. nim. 150.

Per puncta igitur S. & K. duc rectam, & su-
pra punctum K. erige Lineolam KM. æqua-
lem Lineæ KO. & perpendicularem Lineæ
SK. similiter supra punctum S. erige SN.
æqualem SL. ac perpendicularem dictæ Li-
neæ SK. & per puncta MN. denuò duc re-
ctam, quæ si cum Linea SK. erit paretella, erit
ipsa Linea Æquinoctialis, si verò cum Linea
SK. concurrat v. g. in puncto P, tunc Linea

PD.

PD. erit *Æquinoctialis*, adeoque huic perpendicularis AR, erit *Substylaris*, ut supra.

Pro sequenti Operatione supponitur hic *Regulam*, secundum spatium *Semidiametro Planisphærij* correspondens esse divisam in 1000. v. g. partes æquales, juxta dicta f. 174.

In Planisphærio

Axin pone ad Horizontem, & vide, quis gradus Axis congruat Longitudini Styli in Regula, simulque quis gradus Axis respondeat Differentiæ majori in eadem Regula. Ad gradum ergo Longitudinis Styli in Limbo eleva Axem, ac Regulam promove ad gradum Dist. majoris in Axi à Centro, & Regula dabit Lineam CL, ac simul in Limbo gradum respondentem Lineæ SL. Reductis postea Axe & Regulâ ad Horizontem, vide quis numerus Regulæ respondeat gradui SL. & hic numerus dabit Longitudinem Lineæ SL. Eodem modo quæritur Longitudo Lineæ OK. & EK. & ducuntur Lineæ SK, MN, & PD. cum reliquis, ut supra.

PROBLEMA CLXXIV.

*Datâ Substylari seu Lineæ Horizontali in
Plano tam Inclinato, quàm Declinante,
invenire Lineam Horizontalem, consequenter etiam
Meridianam Locī, ejusque à Substylari Distan-
tiam, item Inclinationem, Declina-
tionem ac Altitudinem
Styli.*

Ex puncto supremo Styli demittatur per-
pendiculum, cujus bolus infrà sit acumina-
tus, punctum in quod cadit bolus, erit Ze-
nith Plani, ex quo si recta ducatur per Cen-
trum Styli, erit hæc Meridiana, huicque
perpendicularis erit Horizontalis, pendulum
verò exhibebit gradus Inclinationis Plani.
Ad Declinationem inveniendam applica Pla-
nisphærium Lineæ Horizontali, ne ut illud
superiùs Probl. 157. applicavimus Muro in
ordine ad Declinationem ipsius exploran-
dum. Hoc ipso autem, quòd jam supponatur
haberi Substylaris, & hîc etiam inventa sit
Meridiana, Distantia illius ab ista per se pa-
ret. Habitâ autem Distantiâ Substylaris à Meri-
dianâ tam Declinatio, quàm Altitudo Styli
eruitur per Logarithmos hoc modo.

Sit Distantia prædicta 18. gr. 44. min.
Compl. Inclinationis Plani 23. gr. 51. min.
S,

S. T. & L. T. Dist. Substyl. à Mer. 1. 953056.

L. S. C. Inclinationis — 960675.

992381.

qui erit L. T. C. Declinationis , nim. 50.
ac proinde ipsa Declinatio 40. gr.

Altitudo verò , seu elevatio Styli supra
Planum sic indaganda est.

L. T. Inclinationis

{ 1035448. &

L. S. C. Declinationis

{ 988425.

S. T.

— 2023873.

1023873.

Residuum erit L. T. Alt. Substylaris 60. gr. 1.
min. Diff. horum graduum, & graduum Elev.
Poli , nim. 12. gr. 1. min. erit Elev. Styli,
seu Poli supra Planum in Linea Substylari ,
ita ut extremitas Styli respiciat Polum Au-
stralem , si gradus inventi excedant gradus
Elev. Poli , uti hic , secus verò respiciat Po-
lum Borealem.

NB. Si Altitudo Styli inveniatur esse omni-
nò nulla supra Planum , tunc tale Planum
erit Verticale Orientale vel Occidentale, aut
Inclinatum Septentrionale. Si verò Altitu-
do Styli deprehendatur 90. graduum , erit
Inclinatum Aequinoctiale.

In Planisphaerio

Quomodo Declinatio inveniat , dixi-
mus

mus suprà ; elevatio Styli verò sic reperitur : Axin pone ad Compl. Declin. 20. gr. filum ad Inclinationem 66. gr. 9. min. in Axi, Æquatorem verò ad locum fili in Limbo, ac denique filum ad Compl. Inclinationis 23. gr. 51. min. & hoc in Axi monstrabit 60. gr. 1. min. tum quærat^{ur} Differentia horum graduum, & Elevationis Poli, ut suprà &c. Denique ut brevitatis studio multa alia huc afferibilia dissimulemus, unum adhuc valde utiliter notandum venit, Lineam nim. Substylarem in quocunque demùm Plano facilimè inveniri eodem penitus modo, quo suprà fol. 124. diximus, posse in Plano Horizontali inveniri Lineam Meridianam.

Nunc autem ultra ea, quæ in I. Parte de Anticipatione vel retardatione horariâ Ortûs ☉ & Occasûs in Partibus Orientalibus & Occidentalibus, de Terræ dimensione, de Decremento Valoris graduum in Parallelis ab Æquatore remotioribus, de Sphæræ Circulis, de Zonis, Climatibus, ac diversis Terræ Habitatoribus, aliisque ad Geographiam pertinentibus copiosè diximus, ad commonstrandam Planisphærij nostri universalitatem, nonnulla adhuc Problemata Geographica hîc annectemus. Sit itaque

PROBLEMA CLXXV.

Invenire gradus Æquatoris competentes Parallelo Loci dati extra Æquatorem.

L. S. C. Alt. Poli v. g. 42. gr. $\left\{ \begin{array}{l} 982551. & \& \\ 923967. \end{array} \right.$
 L. S. Graduum v. g. 10.

S. T. $\times 906518.$
 & residuum erit L. S. Graduum Æquatoris competentium Latitudini Loci dati, nim.
 0. / //

6. 40. 21. qui gradus in milliaria redacti (computando unum gradum Æquatoris pro 15. milliaribus, & 4. minuta pro uno milliari Germ.) dabunt 105. milliaria.

In Planisphærio

Axin pone ad Complem. Alt. Poli 42. gr. filum ad gradus datos v. g. 10. in Linea Axis à Centro, filumque in Limbo dabit gradus Æquatoris Parallelo Loci respondentes, scil. 6. gr. 40. min. Vel :

Sume Circino in Parallelo dato à Linea H 6. gradus v. g. 10. quæsitos, & transfer
 Ff in

450 *Usus & utilitas Planisphærij*

in Æquatorem à Centro Planisphærij, & invenies dictos 6. gr. 40. min. Ex quo patet etiam Dist. 2. Locorum v.g. Viennæ à Schlettstadio celebri Alsatix urbe dictis 10. gr. Longitudinis distitorum esse 105. mill.

PROBLEMA CLXXVI.

*Distantiam 2. Locorum sub eadem
Longitudine, diversâ tamen Latitudine metiri.*

I. Subtrahe gradus Latitudinis minoris à majori, & habebis gradus v.g. 10. qui multiplicati per 15. dant Distantiam in milliaribus Germanicis, cum gradus Latitudinis æquè sint gradus Circuli Maximi, quàm gradus Æquatoris, ad quam proinde Operationem simplicissimam Planisphærio opus non est.

PROBLEMA CLXXVII.

*Distantiam duarum urbium v.g.
Parisiensis & Norimbergensis, tam Longitudine, quàm Latitudine differentium
calculare.*

Juxta Distantias Itinerarias & Observationes in Urania Norica relatas, Lat. Parisien-
sis

per Problemata demonstratur. 451

sis 48. 50. 10. Compl. 41. 9. 50. Latitudo

Norimbergensis 49. 28. 7. Compl. 40. 31. 53.

Longitudo Parisiensis 20. 25. 0. Longitudo

Norimbergensis 28. 30. 0. Differentia Lon.

git. 8. s. o. Compl. Diff. Longit. 81. 55. o.

L. S. Compl. Diff. Longit. 599956635. &

L. T. minoris Compl. Lat. { 99319806.

S. T. x. 99276441. L. T.

Inv. I. 40. 14. 56. Compl. verò 49. 45. 4.

Gradus Inv. I. subtrahantur à gradibus
majoris Complementi alterius Latitudinis,
hoc modo: 0 / //

| | | |
|-----|-----|-----|
| 41. | 9. | 50. |
| 40. | 14. | 56. |

quod est Inv. II. o. 54. 54. Compl.

hujus verò 89. 5. 6.

L. S. C. Inv. II.

L. S. Lat. majoris

{99999446. &
{98808422.

L. S. C. Inv. I.

1.98807868.
— 98816639.

99981229.

reſiduum erit $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ Dist. quæritæ
 \circ 1 11 \circ 1 11
 84. 40. 36. adeoque ipſa Diſt. erit 5. 19. 24.
 ſeu juxta hanc ſupputationem 79 $\frac{1}{4}$ milliar.
 Germ. \circ

In Planisphærio

Poſito uno pede Circini in Parallelo unius
 Latitudinis v. g. Pariſienſis 48. gr. 50. min.
 in Linea Axis, alterum pedem pone ad pun-
 ctum Paralleli alterius Latitudinis Norimber-
 genſis 49. gr. 28. min. in Circulo horario
 Differentiæ Longitudinis 8. gr. 5. min. à Li-
 nea Axis numerandæ, hanc Circini apertu-
 ram transfer ad Lineam Œquatoris à Centro,
 & habebis Diſtantiã quæſitam, nim.
 5. gr. 19. min.

PROBLEMA CLXXVIII.

*Datâ duplici Latitudine duarum
 urbium v. g. Pariſienſis & Norimber-
 genſis, & Diſtantiã earum ab invicem,
 ſupputare Differentiã Longi-
 tudinum earundem.*

Hæc tria addantur

per Problemata demonstratur. 453

| | |
|---------------------------|--------------|
| | 0 1 11 |
| videl. Compl. Lat. Paris. | 41. 9. 50 |
| Compl. Lat. Norimberg. | 40. 31. 53. |
| & gradus Dist. earum | 5. 19. 24. |

| | |
|-------------------------|-----------|
| hæc Summa dividatur per | 87. 1. 7. |
| | 2. |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| & provenient | 43. 30. 34 |
| ex Semisse subtrahantur gr. Dist. | 5. 19. 24. |

| | |
|-----------------------|-------------|
| L. S. Semissis | 38. 11. 10. |
| L. S. ultimi Producti | { 983788. |
| | { 979114. |

| | |
|-----------------------|------------|
| L. S. C. Lat. Norimb. | 1. 962902. |
| | — 981282. |

| | |
|----------------------|------------|
| addito S. T. | 1. 981620. |
| L. S. C. Lat. Paris. | — 981837. |

| | |
|---------------------|------------|
| denuò addito S. T. | 1. 999783. |
| Summa dividatur per | 2. |

| | |
|--|----------|
| dant | 999891½. |
| qui est L. S. Complementi Semissis Differen- | |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| tiæ Longit. quæsitæ nîm. | 0 1 11 |
| adeoque Semissis Diff. Longit erit | 85. 57. 30. |
| cujus duplum dat ipsam Diff. | 4. 2. 30. |
| | 8. 5. |

In Planisphærio

In Linea Æquatoris à Centro sume Distan-
tiam à primusque Loci dati 5. gr. 19. min. &
posito in Linea Axis uno pede Circini ad gra-
dum Latit. v. g. Parisiensis 48. 50. min. alte-
rum hige in Parallelo alterius Latit. Norim-
bergenfis 49. gr. 28. min. & invenies in
Circulis horarijs Differentiam Longitudinis
utriusque quæsitam 8. gr. 5. min.

PROBLEMA CLXXIX.

*Latitudinem alicujus Loci ignotam
ex nota alterius Latitudine, Di-
stantiâ utriusque ac Differentiâ Lon-
gitudinis eorum adinvenire.*

Sit nota Latitudo Norimbengenfis 49. gr.
28. min. 7. sec. cujus Compl. est 40. 31. 53.
Dist. verò illius à Lutetia v. g. Parisiorum
5. 19. 24. & Differentia Longit. utriusque
8. gr. 5. min. Itaque

L. S. C. Diff. Longit. { 99956639.

L. T. C. Lat. Norimberg. { 99319806.

S. T. 2. 99276441.

eritque L. T. Inv. I. 40 14. 56.

L. S. C. Inv. I. 49. 45. 4. { 98820639.

L. S. C. Dist. { 99981229.

1. 98807868.

L. S. Lat. Norimberg. — 98808422.

99999446.

eritque residuum L. S. Inv. II. 89. 5. 6.

cujus Compl. 0. 54. 54. additum

gradibus Inv. I. scil. 40. 14. 56.

dabit Com. Lat. Parisi. 41. 9. 50.

NB. Si autem scitur, talem locum magis esse
Septentrionalem altero, loco additionis de-
bet fieri subtractio.

In Planisphærio

In Æquatore sume Distantiam loci 5. gr.
19. min. & uno pede Circini in Linea Axis
posito ad gradum Latit. v. g. Norimbergen-
sis 49. 28. min. alterum applica ad gradum

F f 4

Dis.

Differentiæ Longitudinis utriusque in Circulis horarijs, & invenies Latitudinem alterius Loci quæsitam 48. gr. 50. min.

Subnectimus nunc Problemata Trigonometrica, ad alias etiam materias applicabilia, & præcedentium resolutionum demonstrativa, de quibus pro meliori terminorum intelligentia

Prænotamus I. *Angulum Rectum* semper esse 90. graduum, *Acutum* verò quadrante minorem, & *Obtusum* ipso majorem.

Not. II. Duas Lineas Angulum Rectum comprehendentes dici *Crura* vel *Latera*, Lineam verò Angulo Recto oppositam vocari *Hypotenusam*.

Not. III. Angulos designari subinde unicâ Literâ ipsis adscriptâ, subinde tribus, ita tamen, ut Litera media semper indicet Angulum, cui est appositâ; sic v. g. fol. 316. in Fig. 4. Angulus superior vel notatur simpliciter Lit. A. vel tribus Literis hoc modo: BAC.

Not. IV. In eâdem figurâ Angulum adjacentem v. g. Cruri BC. vocari Angulum C. Angulum verò A. dici Angulum oppositum Cruri BC.

Not. V. *Hypotenusam* subinde etiam venire nomine *Basis*, in *Obliquangulis* tamen *Basis* propriè dicitur *Linea*, in quam cadit *Perpendicularis*.

Not.

Not. denique VI. pro Planisphærio, Complementum gradûs, quem occupat Axis in Limbo, denotari in eodem Limbo ab Æquatore, Nunc ergò sit

PROBLEMA CLXXX.

*Datâ Hypotenusâ, & Angulo,
invenire Crus Angulo oppositum.*

Sit fol. 316. in Fig. 4. (quæ semper intelligitur, donec alia figura allegetur) Hypotenusâ AC. & Angulus datus A. ut ergò etiam inveniatur Crus BC. Angulo A. oppositum,

L. S. Hypotenusæ AC. &

L. S. Anguli A. addantur,

S. T. verò subtrahatur,

& residuum erit L. S. Cruris BC. quæsitum.

Sic in Problem. 55. Hypotenuia AC. erat

Distantia ☉ ab Æquinoctio proximo, Angu-

lus A. datus verò Declinatio maxima, & Crus

eî oppositum BC. erat Declinatio ☉ quæsi-

ta; & sic de Problem. 60. 86. 89. 90. 116.

146. 158. &c. loquendo.

In Planisphærio

Axin pone ad gradus Hypotenusæ in

Ff 5

Limbo

Limbo, filum ad gradus Anguli in Axi, & filum in Limbo dabit Crus quæsitum. Vel:

Axin pone ad gradus Anguli in Limbo, filum ad Hypotenusam in Linea Axis, & hoc in Limbo notabit Crus quæsitum.

PROBLEMA CLXXXI.

Datò Crure & Hypotenusâ, reperire Angulum Cruri oppositum.

S. T. & L. S. Cruris dati addantur,

L. S. Hypotenusæ subtrahatur,
& dabitur L. S. Anguli quæsitum.

Sic in Problem. 65. Crus datum erat Declinatio ☉ tunc occurrens, Hypotenusa Distantia ☉ ab Æquinoctio proximo, Angulus verò quæsitus Declinatio maxima. Idem est de Problem. 69. 70. 71. 76. 118. 126. 147. 167.

In Planisphærio

Axin applica ad gradus Hypotenusæ in Limbo, filum ad gradus Cruris pariter in Limbo, & hoc in Axi dabit Angulum quæsitum. Vel:

Filum pone ad gradus Cruris in Limbo, Axin autem versa, donec filum in eo abscindat gradus Hypotenusæ, & Axis in Limbo dabit Angulum quæsitum.

PROBLEMA CLXXXII.

*Dato Crure & Angulo ei opposito,
determinare Hypotenusam.*

S. T. & L. S. Cruris dati addantur,
L. S. Anguli Cruri oppositi subtrahatur,
& prodibit L. S. Hypotenusæ.

Sic in Problem. 59. Crus erat Altitudo
H. 6. Angulus illi oppositus Altitudo Poli,
& Hypotenusa Declinatio \odot quæsitæ. I-
dem est de Problem. 88. 104. 117. 148.

In Planisphærio

Axin versa ad Angulum datum, filum
promove ad Crus in Limbo, & filum in Axī
monstrabit Hypotenusam.

PROBLEMA CLXXXIII.

*Dato Crure & Angulo eidem adja-
cente, detegere etiam alterum An-
gulum Cruri oppositum.*

L. S. Anguli adjacentis C. &
L. S. C. Cruris BC, addantur,
S. T. verò subtrahatur,
& quod remanet, erit L. S. C. Anguli A. Cru-
ri oppositi.

Sic in Problem. 66. Crus datum erat De-
clina.

clinatio \odot , Angulus adjacens fuit Angulus
Eclipticæ cum Meridiano, Angulus verò A.
quæſitus Declinatio Maxima.

In Planisphærio

Axin pone ad Angulum adjacentem, filum
verò ad Compl. Cruris in Linea Axis, & fi-
lum in Limbo dabit Compl. Anguli quæſiti.

PROBLEMA CLXXXIV.

*Data Hypotenusa & Crure, inda-
gare alterum Crus.*

S. T. & L. S. Complementi Hypotenusæ
addantur,

L. S. verò Complementi Cruris dati subtra-
hatur,

& reliquum erit L. S. Complementi Cruris
alterius.

Sic in Problem. 114. Hypotenusa est
Complementum Alt. \odot , Crus datum autem
Distantia \odot à Nonagesimo, & Complemen-
tum Altitudinis Nonagesimi est alterum
Crus quæſitum. Idem est de Problem. 159.
168.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. Cruris, filum ad
Compl.

Compl. Hypotenusæ in Limbo, & filum in Axi indicabit Complementum Cruris alterius. Vel:

Filum pone ad Compl. Hypotenusæ in Limbo, Axin versa, donec filum in eo abscindat Complementum Cruris dati, & Axis in Limbo signabit Compl. alterius Cruris.

PROBLEMA CLXXXV.

Dato utroque Crure invenire Hypotenusam.

L. S. C. unius Cruris, &

L. S. C. alterius Cruris addantur,
& subtracto S. T.

residuum dabit Complementum Hypotenusæ.

Sic in Problemate 115. Dist. \odot à Nonagesimo est unum Crus, Complementum Alt. Nonagesimi Crus alterum, & Complementum Alt. \odot est Hypotenusa.

In Planisphærio

Axin pone ad Compl. unius Cruris, filum vero ad Compl. alterius Cruris, & filum in Limbo monstrabit Compl. Hypotenusæ.

PRO-

PROBLEMA CLXXXVI.

*Datis duobus Angulis invenire
quodlibet Crus.*

S. T. & L. S. C. Anguli Cruri quæsito oppositi addantur ,

L. S. verò alterius Anguli subtrahatur,
eritque residuum **L. S. C.** alterius Cruris
quæsiti.

Sic in Problem. 57. Angulus Eclipticæ est
Angulus datus , Compl. Declinationis ma-
ximæ verò alter Angulus , & Complemen-
tum Declinationis datæ Crus quæsitum.
Plura exempla redibunt in seqq.

In Planisphærio

Filum move ad Compl. Anguli oppositi
in Limbo , Axin verò ad Angulum alterum,
& filum in Axi dabit Complementum Cru-
ris.

PROBLEMA CLXXXVII.

*Dato Crure & Angulo eidem op-
posito invenire alterum Angulum.*

S. T. & L. S. C. Anguli dati addantur,

L. S. C.

L. S. C. Cruris oppositi subtrahatur,
& residuum erit L. S. Anguli quæsitum.

Sic in Problem. 119. Complementum Anguli dati est Compl. Declin. maximæ, Crus oppositum est Compl. Declin. datæ, & Angulus alter est Angulus Gradus Culminantis cum Meridiano. Plura exempla occurrunt in Triangulis Obliquangulis & Tangentibus.

In Planisphærio

Axin applica ad Compl. Cruris dati, filum ad Compl. Anguli eidem oppositi, & filum in Axi dabit Angulum quæsitum.

PROBLEMA CLXXXVIII.

Dato uno Crure & Angulo eidem opposito, explorare alterum Crus.

L. T. C. Anguli dati, &
L. T. Cruris dati addantur,
S. T. verò subtrahatur,
& residuum erit L. S. Cruris quæsitum.

Sic in Problemate 41. Complementum Elevationis Poli erat Angulus datus, Declinatio verò Crus oppositum, & Distantia ab H. 6. Crus quæsitum. Idem evenit in Problem. 46. 58.

In

In Planisphærio

Cum operatio per Tangentes in usu Planisphærij difficultatem habeat, ostendemus hic, quomodò per duas Operationes inveniri possit intentum, per meros Logarithmos Sinuum, absque interventu Tangentium, combinando nim. duo Problemata ex jam præmissis. Itaque

I. Per Problema 182. ex Crure & Angulo opposito, quære Hypotenusam.

II Per Problema 184. ex Crure & Hypotenusâ invenies alterum Crus in Problemate præsenri principali quæsitum.

PROBLEMA CLXXXIX.

Datâ Hypotenusâ & Angulo, detegere Crus adjacens Angulo.

L. S. Compl. Anguli dati, &
L. T. Hypotenusæ addantur,
& subtracto S. T. remanebit L. T. Cruris quæsi.

Sic in Problem. 45. Declinatio Maxima erat Angulus datus, Distantia ab Æquin. proximo autem Hypotenusâ, & Ascensio Recta Crus adjacens quæsitum.

*In Planisphærio, & per
meros Logarithmos Sinuum
idem habetur.*

Si I. per Problema 180. ex Hypotenusa &
Angulo, quæatur Crus oppositum, &
II. Per Problema 184. ex Crure & Hypo-
tenusa eruatur alterum Crus, quod erit ad-
jacens quæsitum.

PROBLEMA CXC.

*Dato Crure & Angulo adjacentē
ad invenire Hypotenusam.*

L. S. Compl. Anguli dati, &
L. T. Compl. Cruris dati addantur,
& abjecto S. T. residuum erit L. T. Compl.
Hypotenusæ inquirendæ.

Sic in Probl. 49. Ascensio Recta erat Crus,
Declinatio Maxima Angulus adjacentes, &
Distantia ab Æquin. prox. Hypotenusa.
Idem est de Probl. 120. 130.

*In Planisphærio, & per
Logarithmos Sinuum*

Idem habebis, si I. per Probl. 183. ex Crure

& Ang. adjacente, quæras alterum Angulum.

II. Si per Problema 182. ex Crure & Angulo opposito deducas Hypotenusam, quærat indaganda.

PROBLEMA CXCI.

Datâ Hypotenusâ & Angulo, investigate alterum Angulum.

L. S. Compl. Hypotenusæ, &

L. T. Anguli dati addantur,

S. T. subtrahatur,

& habebitur L. T. Compl. Anguli quæsit.

Sic in Probl. 122. Distantia Gradus Culmin. ab Æquin. est Hypotenusa, Declinatio Maxima verò Angulus, & Angulus Eclipticæ est alter Angulus quæsitus. Sic & in Probl. 124.

In Planisphærio, & per Logarithmos Sinuum.

I. Per Problema 180. ex Hypotenusa & Angulo quære Crus oppositum Angulo.

II. Per Problema 187. ex Crure & Angulo opposito, quære alterum Angulum.

PRO-

PROBLEMA CXCII.

Datis Angulis invenire Hypotenusam.

L. T. Complementi unius Anguli, &
L. T. C. alterius Anguli addantur,
& subtracto S. T. dabitur L. S. Complementi Hypotenuse.

Sic in Problemate 123. Declinatio Max. est unus Angulus, & Angulus Eclipticæ est alter Angulus, Distantia verò ab Æquin, proxima est Hypotenusa.

*In Planisphærio & per
Logarithmos Sinuum.*

- I. Per Problema 186. ex duobus Angulis quære Crus quodcunque; &
- II. Per Probl. 182. ex Crure & Angulo eidem opposito quære Hypotenusam.

PROBLEMA CXCIIL

Datis Cruribus assignare quemlibet Angulum.

S. T. & L. T. unius Cruris addantur,
G g 2 L.

L. S. Cruris adjacentis Angulo quæsito subtrahatur, & residuum erit L. T. Anguli quæ-
siti.

Sic in Probl. 125. Complementum Alt. Nonagesimi est Crus unum, & Distantia ☉ à Nonagesimo est alterum Crus, Angulus vero Eclipticæ cum Verticali est Angulus quæ-
situs. Sic & Probl. 67, 68.

In Planisphærio & per Logarithmos Sinuum.

- I. Per Probl. 185. ex utroque Crure quære Hypotenusam, &
- II. Per Problema 181. ex Crure & Hypotenusa quære Angulum Cruri opposi-
tum.

PROBLEMA CXCIV.

*Data Hypotenusa & Crure erue-
re Angulum comprehensum.*

L. T. Compl. Hypotenusæ, &
L. T. Cruris dati addantur,
S. T. subtrahatur,
& remanebit L. S. Complementi Anguli
quæsi.

Sic

Sic in Probl. 126. Distantia \odot à Nona-
gesimo est Crus. Complementum autem Alt.
 \odot est Hypotenusa, & Angulus Eclipticæ
cum Verticali est Angulus quæsitus, & in
Probl. 78. 131.

In Planisphærio & per Logarithmos Sinuum

Idem inuenies, si I. per Probl. 184. ex
Hypotenusa & Crure quæras alterum Crus,
&

II. Per Probl. 181. ex Crure & Hypote-
nusa inquiras Angulum oppositum Cruri.

PROBLEMA CXCV.

*Dato Crure & Angulo ei adjacen-
te, inuenire alterum Crus.*

L. S. Cruris dari, &

L. T. Anguli dati addantur,

& abjecto S. T. restabit L. T. Cruris alte-
rius.

Sic in Probl. 56. Ascensio Recta est Crus
datum, Declinatio verò Maxima est Angu-
lus datus, ac Declinatio \odot alterum Crus.

In Planisphaerio, & per Logarithmos Sinuum.

- I. Per Problema 183. ex Crure & Angulo
adjacente quære alterum Angulum, &
II. Per Probl. 186. ex Angulis quære al-
terum Crus.

Nunc de Triangulis Sphaericis Obliquan-
gulis agendum, ubi denud.

Not. I. fol. 316. in Fig. 6. & 8. Literæ
A. B. C. denotant tres Angulos Obliquan-
guli, ita ut Angulus B. semper sit ille, qui est
notus, Angulus A. verò semper sit ille, ex
quo ducenda est Perpendicularis.

Not. II. Perpendicularem semper cadere
ex A. versus Basin BC. subinde intra Trian-
gulum, subinde extra.

Not. III. Punctum, in quod cadit Perpen-
dicularis, insigniri Lit. D.

Not. IV. Si Anguli B. & C. sunt acuti,
seu minores Recto, Perpendicularis semper
cadit intra Triangulum, ut patet ex Fig. 6.
si verò Angulus C. est obtusus, cadet extra
Triangulum ultra C. in D. ut in Fig. 8.
Quod si denique Angulus B. est obtusus, seu
major 90. gr. tunc Perpendicularis cadet in
alterum Latus ultra B.

Not. V.

Not. V. Latus AB. semper supponitur esse notum, sicque Latus AB. erit Hypotenusa, ex qua una cum Angulo B. Obliquangulum resolvitur in duo Rectangula. adeoque Latus AC. erit Hypotenusa alterius Rectanguli, & BD. Crus unū, CD. verò Crus alterum.

Notandum denique VI. Si Angulus vel Latus aliquod est majus Quadrante, tunc ut habeantur eorum Logarithmi, debet Complementum sumi ex 180. Jam igitur sic

PROBLEMA CXCVI.

Datis duobus Lateribus, & Angulo uni eorum opposito, detegere Angulum oppositum alteri.

Sic in Fig. 6. vel 8. v. g. notus Angulus B. & Latus AC. illi oppositum, ac insuper Latus BC. sitque inquirendus Angulus A. oppositus Lateri BC. Itaque

L. S. Anguli B. &

L. S. Lateris BC. oppositi Angulo quæsito, addantur,

L. S. verò Lateris AC. Angulo B. dato oppositi subtrahatur, & residuum dabit L. S. Anguli A. quæsiti.

Sic in Probl. 110. Angulus B. ponitur esse Distantia à Meridie, Latus AC. verò ei op-

Positum eſſe Complementum Alt. \odot , & La-
tus BC. oppoſitum Angulo Azimuthali quæ-
ſito, ac denique Angulus A, quæſitus erit Azi-
muth à Septentrione. Idem eſt de Probl.
82. 83. 84. 85. 107. 135. & 149.

In Planisphaerio

Axin pone ad gradus Lateris BC. ſilum ad
Angulum B. in Axii à Centro, Axii revolve
ad gradus Lateris AC, & ſilum in Axii dabit
Angulum A,

PROBLEMA CXCVII.

*Datis duobus Angulis, & Latere
uni eorum oppoſito, indagare Latus
oppoſitum alteri.*

Sint noti duo Anguli A. & B. unà cum La-
tere BC. oppoſito Angulo A. & ſit invenien-
dum Latus AC. oppoſitum Angulo B. Itaque

L. S. Lateris dati BC. &

L. S. Anguli B. adjacentis dicto Lateri dato,
addantur,

L. S. verò Anguli A. Lateri dato oppoſiti
ſubtrahatur, & reſiduum erit L. S. Lateris
AC, quæſiti.

Sic

Sic in Probl 94. Latus BC. datum supponitur esse Complementum Declinationis, Angulus verò B. Distantia à Meridie, & Angulus A. Azimuth à Septentrione, & Complementum Alt. \odot . quæsitum Latus AC. Eadem est ratio de Probl. 61. 74. 139. & 144.

In Planisphærio

Axin pone ad notum Latus BC, filum autem ad Angulum B. in Axig; tum Axin revolve ad Angulum A. & filum in Axig dabit Latus AC. quæsitum.

PROBLEMA CXCVIII.

Datis duobus Lateribus & Angulo comprehenso invenire Latus tertium.

Sint data Latera AB. & BC. & Angulus B. & quærendum Latus AC.

I. Itaque ex Angulo B. & Hypotenusa AB. per Problema 189. quæratue Crus BD. pro Invento I.

II. Differentia BD. & BC. si Perpendicularis cadit intra Triangulum, erit Inventum II. Si verò cadat extra Triangulum, tunc

ipsa Summa BD. & BC. erit Inv. II. seu Crus CD. si scilicet B. vel C. sint Anguli ob-
tusi.

III. Denique L. S. C. Lat. AB.

L. S. C. Inv. II. seu CD. addantur,

L. S. C. Inv. I. subtr. remanebit L. S. C.
Lateris AC.

Sic in Problem. 95. Angulus B. est Di-
stantia ☉ à Meridie, Latus BC. verò Com. I.
Declinationis, & Latus AB. Compl. Elev.
Poli. Idem contingit in Probl. 77. Opera-
tione 3. item 64. 81. 96. & 141.

In Planisphaerio

Inv. I. & II. queratur ex supradictis;
tum filum pone infra Horizontem ad Crus
CD. quod est Inv. II. in Aequatore ab ex-
tremitate, & filum in Limbo dabit Latus AC.
quaesitum. Vel :

Axin constitue ad Verticem 90. filum ap-
plica ad gradum Complementi Lateris BC.
granum verò fige in Circulo horario Anguli
B. à Limbo sinistro, & Axe sinistrorsum ad
Compl. alterius Lateris AB. revolutum, gra-
num in Parallelo dabit Compl. Lateris AC.
quaesiti.

PRO-

PROBLEMA CXCIX.

Datis duobus Lateribus, & Angulo comprehenso, invenire alium quemlibet Angulum.

Sint duo Latera AB. & BC. Angulus verò comprehensus sit B. & inde quærendus Angulus C. nam Latus AB. hic semper debet esse oppositum Angulo quæsito. Itaque

I. Inv. I. seu Latus BD. quæratursic in Probl. præcedenti.

II. Differentia BD. & BC. vel Summa eorum, si Angulus B. aut C. sunt obtusi, erit Inv. II. seu Latus CD.

III. L. S. BD. &

L. T. B. addantur,

L. S. Lat. CD. subtrahatur,

& residuum erit L. T. Anguli C.

Ubi notandum est, si Angulus C. est obtusus, subtractionem fieri debere ex 180. Sic in Probl. 111. Compl. Declin. ☉ & Elevatio Poli sunt duo Latera, & Distantia ☉ à Meridie est Angulus comprehensus, Azimuth verò est Angulus oppositus Complemento Declinationis quæsitus. Idem est de Probl. 138. & 151.

In Planisphærio

Axin pone ad Verticem 90. Filum ad Compl. Lateris Angulo quæsito oppositi in Limbo, granum autem fige in Circulo horario Anguli à Limbo sinistro; tum Axin revolve sinistrorsum ad Compl. alterius Lateris, & granum in Circulo horario à Limbo dextro dabit Angulum C. quæsitum.

PROBLEMA CC.

Datis duobus Lateribus & Angulo uni eorum opposito invenire tertium Latus.

Duo Latera sint AB. & AC. Angulus oppositus Lateri AC. sit B. & exinde indagandum Latus BC. Itaque

Inv. I. seu Crus BD. quæratut ut supra. Deinde

L. S. C. Lat. BD. Inv. I. & L. S. C. Lateris AC. addantur,

L. S. verò Compl. Lateris AB. subtrahatur, & dabitur L. S. Cruris DC. Summa itaque DC. & BD. vel si Angulus D. aut C. est obtusus, Differentia utriusque erit Latus BC. quæsitum.

Sic

Sic in Probl. 62. Latus AB, est Compl. Elev. Poli, & Latus AC. Compl. Alt. \odot , Angulus verò B. oppositus Lateri AC. est Dist. \odot à Mer. ac denique Latus BC. quæsitum Complem. Declinationis. Eadem est ratio de Probl. 72. 73. 97. 140. & 143. 145. 179.

In Planisphærio

Inv. I. quærat ut suprâ. Filum dein pone infra Horizontem ad Compl. Lateris AC. in Limbo, hocque in Æquatore dabit Latus DC. ab extremitate, reliqua verò fiant ut suprâ. Vel :

Axin pone ad Compl. Lateris adjacentis Angulo dato sinistrorsum, filum verò ad Compl. alterius Lateris Angulo oppositi in Limbo, & filum in Circulo horario Anguli dati à Limbo dextro indicabit Parallelum Complementi tertij Lateris.

PROBLEMA CCI.

*Datis duobus Angulis, & Latere
uni eorum opposito, invenire Latus
interjacens Angulis.*

Sint duo Anguli dati B. & C. Latus Angulo C. oppositum sit AB, Latus verò interjacens BC. Iam

L. S. ¶

L. S. C. Anguli B. &
 L. T. Lateris AB. addantur ,
 S. T. verò subtrahatur ,
 & remanebit L. T. BD. Inveni L. Rursus
 L. T. Anguli B. &
 L. T. BD. addantur ,
 L. T. verò Anguli C. subtrahatur ,
 & residuum erit L. S. CD. seu Inventum II.
 Summa igitur graduum BD. & BC. vel si C.
 aut B. est Angulus obtusus, Differentia eo-
 rundem erit Latus BC. quæsitum.
 Sic in Probl. 75. Distantia ☉ à Mer. est
 Angulus C. & Azimuth à Septentrione An-
 gulus B. Latus verò AB. Angulo C. opposi-
 tum est Compl. Alt. ☉ , ac denique Latus
 BC. quæsitum est Compl. Alt. Poli.

In Planisphaerio

Axin dispone ad Zenith 90. filum verò ad
 Compl. Lateris dati in Limbo, & granum fi-
 ge in Circulo horario Anguli B. cum Axin
 versa sinistrorsum, donec granum à Limbo
 dextro attingat Circulum horarium Anguli
 C. & Axis in Limbo denotabit Latus BC.
 quæsitum.

PRO-

PROBLEMA CCII.

*Datis duobus Angulis & Latere
interjacente invenire quolibet
alterum Latus.*

Sint Anguli dati A. & B. & Latus AB.
quærendum verò Latus AC. hic enim Per-
pendicularis semper ducitur ex Angulo La-
teri quæsito adjacente. Igitur

L. S. C. Lateris dati AB. &

L. T. Anguli B. Lateri quæsito oppositi ad-
dantur,

S. T. verò subtrahatur,

& residuum erit L. T. Inventi I. cujus Com-
plementum est Angulus BAD. Differentia
autem hujus Anguli & alterius Anguli BAC.
vel, si Angulus B. aut C. est obtusus, eorum
Summa erit Inv. II. seu Angulus CAD.
Jam igitur

L. S. Inv. I. seu Complement. Anguli BAD. &

L. T. Lateris dati AB. addantur,

L. S. autem Complementi Inventi II. seu
Anguli CAD. subtrahatur, & remanebit L. T.
Lateris AC. quæsiti.

Sic in Probl. 98. Distantia ☉ à Mer. est
Angulus B. Azimuth à Septentrione verò
Angulus A. & Latus interjacens est Compl.
Elev.

Elev. Poli, ac denique Latus AC. quæsitum est Compl. Alt. ☉ quæsitæ. Idem est de Probl. 63. 142.

In Planisphærio

Axin pone ad Angulum B. filum ad Latus interjacens in Linea Axis, & Axe ad locum fili revoluto, filum deprime infra Horizontem ad Compl. Anguli B. filumque in Æquatore ab extremitate dabit Inv. I. hujus Complementum adde vel subtrahe, juxta dicta, Angulo B. & erit Inventum II. Præterea filum deprime infra Horizontem ad gradus Inventi II. in Æquatore à Centro, hunc verò applica ad locum fili, filum verò pone ad punctum, ubi antea erat Axis supra Horizontem, quod propterea antecederet notandum erit, filumque in Linea Axis dabit Compl. Alt. ☉ quæsitæ.

PROBLEMA CCIII.

Datis duobus Angulis & Latere interjacente, invenire tertium Angulum.

Sint Anguli dati A. & B. cum Latere AB. inde verò quærendus Angulus C.

L. S.

L. S. Compl. Lateris dati AB. &
 L. T. Anguli B. addantur,
 subtracto S. T. dabitur L. T. Inventi I. cujus
 Complementum dabit Angulum BAD. Dif-
 ferentia autem BAD. & BAC. vel si Angulus
 C. aut B. est obtusus, eorum Summa erit
 Inv. II. seu Angulus CAD. Ulterius

L. S. Inv. II. &
 L. S. Compl. Anguli B. addantur,
 L. S. verò Compl. Inventi I. subtrahatur,
 & remanebit L. S. Compl. Anguli C. quæ-
 siti.

Hujus Problematis in præcedentibus nul-
 lum occurrit exemplum, sed quivis ipsemet
 sibi formare poterit.

In Planisphærio

Inventum I. & II. quæritur, ut in Probl.
 præcedenti. Filum deinde pone ad Inv. II.
 infra Horizontem in Æquatore à Centro, si-
 lûmque in Limbo dabit Compl. Anguli quæ-
 siti.

PROBLEMA CCIV.

*Datis duobus Lateribus, & An-
 gulo uni eorum opposito, eruere
 Angulum comprehensum.*

Sint data Latera AB. & AC, unâ cum An-
 gulo B. opposito Lateri AC. Itaque

H h

L. S.

L. S. Compl. Lateris AB. &
 L. T. Anguli B. addantur,
 subtracto S. T. remanebit L. T. Inveni L.
 cujus Compl. est Angulus BAD. Rursus
 L. T. Lateris AB. &
 L. S. Inv. I. addantur,
 L. T. verò Lateris AC. subtrahatur,
 & residuum erit L. S. Compl. Anguli CAD.
 quæsit.

Summa graduum Inv. II. & Compl. Inv. I.
 vel, si Angulus B. aut C. est obtusus, Diffe-
 rentia eorum erit Angulus quæsitus.

Sic in Probl. 112. Compl. Elev. Poli est
 Latus AB. & Compl. Alt. ☉ est Latus AC.
 Angulus autem ei oppositus est Distantia ☉
 à Meridie. Idem est in Probl. 103. 137. & 152.

In Planisphærio

Axin pone ad Latus AB. filum ad Latus
 AC. oppositum Angulo dato in Limbo, &
 granum fige in Circulo horario Anguli dati à
 Limbo dextro, Axin verò verte ad 90. gra-
 nūmq̃ue dabit Circulum horarium Anguli
 quæsitū à Limbo sinistro.

PROBLEMA CCV.

*Datis duobus Angulis, & Latere
uni eorum opposito invenire Angu-
lum tertium.*

Sint dati duo Anguli B. & C. atque etiam
Latus AB. oppositum v. g. Angulo B. Jam
L. S. Compl. Lateris dati AB. &
L. T. Anguli B. addantur,
S. T. subtrahatur,
& remanebit L. T. Inveni I. cujus Compl.
est Angulus BAD. Similiter
L. S. Compl. Anguli C. &
L. S. Compl. Inv. I. addantur,
L. S. verò Compl. Anguli B. subtrahatur,
& residuum erit L. S. Anguli CAD. seu In-
ventum II.

Summa Inv. II. & Compl. Inveni I.
vel, si alteruter Angulus est obtusus, eorum
Differentia erit Angulus A. quæsitus.

In Planisphærio

Axin colloca ad Latus AB. filum verò ad
Angulum B. in Axi; Axin dein repone ad
locum fili in Limbo, filum autem deprime
infra Horizontem ad Compl. Anguli B. in
Hh 2 Lim,

Limbo, & filum in \AA equatore ab extremitate dabit Inv. I. Denique filum pone ad Compl. Inventi I. pariter infra Horizontem in Limbo, & filum in \AA equatore à Centro indicabit Angulum CAD, seu Inventum II, & reliqua fiant ut suprà.

PROBLEMA CCVI.

Datis tribus Lateribus invenire quemlibet Angulum.

Addantur omnia tria Latera, & Summa dividatur per 2. ex Semisse subtrahatur Latus oppositum Angulo quæsito, ut habeatur Differentia Basis. Dein

L. S. Semissis &

L. S. Differentiæ Basis addantur,

L. S. autem unius Lateris adjacentis Angulo quæsito subtrahatur, & à residuo (præfixa unitate, seu addito S. T.) subtrahatur

L. S. alterius Lateris, & habebitur Logarithmus, qui rursus addito prius S. T. divisus per 2. dat L. S. cujus Complementi gradus duplicati dant Angulum quæsitum.

NB. Locò subtractionis Logarithmi cujuslibet Lateris potest fieri additio Complementi Arithmetici, ut jam sæpius dictum est.

Sic in Probl. 106. Distantia \odot à Mer. est
An-

Angulus quæsitus, tria Latera verò sunt Compl. Alt. ☉, Complementum Elev. Poli, & Complementum Declinationis, seu Distantia ☉ à Polo Arctico, quæ in Æstate semper coincidit cum Compl. Declinationis, in Hyeme verò ipsa Declinatio ☉ addenda est ad 90. Logarithmus tamen talis Distantiæ semper erit Complementum Declinationis. Idipsum observandum est in Probl. 79. 80. & 108. 136.

In Planisphærio

Filum applica ad Compl. Lateris Angulo quæsito oppositi in Limbo, Axin verò ad Compl. alterius Lateris adjacentis minoris, & filum in Parallelo Complementi Lateris adjacentis majoris dabit Angulum in Circulo horario à Limbo dextro.

Absolutis jam Rect- & Obliquangulis sphaericis, pro Complemento hujus Opusculi paucis adhuc de Triangulis Rectilineis agendum, atque unà, quomodo Planisphærium nostrum tam Alti- quam Planimetriæ quoque deserviat, ostendendum erit.

Ubi tamen præviè observandum venit I. id, quod suprà fol. 174. de divisione Regulæ in 100. vel 1000. partes diximus, etiam de Axi, intelligendum esse, ita ut dimidia pars

Axis v. g. Borealis , modo, quo diximus fol. 165, in suos 90. gradus, altera Medietas verò Australis ejusdem Axis pariter in 100. partes , ob maximam commoditatem ac facilitatem, quæ ex dicendis in usu Planisphærij taliter divisi relucebit, utilissimè dividatur,

Observandum II. dictas 100. v. g. partes posse sumi pro 1000. 10000. vel etiam 100000 partibus, ita ut 10. ejusmodi partes tali casu æquivalent 100. vel 1000. partibus, & sic de reliquis. Vel cui hoc minus placet, deberet numerum partium Cruris aut Hypotenusæ tot cyphris seu figuris ad dexteram relictis decurtare, quot cyphris excederet numerum Centenarium, uti constat ex dictis fol. 166. de Tabulâ Sinuum respectu Scalæ 1000. partium. Vel denique deberet excessus ille ultra centum redigi in fractiones, ita ut si numerus partium superet numerum centenarium unâ figurâ, hæc scribi debeat supra Lineolam transversam, & infra eandem 10. si duabus figuris excedat, infra poni debeant 100. hoc modo : $\frac{6}{100}$ vel $\frac{26}{100}$. &c.

Observandum III. per dictam divisionem Regulæ, si partibus istius in Horizonte conjungantur gradus Axis Borealis, ad oculum patere, quot gradus competant cuilibet Sinui, vel vicissim; sic enim videbis, quod 42. gra-

gradibus competat Sinus 66 $\frac{7}{8}$ partium, & sic de alijs.

Observandum IV. per dictam divisionem Semi-Axis Australis in 100. vel 1000. partes, dato v. g. Crure & Angulo, hoc ipso etiam haberi Hypotenusam, vel notâ Hypotenusâ & Crure, etiam indicari Angulum, & universim datis duobus quibuscunque, semper exhiberi in Planisphærio etiam tertium. Quia verò ista ex mox dicendis per se patebunt, hic pluribus declarare supersedeo.

Observandum V. in omni Triangulo Rectilineo tres ejusdem Angulos æquivalere duobus Rectis. Hinc autem necessariò etiam consequitur

Observandum VI. & Ultimum, nim. in Triangulo Rectangulo unum Angulum acutum semper esse Complementum alterius: in Obliquangulis verò Rectilineis, Summâ duorum Angulorum cognitorum à 180. subtractâ, residuum hoc ipso etiam detegere tertium Angulum. De his itaque sit

PROBLEMA CCVII.

Datis Angulis alicujus Trianguli Rectanguli, & Crure utrolibet, assignare alterum Crus.

Sit juxta Fig. 3. fol. 316. in Triangulo dimensionis v. g. Turris Landishutanæ no-

tum Crus BC, seu distantia à Turre 500. pedum, & Angulus à Dioptra abſciſſus 39.

30. // 30. indèque quærendum ſit Crus AB, altitudinis Turris. Itaque

L. Numeri Cruris BC. { 269897. &
L. T. Anguli C. Cruris adjacent. { 991803.

S. T. x. 261700.

eritque reſiduum L. Numeri 414. pedum, quot pedes nim. dictæ Turris altitudo communiter creditur continere.

In Planisphaerio

Partem Axis Australem, diviſam in 100. partes, applica ad gradus dicti Anguli 39. gr. 30. min. in Limbo, ac Regulam ſimiliter diviſam promove, donec in ea numerus Cruris 500. (ſeu decurtatè 50.) attingat Lineam Axis; tum Axin revolve ad 90. & Regula in Axi monſtrabit altitudinem Turris quaſitam, nim. 41 $\frac{4}{10}$ ſeu 414. pedum.

PRO-

PROBLEMA CCVIII.

*Datis Angulo & Crure ei opposito,
invenire Hypotenusam.*

Sit exploranda Longitudo scalæ certæ altitudini v. g. 30. pedum (quam in priori Fig. refert Crus AB.) applicandæ, & Angulus, quem facit Radius Visualis observantis dictam altitudinem, sit 60. gr. Iam

S. T. & L. Numeri Cruris dati 1.147712.

L. S. dicti Anguli oppositi — 993753.

153959

qui est L. Numeri pedum scalæ, seu Hypotenusæ quæsitæ, nim. 34. ped. $7\frac{1}{4}$ digit. proximè.

In Planisphærio

Partem Axis Australem in 100. vel 1000. divisam obverte puncto Verticali 90. Regulam eleva, donec in Axi abscindat numerum Cruris 30. & Axe ad gradum Anguli oppositi 60. revoluto, Regula in Linea Axis indicabit numerum scalæ, seu Hypotenusæ, nim. 34 $\frac{1}{2}$. pedum proximè.

PROBLEMA CCIX.

Data Hypotenusa & Angulo invenerire Crus Angulo oppositum.

Sit in superficie Terræ nota Hypotenusa

AC. 500. pedum, & Angulus C. $53. 7. 53.$
 sit autem inveniendum Crus AB. Angulo C.
 oppositum, quod aliàs propter ædificium vel
 lacum v. g. interjacentem inter A. & B. se-
 cundum se inaccessible est, & mensurari non
 potest. Itaque

L. Numeri Hypotenusæ $\{ 269897 \text{ \&}$
 L. S. Ang. oppositi Cruri quæsito $\{ 990309.$

S. T. $\times 260206.$
 eritque residuum L. Numeri Cruris AB. 400.
 pedum.

In Planisphaerio

Axin Australem pone ad Angulum $53. \text{ gr.}$
 $8. \text{ min.}$ in Limbo; Regulam verò ad Nume-
 rum Hypotenusæ 50. in Axi, & Axe ad 90.
 converso, Regula in Axi designabit Nume-
 rum Cruris AB. 40. pedum.

PRO-

PROBLEMA CCX.

Datis Cruribus invenire quemlibet Angulum.

Sit Crus AB. altitudo Domus 50. pedum, Crus alterum verò BC. sit umbra inde à Sole projecta 120. proximè seu 119 $\frac{1}{2}$. pedum; inquiritur ergò Angulus C. seu Altitudo Solis Geometricè, etiam absque ope Quadrantis, ut ex Tabula Altitudinum Solis supra Horizontem, inferius ponenda, erui etiam possit Hora Diei. Itaque

| | |
|------------------------------|-----------|
| S. T. & L. Numeri Cruris AB. | 1.169897. |
| L. Numeri Cruris BC, | — 207854. |

962043.

eritque residuum L. T. Anguli quæsitæ, seu Altitudinis ☉ nim. 22. gr. 39. min. qui gradus, si cum dicta Tabula Altitudinum ☉ conferantur, ostendent, Sole in 10. gradu V. vel 20. xx . tunc existente, fore H. 8. Mat. vel 4. vesp. Idem haberi potest ex propria hominis umbra ac altitudine, quæ reputatur esse $6\frac{1}{2}$ suimet pedis, sive magnæ, sive parvæ staturæ sit, si operatio fiat, ut prius: præstabit tamen dictos $6\frac{1}{2}$ pedes redigere in 78. digitos, ut operatio tantò exactiùs institui possit.

In

In Planisphærio

Partem Axis Australem dispone ad verticem 90. Regulam verò ad Numerum Cruris AB. 50. seu decurtatè 5. in Axis (sumendo, nim. hic 10. pro 100.) tunc Axin versa, donec is tangat numerum alterius Cruris BC. nim. 120 (vel abbreviatè 12.) in Regula, & Axis in Limbo dabit Angulam C. quæsitum, videl. 22. gr. 39. min.

PROBLEMA CCXI.

*Data Hypotenusâ & uno Crure,
pervestigare Angulum oppositum,*

In exemplo. Funirepus quispiam pro suo deorsum in terram descensu subtrahit funem 72. pedum, unâ sui parte inferius firmatum, alterâ verò 40 $\frac{1}{2}$. pedibus elevatum, ut adeò funis in sæpè dictâ nostrâ Fig. 3. referat Hypotenusam AC. altitudo autem funis à terra sit Crus datum AB. cujus proinde Angulus oppositus C. absque omni Quadrante, vel alio simili Instrumêto inquiritur. Jam sic
S. T.

S. T. & L. Numeri Cruris AB. 1, 166539.
L. Numeri Hypotenusæ — 185733.

980806.

qui erit L. S. Anguli C. seu altitudinis funis,
nim 40. gr.

In Planisphærio

Axe Australi ad 20 disposito, Regulam
pone ad numerum Cruris AB. $46\frac{1}{4}$. in Axi,
tum verò Axin versa, donec numerus Hypo-
tenusæ 72. in eodem Axi attingat Regulam,
& Axis in Limbo dabit Angulum 40. gr.
quæsitum.

NB. Cùm juxta observandum ultimum
fol. 487. Angulus inventus sit Complementū
alterius Anguli acuti A. evidens est, istum
fore 50. grad. unde haud difficile erit, per
Probl. 209. ex Hypotenusa & dicto Angulo
quærere etiam alterum Crus illi oppositum
BC. seu distantiam inferioris extremitatis
dicti funis à Muro.

PROBLEMA CCXII.

*Datis Angulis & Crure alterutro
determinare Hypotenusam.*

Sit in priori exemplo notum Crus AB. seu altitudo funis $46\frac{1}{4}$. ped. & Angulus illi oppositus C. 40. gr. ut ergo etiam sciatur longitudo chordæ subtensæ AC.

S. T. & L. Numeri Cruris dati 1. 166539.

L. S. Anguli C. — 980806.

185733.

residuum dabit L. Numeri Hypotenusæ AC. seu funis, nim. 72. pedum.

In Planisphærio

Axe Australi ad punctum 90. converso, Regulam promove, usque dum attingat numerum Cruris dati $46\frac{1}{4}$ in Axi; tum Axin pone ad Angulum datum 40. in Limbo, & Regula in Axi monstrabit Hypotenusam AC. seu Longitudinem chordæ 72.

NB. Poterit etiam per Probl. 210. ex Cruribus inveniri quilibet Angulus, & exinde vi præsentis Problematis quæri Hypotenusæ.

PRO.

PROBLEMA CCXIII.

Datis duobus Angulis & Basi, indagare Perpendicularem.

Sit in Fig. 7. metienda Perpendicularis AD. v. g. Turris B. Vis Monachij imprimis ex Basi Horizontali. Sit autem Angulus B. minor 32. gr. 18. min. Angulus C. major 58. consequenter Differentia utriusque 25. gr. 42. min. similiter Basis BC. 316. pedum. Itaque

| | |
|------------------------|-----------|
| L.S. Anguli minoris B. | 972782. & |
| L. S. Numeri Basis BC. | 249968. |

1. 222750.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| L. S. Differ. Angulorum | — 963714. |
| qui est L. Num. Hypot. AC. | 259036. n. 390. p. |
| L. S. Anguli majoris C. | 992842. |

S. T. 251878.

& residuum erit L. Perpendicularis AD. 3302 cui si addantur 6. pedes à Terra usque ad oculum observantis intercepti, provenient 336. pedes pro Altitudine Turris Divæ Virginis Monachij.

Quòd si observatio Turris fiat ex Basi Verticali, operatio est eadem cum priore, nisi quòd loco L. S. Anguli minoris, sumendus sit L. S. Complementi ejusdem. Pro exemplo pono

496 *Usus & utilitas Planisphærij*

pono observationem dictæ Turris, in Monasterio nostro per duas stationes, unam nim. è fenestra superiori, & alteram in pavimento inferiore factam, ubi Angulus major erat 32. gr. 45. min. minor verò 32. gr. 7. min. & consequenter eorum Differentia 2. gr. 38. min. Basis denique Verticalis erat 31. pedum & 5. digitorum proximè. Itaque
 L. S. Compl. Anguli minoris { 992786. &
 L. Numeri Basis { 149700.

1. 142486.

L. S. Differentiæ utriusq; Anguli — 866223.

qui est L. Num. Hypotenusæ 579. { 276263.
 huic addatur L. S. Anguli majoris { 975587.

S. T. x. 251850.
 & residuum dat L. Numeri Altitudinis quæsitæ, nim. 330. quibus si addantur dicti 6. pedes à terra usque ad oculum observantis, prodibunt denuò 336. pedes pro tota Altitudine Turris priùs memoratæ.

In Planisphærio

Pro hoc exemplo Basis Verticalis Axipone ad Compl. Ang. min. 57. gr. 53. min. Regulam verò ad Numerum Basis in Axipone & Axe ad Differentiam Angulorum 2. gr. 38. min.

38. min. revoluto, Regula in Axi dabit numerum Hypotenusæ 57, $\frac{2}{5}$. Tum Axin statu ad Angulum Majorem 34. gr. 45. min. Regulam autem ad Numerum Hypotenusæ 57, $\frac{2}{5}$. in Axi, hocque ad 90. revoluto, Regula in eodem Axi monstrabit 330. quibus si addantur 6. pedes, ut supra, habetur tota altitudo Turris.

Pro primo exemplo verò, & Basi Horizontali, Axis disponatur, ad Angulum Minorem, qui fuit 32. gr. 18. min. reliqua autem omnia fiant, ut prius.

PROBLEMA Ultimum.

Datis duobus Angulis, & uno Latere, determinare quodlibet aliud.

In exemplo detur in Fig. 5. Angulus B. 46. gr. & Latus illi oppositum AC. 126. pedum, detur autem insuper Angulus C. 55. gr. & sit indagandum Latus huic oppositum AB. quod ponitur esse inaccessible. Igitur

| | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| L. Numeri Lateris dati AC. | } | 210037 & |
| L.S. Ang. C. Lateri quæsi. oppositi | | 991336. |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| | 1. 201373. |
| L.S. Ang. B. Lateri dato oppositi | — 985693. |

215680.

residuum erit L. Numeri Lateris AB. inaccessibleis quæsi, nim. 143 $\frac{1}{2}$ ped. proximè.

In Planiſphærio

Per Problema 195. ex Latere & Angulo adjacente quære Crus huic oppoſitum; tum verò per Problema 208. quære Hypotenūſam, ſeu Latus AB.

Cognitis taliter Triangulis Rectilineis, poſſent locò priorum innumera alia formari exempla quoad dimensiones tam in Plano, quàm in Altum, & in Profundum.

Similiter haud difficile erit Areas quaſcunque tam quadrilateras. quàm Triangulares meſſiri. Nam quoad Triangula multiplicetur Perpendicularis cum ſemi-Baſi, vel ſemi-Perpendicularis cum Baſi, & habebitur contentum Areae talis Trianguli. Quoad Areas verò Quadrangulares, ſi hujusmodi Area eſt perfectè quadrata, Latus quodcunque ducendum erit in ſe ipſum; ſi eſt quadrangulum rectangulum, ſed oblongum, Latus brevius cum longiore multiplicari debet; ſi verò eſt figura quæcunque irregularis in Triangula reducenda erit, & operandum ut priùs.

Denique remanent adhuc innumera, ope Planiſphærij noſtri reſolvenda, quæ tamen, ne ipſa multitudo tædium pariat, conſultò abrupimus, plura forrè daturi, ſi hæc non diſplicuiſſe videbimus. Nunc Tabellas in præcedentibus promiſſas, in multis utiles, vel etiam neceſſarias, unà cum modo eas conſtruendi, in medium proferamus. *Tab. I.*

*Tabulâ I. Exhibens valorem Graduum Paralleli
cujuscunque Latitudinis.*

| Gr. | M. | S. | Gr. | M. | S. | Gr. | M. | S. |
|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 1 | 59. | 59 | 31 | 51. | 25 | 61 | 29. | 5 |
| 2 | 59. | 58 | 32 | 50. | 53 | 62 | 28. | 10 |
| 3 | 59. | 55 | 33 | 50. | 19 | 63 | 27. | 14 |
| 4 | 59. | 51 | 34 | 49. | 44 | 64 | 26. | 19 |
| 5 | 59. | 46 | 35 | 49. | 9 | 65 | 25. | 21 |
| 6 | 59. | 40 | 36 | 48. | 32 | 66 | 24. | 24 |
| 7 | 59. | 33 | 37 | 47. | 55 | 67 | 23. | 26 |
| 8 | 59. | 24 | 38 | 47. | 16 | 68 | 22. | 28 |
| 9 | 59. | 15 | 39 | 46. | 37 | 69 | 21. | 30 |
| 10 | 59. | 5 | 40 | 45. | 57 | 70 | 20. | 31 |
| 11 | 58. | 53 | 41 | 45. | 16 | 71 | 19. | 32 |
| 12 | 58. | 41 | 42 | 44. | 35 | 72 | 18. | 32 |
| 13 | 58. | 27 | 43 | 43. | 52 | 73 | 17. | 32 |
| 14 | 58. | 13 | 44 | 43. | 9 | 74 | 16. | 32 |
| 15 | 57. | 57 | 45 | 42. | 25 | 75 | 15. | 31 |
| 16 | 57. | 40 | 46 | 41. | 40 | 76 | 14. | 30 |
| 17 | 57. | 22 | 47 | 40. | 55 | 77 | 13. | 29 |
| 18 | 57. | 3 | 48 | 40. | 8 | 78 | 12. | 28 |
| 19 | 56. | 44 | 49 | 39. | 21 | 79 | 11. | 26 |
| 20 | 56. | 23 | 50 | 38. | 34 | 80 | 10. | 25 |
| 21 | 56. | 1 | 51 | 37. | 45 | 81 | 9. | 23 |
| 22 | 55. | 38 | 52 | 36. | 56 | 82 | 8. | 21 |
| 23 | 55. | 13 | 53 | 36. | 6 | 83 | 7. | 18 |
| 24 | 54. | 48 | 54 | 35. | 16 | 84 | 6. | 16 |
| 25 | 54. | 22 | 55 | 34. | 24 | 85 | 5. | 13 |
| 26 | 53. | 55 | 56 | 33. | 33 | 86 | 4. | 11 |
| 27 | 53. | 27 | 57 | 32. | 40 | 87 | 3. | 8 |
| 28 | 52. | 58 | 58 | 31. | 47 | 88 | 2. | 5 |
| 29 | 52. | 28 | 59 | 30. | 54 | 89 | 1. | 2 |
| 30 | 51. | 57 | 60 | 30. | 0 | 90 | 0. | 0 |

Constructio Tab. 1.

| | |
|---------------------|-------------|
| L. S. unius gradûs | { 824185. & |
| L. S. C. Elev. Poli | { 982551. |

S. T. x. 806736.

residuum erit L. S. valoris unius gradûs in minutis primis, nim. 40. Ut autem etiam minuta secunda invenias, operare juxta dicta fol. 196. quærendo imprimis Differentiam inter Logarithmum datum, & eò proximè minorem in Tabula reperibilem hoc modo.

| | |
|------------------|-----------|
| L. datus | 806736. |
| L. proximè minor | — 806577. |

| | |
|---------------------|-----------|
| Erit Differentia I. | 159. |
| L. proximè major | 807649. |
| L. minor. | — 806577. |

Erit Differentia II. 1072.

Fiat ergo Regula Trium; Differentia II. major 1072 dat 60. min sec. minor 159. dabit 8. erit itaque valor unius gradûs Paralleli, dati v. g. nostratis 40. min. 8. sec.

Tab. II. continens Gradus cujusque Parallelum in
Milliaria Germanica converſos.

| Gr. | Mill.M. | Gr. | Mill.M. | Gr. | Mill.M. |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1 | 14. 59 | 31 | 12. 52 | 61 | 7. 16 |
| 2 | 14. 59 | 32 | 12. 43 | 62 | 7. 2 |
| 3 | 14. 58 | 33 | 12. 35 | 63 | 6. 48 |
| 4 | 14. 58 | 34 | 12. 26 | 64 | 6. 34 |
| 5 | 14. 56 | 35 | 12. 17 | 65 | 6. 20 |
| 6 | 14. 55 | 36 | 12. 8 | 66 | 5. 6 |
| 7 | 14. 53 | 37 | 11. 59 | 67 | 5. 52 |
| 8 | 14. 51 | 38 | 11. 49 | 68 | 5. 37 |
| 9 | 14. 48 | 39 | 11. 39 | 69 | 5. 21 |
| 10 | 14. 46 | 40 | 11. 29 | 70 | 5. 8 |
| 11 | 14. 43 | 41 | 11. 19 | 71 | 4. 53 |
| 12 | 14. 40 | 42 | 11. 9 | 72 | 4. 38 |
| 13 | 14. 37 | 43 | 10. 58 | 73 | 4. 23 |
| 14 | 14. 33 | 44 | 10. 47 | 74 | 4. 8 |
| 15 | 14. 29 | 45 | 10. 36 | 75 | 3. 53 |
| 16 | 14. 25 | 46 | 10. 25 | 76 | 3. 38 |
| 17 | 14. 21 | 47 | 10. 14 | 77 | 3. 22 |
| 18 | 14. 16 | 48 | 10. 2 | 78 | 3. 7 |
| 19 | 14. 11 | 49 | 9. 50 | 79 | 2. 52 |
| 20 | 14. 6 | 50 | 9. 38 | 80 | 2. 36 |
| 21 | 14. 0 | 51 | 9. 26 | 81 | 2. 21 |
| 22 | 13. 54 | 52 | 9. 14 | 82 | 2. 5 |
| 23 | 13. 48 | 53 | 9. 2 | 83 | 1. 50 |
| 24 | 13. 42 | 54 | 8. 49 | 84 | 1. 34 |
| 25 | 13. 36 | 55 | 8. 36 | 85 | 1. 18 |
| 26 | 13. 29 | 56 | 8. 23 | 86 | 1. 3 |
| 27 | 13. 22 | 57 | 8. 10 | 87 | 0. 47 |
| 28 | 13. 15 | 58 | 7. 57 | 88 | 0. 31 |
| 29 | 13. 7 | 59 | 7. 43 | 89 | 0. 16 |
| 30 | 12. 59 | 60 | 7. 30 | 90 | 0. 0 |

Constructio Tab. 11.

Valorem minutorum pro præcedenti Tabula inventorum facillimè in Milliaria convertes, si minuta inventa tam prima, quàm secunda divides per 4. invenies enim, uni gradui Paralleli nostraris respondere 10. Milliaria Ger. cum 2. minutis. Vel:

Minuta inventa tam prima, quàm secunda multiplica per 15. & utrumque productum divide per 60. & provenient dicta 10. Milliaria cum 2. minutis, uti ex ambabus Tabulis liquet.

Tabula III. Declinationis Ecliptica.

| | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | |
|----|------------|------------|------------|----|--|
| 0 | 0. 0. 0 | 11. 30. 1 | 20. 12. 6 | 30 | |
| 1 | 0. 23. 55 | 11. 51. 4 | 20. 24. 40 | 29 | |
| 2 | 0. 47. 51 | 12. 11. 56 | 20. 36. 51 | 28 | |
| 3 | 1. 11. 45 | 12. 32. 35 | 20. 48. 40 | 27 | |
| 4 | 1. 35. 38 | 12. 53. 2 | 21. 0. 6 | 26 | |
| 5 | 1. 59. 30 | 13. 13. 17 | 21. 11. 8 | 25 | |
| 6 | 2. 23. 20 | 13. 33. 18 | 21. 21. 47 | 24 | |
| 7 | 2. 47. 7 | 13. 53. 6 | 21. 32. 2 | 23 | |
| 8 | 3. 10. 53 | 14. 12. 40 | 21. 41. 53 | 22 | |
| 9 | 3. 34. 35 | 14. 32. 0 | 21. 51. 19 | 21 | |
| 10 | 3. 58. 14 | 14. 51. 5 | 22. 0. 21 | 20 | |
| 11 | 4. 21. 49 | 15. 9. 55 | 22. 8. 58 | 19 | |
| 12 | 4. 45. 20 | 15. 28. 29 | 22. 17. 10 | 18 | |
| 13 | 5. 8. 47 | 15. 46. 48 | 22. 24. 57 | 17 | |
| 14 | 5. 32. 9 | 16. 4. 51 | 22. 32. 18 | 16 | |
| 15 | 5. 55. 25 | 16. 22. 38 | 22. 39. 14 | 15 | |
| 16 | 6. 18. 37 | 16. 40. 7 | 22. 45. 43 | 14 | |
| 17 | 6. 41. 42 | 16. 57. 19 | 22. 51. 47 | 13 | |
| 18 | 7. 4. 41 | 17. 14. 14 | 22. 57. 24 | 12 | |
| 19 | 7. 27. 33 | 17. 30. 51 | 23. 2. 35 | 11 | |
| 20 | 7. 50. 18 | 17. 47. 9 | 23. 7. 19 | 10 | |
| 21 | 8. 12. 56 | 18. 3. 9 | 23. 11. 37 | 9 | |
| 22 | 8. 35. 26 | 18. 18. 49 | 23. 15. 28 | 8 | |
| 23 | 8. 57. 48 | 18. 34. 10 | 23. 18. 52 | 7 | |
| 24 | 9. 20. 2 | 18. 49. 12 | 23. 21. 49 | 6 | |
| 25 | 9. 42. 6 | 19. 3. 53 | 23. 24. 19 | 5 | |
| 26 | 10. 4. 1 | 19. 18. 14 | 23. 26. 22 | 4 | |
| 27 | 10. 25. 47 | 19. 32. 14 | 23. 27. 57 | 3 | |
| 28 | 10. 47. 22 | 19. 45. 53 | 23. 29. 5 | 2 | |
| 29 | 11. 8. 47 | 19. 59. 11 | 23. 29. 46 | 1 | |
| 30 | 11. 30. 1 | 20. 12. 6 | 23. 30. 0 | 0 | |
| | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | |

Constructio Tab. III.

L.S. Declinationis Maximæ, & L.S. singulorum graduum successive addantur, & abjecto Sinu Toto prodibit L.S. Declinationis quæsitæ. In exemplo vis scire, quanta sit Declinatio gradus 39. Eclipticæ. Itaque

| | |
|------------------|-------------|
| L. S. Decl. Max. | { 960069. & |
| L. S. grad. 39. | { 979887. |

s. T. x. 939956.

& residuum erit L. S. Declinationis inquirendæ, nim. 14. gr. 32. min. & sic per omnes gradus procedendo usque ad 90. habebis unum Eclipticæ Quadrantem pro primis tribus Signis γ . δ . ϵ . quod sufficit. Cum enim puncta Eclipticæ æqualiter distantia ab Æquatore, ut initium γ . & ϵ . æqualem habeant Declinationem Borealem, sicut μ . κ . Australem, ideo præsens Tabula Compendii gratiâ ita constructa est, ut Signa coincidentia in eandem Declinationem semper conjuncta videantur, gradibus Eclipticæ quoad Signa in fronte Tabulæ posita descendentes, gradibus verò Signorum in calce positorum ascendentes.

Tabula IV. Ascensionum Rectarum
Pars I.

| | V | 8 | II | Σ | Ω | me |
|----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 0 | 0. 0 | 27 54 | 57.48 | 90. 0 | 122 12 | 152. 6 |
| 1 | 0 55 | 28.51 | 58.51 | 91. 6 | 123.14 | 153. 3 |
| 2 | 1.50 | 29 49 | 59.54 | 92.12 | 124.16 | 154. 0 |
| 3 | 2.45 | 30.46 | 60.57 | 93.17 | 125.18 | 154 57 |
| 4 | 3.40 | 31.44 | 62. 0 | 94.22 | 126 20 | 155 54 |
| 5 | 4.35 | 32.42 | 63. 3 | 95.27 | 127.22 | 156.51 |
| 6 | 5.30 | 33 40 | 64. 6 | 96.33 | 128.24 | 157.48 |
| 7 | 6.25 | 34.39 | 65. 9 | 97.38 | 129.25 | 158.45 |
| 8 | 7.20 | 35.37 | 66 12 | 98.43 | 130.26 | 159.41 |
| 9 | 8 15 | 36.36 | 67.17 | 99.48 | 131.27 | 160.37 |
| 10 | 9.11 | 37.35 | 68.21 | 100.53 | 132.27 | 161.33 |
| 11 | 10. 6 | 38.34 | 69.25 | 101.58 | 133.28 | 162.29 |
| 12 | 11. 1 | 39.33 | 70 29 | 103. 3 | 134.29 | 163.25 |
| 13 | 11.57 | 40 32 | 71 33 | 104. 8 | 135 29 | 164 21 |
| 14 | 12 52 | 41 31 | 72.38 | 105.13 | 136 29 | 165 17 |
| 15 | 13.48 | 42.31 | 73.43 | 106.17 | 137.29 | 166.12 |
| 16 | 14.43 | 43.31 | 74.47 | 107.22 | 138 29 | 167. 8 |
| 17 | 15.39 | 44.31 | 75.52 | 108.27 | 139.28 | 168. 3 |
| 18 | 16 35 | 45.31 | 76.57 | 109.31 | 140.27 | 168.59 |
| 19 | 17 32 | 46.32 | 78. 2 | 110.35 | 141.26 | 169.54 |
| 20 | 18 27 | 47.33 | 79. 7 | 111.39 | 142.25 | 170.49 |
| 21 | 19.23 | 48.33 | 80 12 | 112.43 | 143.24 | 171.45 |
| 22 | 20 20 | 49.34 | 81.17 | 113.47 | 144.23 | 172.40 |
| 23 | 21.15 | 50.35 | 82.22 | 114.51 | 145.21 | 173.35 |
| 24 | 22.12 | 51.36 | 83 27 | 115.54 | 146.20 | 174.30 |
| 25 | 23. 9 | 52.38 | 84 33 | 116.57 | 147.18 | 175.25 |
| 26 | 24. 6 | 53.40 | 85.38 | 118. 0 | 148.16 | 176.20 |
| 27 | 25. 3 | 54.42 | 86.43 | 119. 3 | 149.14 | 177.15 |
| 28 | 26. 0 | 55.44 | 87 48 | 120. 6 | 150.11 | 178 10 |
| 29 | 26.57 | 56.46 | 88 54 | 121. 9 | 151. 9 | 179 5 |
| 30 | 27.54 | 57 48 | 90 0 | 122.12 | 152. 6 | 180. 0 |

Tabula Ascensionum Rectarum

Pars II.

| | ☾ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 180. 0 | 207.54 | 237.48 | 270. 0 | 302.12 | 332. 6 |
| 1 | 180.55 | 208.51 | 238.51 | 271. 6 | 303.14 | 333. 3 |
| 2 | 181.50 | 209.49 | 239.54 | 272.12 | 304.16 | 334. 0 |
| 3 | 182.45 | 210.46 | 240.57 | 273.17 | 305.18 | 334.57 |
| 4 | 183.40 | 211.44 | 242. 0 | 274.22 | 306.20 | 335.54 |
| 5 | 184.35 | 212.42 | 243. 3 | 275.27 | 307.22 | 336.51 |
| 6 | 185.30 | 213.40 | 244. 6 | 276.31 | 308.24 | 337.48 |
| 7 | 186.25 | 214.39 | 245. 9 | 277.38 | 309.25 | 338.45 |
| 8 | 187.20 | 215.37 | 246.13 | 278.43 | 310.26 | 339.41 |
| 9 | 188.15 | 216.36 | 247.17 | 279.48 | 311.27 | 340.37 |
| 10 | 189.11 | 217.35 | 248.21 | 280.53 | 312.28 | 341.33 |
| 11 | 190. 6 | 218.34 | 249.25 | 281.58 | 313.29 | 342.29 |
| 12 | 191. 1 | 219.33 | 250.29 | 283. 3 | 314.29 | 343.25 |
| 13 | 191.57 | 220.32 | 251.33 | 284. 8 | 315.29 | 344.21 |
| 14 | 192.52 | 221.31 | 252.38 | 285.13 | 216.29 | 345.17 |
| 15 | 193.48 | 222.31 | 253.43 | 286.17 | 317.29 | 346.13 |
| 16 | 194.43 | 223.31 | 254.47 | 287.22 | 318.29 | 347. 8 |
| 17 | 195.39 | 224.31 | 255.52 | 288.27 | 319.28 | 348. 3 |
| 18 | 196.35 | 225.31 | 256.57 | 289.31 | 320.27 | 348.59 |
| 19 | 197.31 | 226.32 | 158. 2 | 290.35 | 321.26 | 349.55 |
| 20 | 198.27 | 227.33 | 259. 7 | 291.39 | 322.25 | 350.50 |
| 21 | 199.23 | 228.33 | 260.12 | 292.43 | 323.24 | 351.45 |
| 22 | 200.19 | 229.34 | 261.17 | 293.47 | 324.23 | 352.40 |
| 23 | 201.15 | 230.35 | 262.22 | 294.51 | 325.21 | 353.35 |
| 24 | 202.12 | 231.36 | 263.27 | 295.54 | 326.20 | 354.30 |
| 25 | 203. 9 | 232.38 | 264.33 | 296.57 | 327.18 | 355.25 |
| 26 | 204. 6 | 233.40 | 265.38 | 298. 0 | 328.16 | 356.20 |
| 27 | 205. 3 | 234.42 | 266.43 | 299. 3 | 329.14 | 357.15 |
| 28 | 206. 0 | 235.44 | 267.48 | 300. 0 | 330.11 | 358.10 |
| 29 | 206.57 | 236.46 | 268.54 | 301. 9 | 331. 9 | 359. 5 |
| 30 | 207.54 | 237.48 | 270. 0 | 302.12 | 332. 6 | 360. 0 |

Constructio Tab. IV.

L. T. C. Decl. Max. &

L. T. Declin. datæ addantur,

S. T. subtrahatur, & residuum erit L. S. A-
scensionis Rectæ, veræ quidem, si ☉ est in 1. Qua-
drante Eclipticæ; si verò ☉ est in 2. Qua-
drante, dictum residuum subtrahendum erit à
Semicirculo; in 3. autem eidem addendum,
& in 4. subtrahendum à toto Circulo 360.gr. ut
dictum est supra in Probl. 45. & 46. ubi & exem-
plum videri, & plura alia ex præsentī Ta-
bula formari poterunt.

Tabula V. Differentiarum Ascensionalium ad Elev. Poli 48.

| Gr. Declin. | Ad Elev. Poli 48. | | Gr. Declin. | Ad Elev. Poli 48. | | Gr. Declin. | Ad Elev. Poli 48. | |
|-------------|-------------------|----|-------------|-------------------|----|-------------|-------------------|----|
| 1 | 1. | 7 | 16 | 18. | 34 | 31 | 41. | 52 |
| 2 | 2. | 13 | 17 | 19. | 51 | 32 | 43. | 57 |
| 3 | 3. | 20 | 18 | 21. | 9 | 33 | 46. | 9 |
| 4 | 4. | 27 | 19 | 22. | 29 | 34 | 48. | 31 |
| 5 | 5. | 35 | 20 | 23. | 51 | 35 | 51. | 3 |
| 6 | 6. | 42 | 21 | 25. | 14 | 36 | 53. | 48 |
| 7 | 7. | 50 | 22 | 26. | 40 | 37 | 56. | 49 |
| 8 | 8. | 59 | 23 | 28. | 8 | 38 | 60. | 11 |
| 9 | 10. | 8 | 24 | 29. | 38 | 39 | 64. | 4 |
| 10 | 11. | 18 | 25 | 31. | 12 | 40 | 68. | 44 |
| 11 | 12. | 28 | 26 | 32. | 48 | 41 | 74. | 54 |
| 12 | 13. | 39 | 27 | 34. | 28 | 42 | 90. | 0 |
| 13 | 14. | 51 | 28 | 36. | 12 | | | |
| 14 | 16. | 5 | 29 | 38. | 0 | | | |
| 15 | 17. | 19 | 30 | 39. | 53 | | | |

Constructio Tab. V.

| | |
|---------------------------|-------------|
| L. T. Elev. Poli | 1.004556. & |
| L. T. Decl. v. g. 30. gr. | 976143. |

S. T.

x. 980699.

eritque residuum L. S. Differentiæ Ascensionalis quæsitæ, nim. 39. gr. 53. min. proximè. Eodem modo fieri potest hæc Tabula pro singulis gradibus ac minutis Eclipticæ, variatâ nim. Declinatione singulorum. Imò habitâ aliunde Tabulâ Ascensionum Obliquarum, erui hoc ipso potest Tabula Differentiarum Ascensionalium, si scil. Ascensiones Obliquæ subtrahantur ab Ascensionibus Rectis in Signis Borealibus, in Australibus verò Ascensio Recta subtrahatur vicissim ab Obliqua.

Tabu.

*Tabula VI. Ascensionum Obliquarum
ad Elev. Poli 48. Pars 1.*

| | V | 8 | II | III | Ω | III |
|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 0 | 0. 0 | 14.50 | 33.41 | 51. 7 | 98. 5 | 139. 2 |
| 1 | 0.28 | 15.23 | 34.26 | 62.13 | 99.25 | 140. 2 |
| 2 | 0.56 | 15.56 | 35.12 | 63.20 | 100.46 | 141. 7 |
| 3 | 1.25 | 16.29 | 35.58 | 64.27 | 102. 6 | 143.10 |
| 4 | 1.53 | 17. 2 | 36.45 | 65.35 | 103.48 | 144.54 |
| 5 | 2.22 | 17.35 | 37.33 | 66.43 | 104.48 | 145.54 |
| 6 | 2.50 | 18. 9 | 38.22 | 67.52 | 106. 9 | 147.17 |
| 7 | 3.19 | 18.43 | 39.12 | 69. 1 | 107.30 | 148.39 |
| 8 | 3.48 | 19.18 | 40. 1 | 70.11 | 108.52 | 150. 1 |
| 9 | 4.17 | 19.52 | 40.51 | 71.22 | 110.13 | 151.23 |
| 10 | 4.46 | 20.27 | 41.41 | 72.34 | 111.35 | 152.45 |
| 11 | 5.15 | 21. 2 | 42.32 | 73.46 | 112.57 | 154. 7 |
| 12 | 5.44 | 21.38 | 43.24 | 74.59 | 114.19 | 155.29 |
| 13 | 6.13 | 22.14 | 44.17 | 76.12 | 115.41 | 156.51 |
| 14 | 6.42 | 22.51 | 45.11 | 77.26 | 117. 3 | 158.13 |
| 15 | 7.11 | 23.28 | 46. 6 | 78.40 | 118.26 | 159.35 |
| 16 | 7.40 | 24. 6 | 47. 1 | 79.55 | 119.48 | 160.57 |
| 17 | 8.10 | 24.45 | 47.57 | 81.10 | 121.10 | 162.19 |
| 18 | 8.39 | 25.23 | 48.53 | 82.26 | 122.32 | 163.43 |
| 19 | 9. 9 | 26. 2 | 49.50 | 83.42 | 123.54 | 165. 3 |
| 20 | 9.39 | 26.41 | 50.48 | 84.59 | 125.17 | 166.24 |
| 21 | 10. 9 | 27.21 | 51.47 | 86.16 | 126.40 | 167.46 |
| 22 | 10.40 | 28. 2 | 52.47 | 87.34 | 128. 3 | 169. 8 |
| 23 | 11.10 | 28.42 | 53.47 | 88.51 | 129.26 | 170.29 |
| 24 | 11.41 | 29.24 | 54.48 | 90. 9 | 130.49 | 171.51 |
| 25 | 12.12 | 30. 4 | 55.49 | 91.27 | 132.11 | 173.12 |
| 26 | 12.43 | 30.46 | 56.51 | 92.46 | 133.34 | 174.34 |
| 27 | 13.15 | 31.29 | 57.54 | 94. 6 | 134.56 | 175.56 |
| 28 | 13.26 | 32.12 | 58.58 | 95.25 | 136.18 | 177.17 |
| 29 | 14.18 | 32.56 | 60. 2 | 96.45 | 137.40 | 178.39 |
| 30 | 14.50 | 33.41 | 61. 7 | 98. 5 | 139. 2 | 180. 0 |

Tabula Ascensionum Obliquarum

Pars II.

| | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | 180. 0 | 220. 58 | 261. 55 | 298. 53 | 326. 19 | 345. 10 |
| 1 | 181. 21 | 222. 20 | 163. 15 | 299. 58 | 327. 4 | 345. 42 |
| 2 | 182. 43 | 223. 42 | 264. 35 | 301. 2 | 327. 48 | 346. 14 |
| 3 | 184. 4 | 225. 4 | 265. 54 | 302. 6 | 328. 31 | 346. 45 |
| 4 | 185. 26 | 226. 25 | 267. 14 | 303. 9 | 329. 14 | 347. 17 |
| 5 | 186. 48 | 227. 49 | 268. 33 | 304. 11 | 329. 56 | 347. 48 |
| 6 | 188. 9 | 229. 11 | 269. 51 | 305. 12 | 330. 37 | 348. 19 |
| 7 | 189. 31 | 230. 34 | 271. 9 | 306. 13 | 331. 18 | 348. 50 |
| 8 | 190. 52 | 231. 57 | 272. 26 | 307. 13 | 331. 58 | 349. 20 |
| 9 | 192. 14 | 233. 20 | 273. 44 | 308. 13 | 332. 39 | 349. 51 |
| 10 | 193. 36 | 234. 43 | 275. 1 | 309. 12 | 333. 19 | 350. 21 |
| 11 | 194. 57 | 236. 6 | 276. 18 | 310. 10 | 333. 58 | 350. 51 |
| 12 | 196. 19 | 237. 28 | 277. 34 | 311. 7 | 334. 37 | 351. 21 |
| 13 | 197. 41 | 238. 50 | 278. 50 | 312. 3 | 335. 15 | 351. 50 |
| 14 | 199. 3 | 240. 12 | 280. 5 | 312. 59 | 335. 54 | 352. 20 |
| 15 | 200. 25 | 241. 34 | 281. 20 | 313. 54 | 336. 32 | 352. 49 |
| 16 | 201. 47 | 242. 57 | 282. 34 | 314. 49 | 337. 9 | 353. 17 |
| 17 | 203. 9 | 244. 19 | 283. 48 | 315. 43 | 337. 46 | 353. 47 |
| 18 | 204. 13 | 245. 41 | 285. 1 | 316. 36 | 338. 22 | 354. 16 |
| 19 | 105. 53 | 247. 3 | 286. 14 | 317. 28 | 338. 58 | 354. 45 |
| 20 | 207. 15 | 248. 25 | 287. 2 | 318. 19 | 339. 33 | 355. 14 |
| 21 | 208. 37 | 249. 47 | 288. 38 | 319. 9 | 340. 8 | 355. 43 |
| 22 | 209. 59 | 251. 8 | 289. 49 | 319. 59 | 340. 42 | 356. 12 |
| 23 | 211. 21 | 252. 30 | 290. 59 | 320. 48 | 341. 17 | 356. 41 |
| 24 | 212. 43 | 253. 51 | 292. 8 | 321. 38 | 341. 51 | 357. 10 |
| 25 | 214. 6 | 255. 12 | 293. 17 | 322. 27 | 342. 25 | 357. 38 |
| 26 | 215. 28 | 256. 33 | 294. 25 | 323. 15 | 342. 58 | 358. 7 |
| 27 | 216. 50 | 257. 54 | 295. 33 | 324. 2 | 343. 31 | 358. 35 |
| 28 | 218. 13 | 259. 14 | 296. 40 | 324. 48 | 344. 4 | 359. 4 |
| 29 | 219. 35 | 260. 35 | 297. 47 | 325. 34 | 344. 37 | 359. 32 |
| 30 | 220. 58 | 261. 55 | 298. 53 | 326. 19 | 345. 10 | 360. 0 |

Gen.

Constructio Tab. VI.

Differentiam Ascensionalem in Signis Bore-
alibus subtrahe, in Australibus verò adde A-
scensioni Rectæ, & habebis Ascensionem Ob-
liquam. Sic in 5. gr. γ . Declinatio est 2. gr.
0. Differentia ergò Ascensionalis est 2. gr. 13.
min. hos, si ab Ascens. Recta 5. gr. γ . tan-
quam Signi Borealis, nim. à 4. gr. 35. minut.
subtrahas, remanebunt pro Ascensione Obli-
qua 2. gr. 22. min. Et sic de aliis. Vide
hîc etiam, quæ diximus in Tabulâ
præcedente.

Tab. VII. *Altitudinum* ☉ *in Circulo Ver-*
ticali ad Eley. Poli 48.

| | γ | 8 | Π | |
|----|------------|------------|------------|----|
| 0 | 0. 0. 0 | 15. 33. 44 | 27. 41. 22 | 30 |
| 1 | 0. 30. 28 | 16. 2. 34 | 27. 51. 18 | 29 |
| 2 | 1. 4. 23 | 16. 32. 1 | 28. 16. 47 | 28 |
| 3 | 1. 36. 33 | 16. 59. 30 | 28. 33. 36 | 27 |
| 4 | 2. 8. 52 | 17. 27. 37 | 28. 50. 0 | 26 |
| 5 | 2. 40. 49 | 17. 55. 37 | 29. 5. 52 | 25 |
| 6 | 3. 14. 42 | 18. 23. 4 | 29. 21. 11 | 24 |
| 7 | 3. 13. 6 | 18. 50. 22 | 29. 35. 54 | 23 |
| 8 | 4. 16. 57 | 19. 17. 24 | 29. 50. 5 | 22 |
| 9 | 4. 48. 54 | 19. 44. 8 | 30. 3. 41 | 21 |
| 10 | 5. 20. 47 | 20. 10. 34 | 30. 16. 46 | 20 |
| 11 | 5. 52. 35 | 20. 36. 40 | 30. 29. 11 | 19 |
| 12 | 6. 24. 18 | 21. 2. 27 | 30. 41. 5 | 18 |
| 13 | 6. 55. 57 | 21. 27. 54 | 30. 52. 20 | 17 |
| 14 | 7. 27. 30 | 21. 53. 1 | 31. 3. 0 | 16 |
| 15 | 7. 58. 57 | 22. 17. 50 | 31. 13. 3 | 15 |
| 16 | 8. 30. 19 | 22. 42. 16 | 31. 22. 27 | 14 |
| 17 | 9. 1. 33 | 23. 6. 20 | 31. 31. 15 | 13 |
| 18 | 9. 32. 4 | 23. 30. 0 | 31. 39. 0 | 12 |
| 19 | 10. 3. 38 | 23. 52. 14 | 31. 46. 54 | 11 |
| 20 | 10. 34. 31 | 24. 16. 13 | 31. 53. 54 | 10 |
| 21 | 11. 5. 11 | 24. 38. 4 | 32. 0. 12 | 9 |
| 22 | 11. 35. 43 | 25. 0. 45 | 32. 5. 46 | 8 |
| 23 | 12. 6. 8 | 25. 22. 26 | 32. 10. 45 | 7 |
| 24 | 12. 36. 21 | 25. 43. 39 | 32. 14. 20 | 6 |
| 25 | 13. 6. 24 | 26. 4. 25 | 32. 18. 45 | 5 |
| 26 | 13. 36. 15 | 26. 24. 48 | 32. 21. 42 | 4 |
| 27 | 14. 5. 56 | 26. 44. 38 | 32. 24. 0 | 3 |
| 28 | 14. 35. 24 | 27. 4. 2 | 32. 25. 39 | 2 |
| 29 | 15. 4. 41 | 27. 22. 57 | 32. 26. 39 | 1 |
| 30 | 15. 33. 44 | 27. 41. 22 | 32. 27. 0 | 0 |

1 m

Ω

Σ

Con-

K k

Constructio Tab. VII.

S. T. & L. S. omnium Declinationum
singulis Eclipticæ gradibus comperentium ad-
dantur, & abjecto L. S. A. P. remanebit L. S.

Altitudinis ☉ in Circulo Verticali quæ-
sitæ, ut patet ex Problema-

te 88.

Tab. VIII.

Tab. VIII. Alt. ☉ H. 6. ad Alt. Poli 48.

| | V | | 8 | | II | | |
|----|-------|----|--------|----|--------|----|----|
| 0 | 0. 0. | 0 | 8.31. | 15 | 14.54. | 17 | 30 |
| 1 | 0.17. | 46 | 8.46. | 43 | 15. 1. | 15 | 29 |
| 2 | 0.35. | 33 | 9. 2. | 4 | 15.10. | 2 | 28 |
| 3 | 0.52. | 50 | 9.17. | 15 | 15.18. | 32 | 27 |
| 4 | 1.11. | 4 | 9.32. | 16 | 15.26. | 46 | 26 |
| 5 | 1.28. | 46 | 9.47. | 9 | 15.34. | 43 | 25 |
| 6 | 1.46. | 30 | 10. 1. | 50 | 15.42. | 24 | 24 |
| 7 | 2. 4. | 8 | 10.16. | 21 | 15.49. | 45 | 23 |
| 8 | 2.21. | 49 | 10.30. | 41 | 15.56. | 49 | 22 |
| 9 | 2.39. | 25 | 10.44. | 52 | 16. 3. | 35 | 21 |
| 10 | 2.56. | 6 | 10.58. | 50 | 16.10. | 5 | 20 |
| 11 | 3.14. | 28 | 11.12. | 36 | 16.15. | 47 | 19 |
| 12 | 3.31. | 55 | 11.26. | 10 | 16.22. | 1 | 18 |
| 13 | 3.49. | 19 | 11.39. | 33 | 16.27. | 42 | 17 |
| 14 | 4. 6. | 38 | 11.52. | 44 | 16.33. | 0 | 16 |
| 15 | 4.23. | 54 | 12. 5. | 42 | 16.37. | 57 | 15 |
| 16 | 4.41. | 6 | 12.18. | 45 | 16.42. | 17 | 14 |
| 17 | 4.58. | 12 | 12.30. | 58 | 16.46. | 54 | 13 |
| 18 | 5.15. | 14 | 12.43. | 6 | 16.50. | 57 | 12 |
| 19 | 5.32. | 10 | 12.55. | 23 | 16.54 | 38 | 11 |
| 20 | 5.49. | 0 | 13. 7. | 13 | 16.57. | 5 | 10 |
| 21 | 6. 5. | 43 | 13.18. | 51 | 17. 1. | 7 | 9 |
| 22 | 6.22. | 23 | 13.30. | 13 | 17. 3. | 49 | 8 |
| 23 | 6.38. | 43 | 13.41. | 20 | 17. 6. | 30 | 7 |
| 24 | 6.55. | 21 | 13.52. | 14 | 17. 8. | 22 | 6 |
| 25 | 7.11. | 39 | 14. 2. | 24 | 17.10. | 10 | 5 |
| 26 | 7.27. | 49 | 14.13. | 17 | 17.11. | 20 | 4 |
| 27 | 7.43. | 41 | 14.23. | 23 | 17.12. | 44 | 3 |
| 28 | 8. 0. | 21 | 14.33. | 15 | 17.13 | 33 | 2 |
| 29 | 8.15. | 34 | 14.42. | 51 | 17.14. | 3 | 1 |
| 30 | 8.31. | 15 | 14.54 | 17 | 17.14. | 13 | 0 |

III

Ω

☿

Constructio Tab. VIII.

L. S. Elev. Poli, &

L. S. Declin. \odot addantur,

& subtracto S. T. remanebit L. S. Alt. \odot

H. 6. cujus exemplum videre est supra in
Probl. 86.

Tabula IX, *Latitudinum* ☉ pro Elevat. Poli 75.

| | XII | XI | X | IX | VIII | VII | VI | V | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| ☉ | 65.30 | 62.45 | 55.52 | 46.54 | 37.6 | 27.4 | 17.14 | 7.54 | 30 |
| 10 | 65.7 | 62.24 | 55.34 | 46.38 | 36.50 | 26.49 | 16.58 | 7.37 | 20 |
| 20 | 64.0 | 61.22 | 54.39 | 45.49 | 36.3 | 26.2 | 16.10 | 6.46 | 10 |
| ☽ | 62.12 | 59.41 | 53.10 | 44.29 | 34.47 | 24.47 | 14.52 | 5.24 | II |
| 10 | 59.47 | 57.24 | 51.9 | 42.39 | 33.4 | 23.3 | 13.7 | 3.31 | 20 |
| 20 | 56.51 | 54.36 | 48.39 | 40.23 | 30.55 | 20.58 | 10.59 | 1.19 | 10 |
| ♂ | 53.30 | 51.24 | 45.44 | 37.43 | 28.26 | 18.32 | 8.31 | | 8 |
| 10 | 49.50 | 47.52 | 42.29 | 34.45 | 25.38 | 15.50 | 5.49 | | 20 |
| 20 | 45.58 | 44.7 | 39.1 | 31.34 | 22.39 | 11.57 | 2.27 | | 10 |
| ♀ | 42.0 | 40.16 | 35.25 | 28.14 | 19.33 | 9.58 | | | ✓ |
| 10 | 38.2 | 36.24 | 31.47 | 24.52 | 16.24 | 6.58 | | | 20 |
| 20 | 34.10 | 32.37 | 28.14 | 21.34 | 13.18 | 4.2 | | | 10 |
| ♂ | 30.30 | 29.2 | 24.49 | 18.23 | 10.21 | 1.14 | | | ✕ |
| 10 | 27.9 | 25.44 | 21.42 | 15.29 | 7.38 | | | | 20 |
| 20 | 24.13 | 22.52 | 18.56 | 12.55 | 5.15 | | | | 10 |
| ♂ | 21.48 | 20.29 | 16.42 | 10.48 | 3.17 | | | | ≈ |
| 10 | 20.0 | 18.43 | 15.0 | 9.13 | 1.49 | | | | 20 |
| 20 | 18.53 | 17.37 | 13.57 | 8.15 | 0.55 | | | | 10 |
| 30 | 18.30 | 17.14 | 13.36 | 7.54 | 0.36 | | | | ♂ |
| | 12 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Constructio Tab. IX.

Pluribus indicata est supra Probl. 92. & seqq.

*Tabula X. Azimuthorum ab Oriente pro
Elev. Poli 48.*

| | XII. | XI. | X. | IX. | VIII. | VII. | VI. | V. | |
|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| ☉ | 90.0 | 58.46 | 35.11 | 18.21 | 5.20 | 5.50 | 16.13 | 26.35 | 30 |
| 10 | 90.0 | 59 | 35.55 | 18.43 | 5.39 | 5.29 | 15.56 | 26.20 | 20 |
| 20 | 90.0 | 59.57 | 36.45 | 19.50 | 6.43 | 4.39 | 15.7 | 25.36 | 10 |
| ☾ | 90.0 | 61.16 | 38.29 | 21.29 | 8.14 | 3.11 | 13.5 | 24.21 | II |
| 10 | 90.0 | 62.45 | 40.37 | 23.44 | 10.15 | 1.40 | 12.7 | 22.51 | 20 |
| 20 | 90.0 | 64.25 | 42.59 | 26.11 | 12.39 | 0.26 | 10.3 | 20.57 | 10 |
| ♊ | 90.0 | 66.3 | 45.2 | 28.53 | 15.12 | 3.22 | 7.45 | | 8 |
| 10 | 90.0 | 67.31 | 47.48 | 31.31 | 17.54 | 5.56 | 5.19 | | 20 |
| 20 | 90.0 | 68.55 | 50.3 | 34.16 | 20.35 | 8.26 | 2.39 | | 10 |
| ♈ | 90.0 | 70.10 | 52.10 | 36.37 | 23.14 | 11.16 | | | V |
| 10 | 90.0 | 71.17 | 54.4 | 38.58 | 25.46 | 10.53 | | | 20 |
| 20 | 90.0 | 72.15 | 55.47 | 41.7 | 28.10 | 16.24 | | | 10 |
| ♉ | 90.0 | 73.10 | 57.20 | 43.6 | 30.23 | 18.46 | | | X |
| 10 | 90.0 | 73.13 | 58.39 | 44.49 | 32.22 | | | | 20 |
| 20 | 90.0 | 74.29 | 59.46 | 46.19 | 34.5 | | | | 10 |
| ♊ | 90.0 | 74.59 | 60.40 | 47.30 | 35.30 | | | | ☼ |
| 10 | 90.0 | 75.20 | 61.19 | 48.23 | 35.46 | | | | 20 |
| 20 | 90.0 | 75.32 | 61.43 | 48.55 | 37.12 | | | | 10 |
| 30 | 90.0 | 75.36 | 61.53 | 49.6 | 37.25 | | | | ☼ |
| | 12 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Constructio Tab. X.

Suprà jam indicata est in Probl. 108. & seqq.

Tabula

*Tabula XI. Ortus & Occasus Solis
pro Elev. Poli 48. Pars I.*

| | V | | 8 | | II | | |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
| | Ort. | Occ. | Ort. | Occ. | Ort. | Occ. | |
| | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | |
| 0 | 6.00 | 6.00 | 5.10 | 6.50 | 4.27 | 7.33 | 30 |
| 2 | 5.57 | 6.03 | 5.07 | 6.53 | 4.25 | 7.35 | 28 |
| 4 | 5.53 | 6.07 | 5.03 | 6.57 | 4.23 | 7.37 | 26 |
| 6 | 5.50 | 6.10 | 5.00 | 7.00 | 4.21 | 7.39 | 24 |
| 8 | 5.47 | 6.13 | 4.57 | 7.03 | 4.19 | 7.41 | 22 |
| 10 | 5.43 | 6.17 | 4.54 | 7.06 | 4.17 | 7.43 | 20 |
| 12 | 5.40 | 6.20 | 4.51 | 7.09 | 4.16 | 7.44 | 18 |
| 14 | 5.36 | 6.24 | 4.48 | 7.12 | 4.15 | 7.45 | 16 |
| 16 | 5.32 | 6.28 | 4.45 | 7.15 | 4.13 | 7.47 | 14 |
| 18 | 5.29 | 6.31 | 4.42 | 7.18 | 4.12 | 7.48 | 12 |
| 20 | 5.26 | 6.34 | 4.40 | 7.20 | 4.12 | 7.48 | 10 |
| 22 | 5.22 | 6.38 | 4.37 | 7.23 | 4.11 | 7.49 | 8 |
| 24 | 5.19 | 6.41 | 4.34 | 7.26 | 4.10 | 7.50 | 6 |
| 26 | 5.16 | 6.44 | 4.32 | 7.28 | 4.10 | 7.50 | 4 |
| 28 | 5.13 | 6.47 | 4.30 | 7.30 | 4.09 | 7.51 | 2 |
| 30 | 5.10 | 6.50 | 4.27 | 7.33 | 4.09 | 7.51 | 0 |
| | III | | 8 | | II | | |

Tabula Ortus & Occasus Solis

Pars II.

| | ♌ | | ♍ | | ♎ | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | Ort. | Occ. | Ort. | Occ. | Ort. | Occ. | |
| | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | |
| 0 | 6. 0 | 6. 0 | 6. 50 | 5. 10 | 7. 33 | 4. 27 | 30 |
| 2 | 6. 3 | 5. 57 | 6. 53 | 5. 7 | 7. 35 | 4. 25 | 28 |
| 4 | 6. 7 | 5. 53 | 6. 57 | 5. 3 | 7. 37 | 4. 23 | 26 |
| 6 | 6. 10 | 5. 50 | 7. 0 | 5. 0 | 7. 39 | 4. 21 | 24 |
| 8 | 6. 13 | 5. 47 | 7. 3 | 4. 57 | 7. 41 | 4. 19 | 22 |
| 10 | 6. 17 | 5. 43 | 7. 6 | 4. 54 | 7. 43 | 4. 17 | 20 |
| 12 | 6. 20 | 5. 40 | 7. 9 | 4. 51 | 7. 44 | 4. 16 | 18 |
| 14 | 6. 24 | 5. 36 | 7. 12 | 4. 48 | 7. 45 | 4. 15 | 16 |
| 16 | 6. 28 | 5. 32 | 7. 15 | 4. 45 | 7. 47 | 4. 13 | 14 |
| 18 | 6. 31 | 5. 29 | 7. 18 | 4. 42 | 7. 48 | 4. 12 | 12 |
| 20 | 6. 34 | 5. 26 | 7. 20 | 4. 40 | 7. 48 | 4. 12 | 10 |
| 22 | 6. 38 | 5. 22 | 7. 23 | 4. 37 | 7. 49 | 4. 11 | 8 |
| 24 | 6. 41 | 5. 19 | 7. 26 | 4. 34 | 7. 50 | 4. 10 | 6 |
| 26 | 6. 44 | 5. 16 | 7. 28 | 4. 32 | 7. 50 | 4. 10 | 4 |
| 28 | 6. 47 | 5. 13 | 7. 30 | 4. 30 | 7. 51 | 4. 9 | 2 |
| 30 | 6. 50 | 5. 10 | 7. 33 | 4. 27 | 7. 51 | 4. 9 | 0 |
| | ♏ | | ♐ | | ♑ | | |

Constructio Tab. XI.

Quomodo ex Distantia ☉ orientis ab
H. 6. (de qua in Probl. 41.) deduci possit Ho-
ra Ortûs vel Occasûs, eam nim. converrendo
in tempus, & Horam inde inventam in Signis
Borealibus subtrahendo, in Australibus
verò addendo Horæ 6. dictum est
in Probl. 42.

Tabula XII. Crepusculorum

Pars I.

| | ♈ | | ♉ | | ♊ | | |
|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| | Init. | Fin. | Init. | Fin. | Init. | Fin. | |
| | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | |
| 0 | 4.10 | 7.50 | 3. 6 | 8.54 | 1.46 | 10.14 | 30 |
| 2 | 4. 6 | 7.54 | 3. 1 | 8.59 | 1.42 | 10.18 | 28 |
| 4 | 4. 2 | 7.58 | 2.55 | 9. 5 | 1.36 | 10.24 | 26 |
| 6 | 3.58 | 8. 2 | 2.50 | 9.10 | 1.30 | 10.30 | 24 |
| 8 | 3.54 | 8. 6 | 2.46 | 9.14 | 1.25 | 10.35 | 22 |
| 10 | 3.50 | 8.10 | 2.41 | 9.19 | 1.19 | 10.41 | 20 |
| 12 | 3.46 | 8.14 | 2.35 | 9.25 | 1.14 | 10.46 | 18 |
| 14 | 3.41 | 8.19 | 2.29 | 9.31 | 1.10 | 10.50 | 16 |
| 16 | 3.36 | 8.24 | 2.24 | 9.36 | 1. 6 | 10.54 | 14 |
| 18 | 3.32 | 8.28 | 2.19 | 9.41 | 0.59 | 11. 1 | 12 |
| 20 | 3.28 | 8.32 | 2.14 | 9.46 | 0.55 | 11. 5 | 10 |
| 22 | 3.24 | 8.36 | 2. 9 | 9.51 | 0.50 | 11.10 | 8 |
| 24 | 3.19 | 8.41 | 2. 3 | 9.57 | 0.45 | 11.15 | 6 |
| 26 | 3.15 | 8.45 | 1.57 | 10. 3 | 0.43 | 11.17 | 4 |
| 28 | 3.11 | 8.49 | 1.51 | 10. 9 | 0.41 | 11.19 | 2 |
| 30 | 3. 6 | 8.54 | 1.46 | 10.14 | 0.38 | 11.22 | 0 |
| | ♊ | | ♋ | | ♌ | | |

Tabula XII. Crepusculorum

Pars II.

| | ♌ | | ♍ | | ♎ | | |
|----|-------|------|-------|------|-------|------|----|
| | Init. | Fin. | Init. | Fin. | Init. | Fin. | |
| | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | H.M. | |
| 0 | 4.10 | 7.50 | 5.1 | 6.59 | 5.38 | 6.22 | 30 |
| 2 | 4.14 | 7.46 | 5.4 | 6.56 | 5.39 | 6.21 | 28 |
| 4 | 4.18 | 7.42 | 5.7 | 6.53 | 5.40 | 6.20 | 26 |
| 6 | 4.21 | 7.39 | 5.10 | 6.50 | 5.42 | 6.18 | 24 |
| 8 | 4.24 | 7.36 | 5.13 | 6.47 | 5.43 | 6.17 | 22 |
| 10 | 4.28 | 7.32 | 5.16 | 6.44 | 5.45 | 6.15 | 20 |
| 12 | 4.32 | 7.28 | 5.18 | 6.42 | 5.46 | 6.14 | 18 |
| 14 | 4.36 | 7.24 | 5.21 | 6.39 | 5.47 | 6.13 | 16 |
| 16 | 4.40 | 7.20 | 5.23 | 6.37 | 5.48 | 6.12 | 14 |
| 18 | 4.43 | 7.17 | 5.25 | 6.35 | 5.49 | 6.11 | 12 |
| 20 | 4.46 | 7.14 | 5.27 | 6.33 | 5.49 | 6.11 | 10 |
| 22 | 4.49 | 7.11 | 4.29 | 6.31 | 5.49 | 6.11 | 8 |
| 24 | 4.53 | 7.7 | 5.32 | 6.28 | 5.50 | 6.10 | 6 |
| 26 | 4.55 | 7.5 | 5.34 | 6.26 | 5.50 | 6.10 | 4 |
| 28 | 4.57 | 7.3 | 5.36 | 6.24 | 5.50 | 6.10 | 2 |
| 30 | 5.1 | 6.59 | 5.38 | 6.22 | 5.50 | 6.10 | 0 |
| | ♏ | | ♐ | | ♑ | | |

Constructio Tabula XH.

Depressio ☉ ad initium vel finem Crepusculorum communiter censetur esse 18. gr.

Altitudo ☉ H. 6. initio ☿ v. g. est 17. 14. 13. juxta Tab. VIII. & Compl. Declin. ibi est 66. gr. 30. min. Jam sic

| | |
|------------------------------|------------|
| Sinus Simplex depressionis ☉ | { 30901. & |
| Sinus simplex Alt. H. 6. | { 29632. |

In Hyeme autem subtrah.

L. S. hujus producti & S. T.

L. S. Compl. Alt. Poli

60533.

l. 978199.

-- 982557.

S. T.

L. S. Compl. Declin.

l. 995648.

-- 996239.

999409.

eritque residuum L. S. Dist. ☉ ab H. 6. sub initium vel finem Crepusculi, nim. 80. gr. 34. min. qui in horas redacti dant 5. hor. 22. min. his autem ab H. 6. subtractis vel additis remanebunt pro initio Crepusculi H. 0. seu H. 12. 38. min. pro fine verò 11. hor. 22. min. Durabit autem Crepusculum Matut. à dicto suo initio usque ad Ortum ☉, Vespertinum autem ab Occasu usq; ad memoratum terminum. Pro praxi sufficiet, horam Crepusculi, vel Ortus & Occasus ☉ excerpere ex Planisphaerio, modo quo diximus supra fol. 248. & 271.

Tabu-

Tabula XIII. Climatum Pars I.

| Clima- ta. | Paral- leli | Dies Lon- gissimi. | Elevatio Poli. | Latitudo Climatū. |
|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Hor. M. | G. M. | G. M. |
| 0 | 0 | 12. 0 | 0. 0 | 4. 18 |
| — | 1 | 12. 15 | 4. 18 | — |
| 1 | 2 | 12. 30 | 8. 34 | 8. 25 |
| — | 3 | 12. 45 | 12. 43 | — |
| 2 | 4 | 13. 0 | 16. 43 | 7. 50 |
| — | 5 | 13. 15 | 20. 33 | — |
| 3 | 6 | 13. 30 | 23. 10 | 7. 13 |
| — | 7 | 13. 45 | 27. 36 | — |
| 4 | 8 | 14. 0 | 30. 47 | 6. 9 |
| — | 9 | 14. 15 | 33. 45 | — |
| 5 | 10 | 14. 30 | 36. 30 | 5. 17 |
| — | 11 | 14. 45 | 39. 2 | — |
| 6 | 12 | 15. 0 | 41. 22 | 4. 30 |
| — | 13 | 15. 15 | 43. 32 | — |
| 7 | 14 | 15. 30 | 45. 29 | 3. 48 |
| — | 15 | 15. 45 | 47. 20 | — |
| 8 | 16 | 16. 0 | 49. 1 | 3. 13 |
| — | 17 | 16. 15 | 50. 33 | — |
| 9 | 18 | 16. 30 | 51. 58 | 2. 44 |
| — | 19 | 16. 45 | 53. 17 | — |
| 10 | 20 | 17. 0 | 54. 29 | 2. 17 |
| — | 21 | 17. 15 | 55. 34 | — |
| 11 | 22 | 17. 30 | 56. 37 | 2. 0 |
| — | 23 | 17. 45 | 57. 34 | — |
| 12 | 24 | 18. 0 | 58. 26 | 1. 40 |
| — | 25 | 18. 15 | 59. 14 | — |
| 13 | 26 | 18. 30 | 59. 59 | 1. 26 |
| — | 27 | 18. 45 | 60. 40 | — |

Tabula XIII. Climatum Pars. II.

| Clima- ra. | Paral- leli | Dies Lon- gissimi. | Elevatio Poli. | Latitudo Climatū. |
|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Hor. M. | G. M. | G. M. |
| 14 | 28 | 19. 0 | 61. 18 | 1. 13 |
| | 29 | 19. 15 | 61. 53 | |
| 15 | 30 | 19. 30 | 62. 25 | 1. 1 |
| | 31 | 19. 45 | 62. 54 | |
| 16 | 32 | 20. 0 | 63. 22 | 0. 52 |
| | 33 | 20. 15 | 63. 46 | |
| 17 | 34 | 20. 30 | 64. 6 | 0. 44 |
| | 35 | 20. 45 | 64. 30 | |
| 18 | 36 | 21. 0 | 64. 49 | 0. 36 |
| | 37 | 21. 15 | 65. 6 | |
| 19 | 38 | 21. 30 | 65. 21 | 0. 29 |
| | 39 | 21. 45 | 65. 35 | |
| 20 | 40 | 22. 0 | 65. 47 | 0. 22 |
| | 41 | 22. 15 | 65. 57 | |
| 21 | 42 | 22. 30 | 66. 6 | 0. 17 |
| | 43 | 22. 45 | 66. 14 | |
| 22 | 44 | 23. 0 | 66. 20 | 0. 11 |
| | 45 | 23. 15 | 66. 25 | |
| 23 | 46 | 23. 30 | 66. 28 | 0. 5 |
| | 47 | 23. 45 | 66. 30 | |
| 24 | 48 | 24. 0 | 66. 30 | 0. 0 |
| Menfes. | | | | |
| | | 1 | 67. 15 | |
| | | 2 | 69. 30 | |
| | | 3 | 73. 20 | |
| | | 4 | 78. 20 | |
| | | 5 | 84. 0 | |
| | | 6 | 90. 0 | |

Constructio Tabulae XIII.

Climata pro I. Columna invenies juxta dicta fol. 140. & 246. Similiter de Parallelis intermediis pro II. Columna factum est fol. 139. Dies Longissimi in III. Columna pariter facile ordinantur, si incipiendo ab horis 12. uno semper quadrante augeantur usque ad horas 24. ut in Tabula factum vides. Pro IV. Columna verò Elevationes Poli Diebus Longissimis respondentes reperiuntur, si dimidium excessus ultra horas 12. convertatur in gradus Æquatoris, & operatio fiat, ut sequitur. Sit v.g. Dies Longissimus 12. hor. 15. min. excessus itaque ultra hor. 12. est 15. min. hujus verò dimidium erit $7\frac{1}{2}$. minut. horaria, quæ in gradus & min. Æquatoris ope Tabulae XVII. reda-

c / //

ta dant 1. 52. 30. His positis

L. T. Declin. Maximæ, & S. T. 1. 963830.

L. S. graduum inventorum -- 851479.

1. 112351.

residuum erit L. T. Compl. Alt. Poli 85. gr. 42. min. & consequenter Altitudo Poli quæ sita erit 4. gr 18. min. Latitudines denique Climatum pro V. Columna habebis, si secundam Elevationem Poli in superiori Loculamento positam subtrahas à secunda Elevatione Poli inferioris Loculamenti v. g. 4. 18. à 12. 43. prodibunt enim 8. 25.

Tabu-

*Tabula XIV. Angulorum Ecliptice
cum Meridiano.*

| | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 0 | 66. | 30 | 69. | 22 | 77. | 43 | 30 |
| 1 | 66. | 30 | 69. | 33 | 78. | 5 | 29 |
| 2 | 66. | 31 | 69. | 45 | 78. | 27 | 28 |
| 3 | 66. | 32 | 69. | 57 | 78. | 49 | 27 |
| 4 | 66. | 33 | 70. | 10 | 79. | 12 | 26 |
| 5 | 66. | 35 | 70. | 23 | 79. | 35 | 25 |
| 6 | 66. | 37 | 70. | 37 | 79. | 58 | 24 |
| 7 | 66. | 40 | 70. | 51 | 80. | 21 | 23 |
| 8 | 66. | 42 | 71. | 5 | 80. | 45 | 22 |
| 9 | 66. | 46 | 71. | 20 | 81. | 8 | 21 |
| 10 | 66. | 49 | 71. | 35 | 81. | 32 | 20 |
| 11 | 66. | 53 | 71. | 50 | 81. | 57 | 19 |
| 12 | 66. | 57 | 72. | 6 | 82. | 21 | 18 |
| 13 | 67. | 2 | 72. | 22 | 82. | 45 | 17 |
| 14 | 67. | 6 | 72. | 38 | 83. | 10 | 16 |
| 15 | 67. | 13 | 72. | 55 | 83. | 35 | 15 |
| 16 | 67. | 19 | 73. | 12 | 84. | 0 | 14 |
| 17 | 67. | 26 | 73. | 29 | 84. | 25 | 13 |
| 18 | 67. | 33 | 73. | 27 | 84. | 50 | 12 |
| 19 | 67. | 40 | 74. | 5 | 85. | 16 | 11 |
| 20 | 67. | 47 | 74. | 23 | 85. | 41 | 10 |
| 21 | 67. | 55 | 74. | 42 | 86. | 7 | 9 |
| 22 | 68. | 3 | 75. | 0 | 86. | 32 | 8 |
| 23 | 68. | 11 | 75. | 20 | 86. | 58 | 7 |
| 24 | 68. | 20 | 75. | 40 | 87. | 24 | 6 |
| 25 | 68. | 30 | 76. | 0 | 87. | 51 | 5 |
| 26 | 68. | 40 | 76. | 20 | 88. | 17 | 4 |
| 27 | 68. | 50 | 76. | 41 | 88. | 42 | 3 |
| 28 | 68. | 59 | 77. | 1 | 89. | 8 | 2 |
| 29 | 69. | 11 | 77. | 22 | 89. | 34 | 1 |
| 30 | 69. | 22 | 77. | 43 | 90. | 0 | 0 |
| | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ |

Constructio Tab. XIV.

Compl. Decl. max. est 66. gr. 30. min.
 Compl. Decl. datæ v. g. 23. Ω est 76. gr. 6.
 min. Jam
 S. T. & L. S. C. Declin. max. 1. 996239.
 L. S. C. Decl. datæ — 998709.

997530.

residuum erit L. S. Anguli Eclipticæ cum Me-
 $\circ \quad / \quad //$
 ridiano quæsitum 70. 51. 36. Plures mo-
 dos idipsum supputandi invenies in Probl.
 118. & seqq.

Tabula XV. Amplitudinis Ortiva.

| Gr. Declin. | Ad Elev. Poli 48. Gr. M. | Gr. Declin. | Ad Elev. Poli 48. Gr. M. | Gr. Declin. | Ad Elev. Poli 48. Gr. M. |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 1. 30 | 16 | 24. 20 | 31 | 50. 20 |
| 2 | 2. 59 | 17 | 25. 55 | 32 | 52. 22 |
| 3 | 4. 29 | 18 | 27. 30 | 33 | 54. 29 |
| 4 | 5. 59 | 19 | 29. 7 | 34 | 56. 41 |
| 5 | 7. 29 | 20 | 30. 45 | 35 | 59. 0 |
| 6 | 8. 59 | 21 | 32. 23 | 36 | 61. 27 |
| 7 | 10. 30 | 22 | 34. 3 | 37 | 64. 5 |
| 8 | 12. 0 | 23 | 35. 44 | 38 | 66. 56 |
| 9 | 13. 31 | 24 | 37. 26 | 39 | 70. 8 |
| 10 | 15. 2 | 25 | 39. 10 | 40 | 73. 52 |
| 11 | 16. 34 | 26 | 40. 56 | 41 | 78. 39 |
| 12 | 18. 6 | 27 | 42. 44 | 42 | 90. 0 |
| 13 | 19. 39 | 28 | 44. 34 | | |
| 14 | 21. 12 | 29 | 46. 26 | | |
| 15 | 22. 45 | 30 | 48. 21 | | |

Constructio Tab. XV.

In exemplo queritur Amplitudo Ortiva
 pro Declinatione \odot 15. gr. Itaque
 S. T. & L. S. Decl. \odot 1.941299.
 L. S. Compl. Alt. Poli — 982551.

958748.

qui est L. S. Amplit. quæsitæ, nim. 22. gr.
 45. min. & sic de reliquis.

Tabu-

Tabula XVI. Arcuum Horariorum

Pro Horizontalibus. Pro Verticalibus.

| H. | Q. | o | / | // | H. | Q. | o | / | // |
|-------|------|-----|-----|----|-------|------|-----|-----|----|
| X | II. | 0. | 0. | 0 | X | II. | 0. | 0. | 0 |
| 3 | I | 2. | 46. | 18 | 3 | I | 2. | 30. | 40 |
| 2 | 2 | 5. | 35. | 16 | 2 | 2 | 5. | 2. | 3 |
| 1 | 3 | 8. | 24. | 3 | 1 | 3 | 7. | 34. | 53 |
| XI. | I. | 11. | 15. | 42 | XI. | I. | 10. | 9. | 53 |
| 3 | I | 14. | 9. | 29 | 3 | I | 12. | 47. | 49 |
| 2 | 2 | 17. | 29. | 1 | 2 | 2 | 15. | 29. | 29 |
| 1 | 3 | 20. | 7. | 35 | 1 | 3 | 18. | 15. | 42 |
| X. | II. | 23. | 13. | 17 | X. | II. | 21. | 7. | 20 |
| 3 | I | 26. | 24. | 24 | 3 | I | 24. | 5. | 22 |
| 2 | 2 | 29. | 41. | 36 | 2 | 2 | 27. | 10. | 40 |
| 1 | 3 | 33. | 5. | 34 | 1 | 3 | 30. | 24. | 23 |
| IX. | III. | 36. | 37. | 4 | IX. | III. | 33. | 47. | 17 |
| 3 | I | 40. | 8. | 29 | 3 | I | 37. | 20. | 37 |
| 2 | 2 | 44. | 4. | 55 | 2 | 2 | 41. | 5. | 21 |
| 1 | 3 | 48. | 2. | 24 | 1 | 3 | 45. | 2. | 26 |
| VIII. | IV. | 52. | 9. | 23 | VIII. | IV. | 49. | 12. | 39 |
| 3 | I | 56. | 25. | 55 | 3 | I | 53. | 36. | 35 |
| 2 | 2 | 60. | 51. | 56 | 2 | 2 | 58. | 14. | 28 |
| 1 | 3 | 65. | 26. | 56 | 1 | 3 | 63. | 6. | 2 |
| VII. | V. | 70. | 10. | 21 | VII. | V. | 68. | 10. | 35 |
| 3 | I | 75. | 0. | 54 | 3 | I | 73. | 26. | 39 |
| 2 | 2 | 79. | 57. | 7 | 2 | 2 | 78. | 52. | 9 |
| 1 | 3 | 84. | 57. | 35 | 1 | 3 | 84. | 24. | 3 |
| V | I. | 90. | 9. | 0 | V | I. | 90. | 0. | 0 |

Constructio Tab. XVI.

Pro Horizontalibus.

L. T. Dist. ☉ à Meridie v. g. $5\frac{1}{4}$ hor.
 78. gr. 45. min. { 1070133. &
 L. S. A. P. { 987107.

S. T. 2057240.
 Residuum erit L. T. 1057240.

Arcus horæ quæsitæ, nim. 75. 0. 54.

Pro Verticalibus.

Sumitur L. S. C. A. P. cætera omnia fiunt
 ut supra.

Pro H. 5. Matutina, ac 7. Vespertina pro-
 ducuntur Lineæ harum horarum ultra Lineam
 H. 6. & sic H. 7. Matut. erit Vespertina, &
 H. 5. Vesp. fiet Matutina. Sic de aliis.

Tabula XVII. Conversionis Graduum in Tempus.

| Gr. | Hor. M. | Gr. | Hor. M. | | |
|-----|---------|------|---------|-----|---------|
| M. | M. S. | Min. | M. S. | | |
| S. | S. T. | Sec. | S. T. | Gr. | Hor. M. |
| 1 | 0. 4 | 31 | 2. 4 | 70 | 4. 40 |
| 2 | 0. 8 | 32 | 2. 8 | 80 | 5. 20 |
| 3 | 0. 12 | 33 | 2. 12 | 90 | 6. 0 |
| 4 | 0. 16 | 34 | 2. 16 | 100 | 6. 40 |
| 5 | 0. 20 | 35 | 2. 20 | 110 | 7. 20 |
| 6 | 0. 24 | 36 | 2. 24 | 120 | 8. 0 |
| 7 | 0. 28 | 37 | 2. 28 | 130 | 8. 40 |
| 8 | 0. 32 | 38 | 2. 32 | 140 | 9. 20 |
| 9 | 0. 36 | 39 | 2. 36 | 150 | 10. 0 |
| 10 | 0. 40 | 40 | 2. 40 | 160 | 10. 40 |
| 11 | 0. 44 | 41 | 2. 44 | 170 | 11. 20 |
| 12 | 0. 48 | 42 | 2. 48 | 180 | 12. 0 |
| 13 | 0. 52 | 43 | 2. 52 | 190 | 12. 40 |
| 14 | 0. 56 | 44 | 2. 56 | 200 | 13. 20 |
| 15 | 1. 0 | 45 | 3. 0 | 210 | 14. 0 |
| 16 | 1. 4 | 46 | 3. 4 | 220 | 14. 40 |
| 17 | 1. 8 | 47 | 3. 8 | 230 | 15. 20 |
| 18 | 1. 12 | 48 | 3. 12 | 240 | 16. 0 |
| 19 | 1. 16 | 49 | 3. 16 | 250 | 16. 40 |
| 20 | 1. 20 | 50 | 3. 20 | 260 | 17. 20 |
| 21 | 1. 24 | 51 | 3. 24 | 270 | 18. 0 |
| 22 | 1. 28 | 52 | 3. 28 | 280 | 18. 40 |
| 23 | 1. 32 | 53 | 3. 32 | 290 | 19. 20 |
| 24 | 1. 36 | 54 | 3. 36 | 300 | 20. 0 |
| 25 | 1. 40 | 55 | 3. 40 | 310 | 20. 40 |
| 26 | 1. 44 | 56 | 3. 44 | 320 | 21. 20 |
| 27 | 1. 48 | 57 | 3. 48 | 330 | 22. 0 |
| 28 | 1. 52 | 58 | 3. 52 | 340 | 22. 40 |
| 29 | 1. 56 | 59 | 3. 56 | 350 | 23. 20 |
| 30 | 2. 0 | 60 | 4. 0 | 360 | 24. 0 |

Constructio Tab. XVII.

Gradus *Æquatoris* convertuntur in horas computando 15. gradus pro una hora, & unum gradum pro 4. minutis horariis, consequenter 15. minuta unius gradus pro uno minuto horario, & 15. minuta secunda unius gradus pro uno secundo minuto horario, uti ex *Tabula* magis patebit.

Tabula XVIII. Refractionum Solis.

| Alt. ☉ | Refract. | Alt. ☉ | Refract. | Alt. ☉ | Refract. |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | / // | | / // | | / // |
| 0 | 34. 0 | 16 | 7. 0 | 31 | 1. 15 |
| 1 | 26. 0 | 17 | 6. 30 | 32 | 1. 5 |
| 2 | 20. 0 | 18 | 5. 45 | 33 | 0. 55 |
| 3 | 17. 0 | 19 | 5. 0 | 34 | 0. 45 |
| 4 | 15. 30 | 20 | 4. 30 | 35 | 0. 35 |
| 5 | 14. 30 | | | | |
| 6 | 13. 30 | 21 | 4. 0 | 36 | 0. 30 |
| 7 | 12. 45 | 22 | 3. 30 | 37 | 0. 25 |
| 8 | 11. 15 | 23 | 3. 10 | 38 | 0. 20 |
| 9 | 10. 30 | 24 | 2. 50 | 39 | 0. 15 |
| 10 | 10. 0 | 25 | 2. 30 | 40 | 0. 10 |
| 11 | 9. 30 | 26 | 2. 15 | 41 | 0. 9 |
| 12 | 9. 0 | 27 | 2. 0 | 42 | 0. 8 |
| 13 | 8. 30 | 28 | 1. 45 | 43 | 0. 7 |
| 14 | 8. 0 | 29 | 1. 35 | 44 | 0. 6 |
| 15 | 7. 30 | 30 | 1. 25 | 45 | 0. 5 |

Constructio Tab. XVIII.

Difficile admodum est, has ob continuam
Atmosphæræ alterationem pro omni tempo-
re & loco determinare : unde etiam Tycho non
tam Regulis, quàm longâ experienciâ adjutus
primus Refractionum Tabulâ construxit, pro
nostris potissimum Partibus Septentrionalibus
servientem, cui proinde consultius erit
acquiescere, quàm novam
condere.

Tabula XIX. Latitudinis, & Longitudinis quorundam Locorum.

| Nomina Locorum. | Ex R. P. Scherer S. J. & Mezzavacca. | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | Lat | Long | Lat | Long. |
| Aachen, Aquisgranū l. G. Inf. | 50.49 | 29.15 | 50.48 | 28. 0 |
| Adrianopolis in Thracia. | 43.17 | 51.44 | 43.12 | 51.45 |
| Amberga Palar. Super. | 49.30 | 34.32 | 49.28 | 34.20 |
| Amstelodamum Hollandiæ | 52.23 | 27.55 | 52.30 | 26.30 |
| Antiochia Syriæ | 35.34 | 65.40 | 37.20 | 70.15 |
| Athenæ Græciæ | 37.40 | 48.15 | 47.15 | 52.45 |
| Augsburg, Augusta Vindel. | 48.24 | 33.52 | 47.42 | 33. 0 |
| Bambergæ Franconiæ | 49.55 | 33.55 | 49.56 | 31.45 |
| Barcellona, Barcinum Hisp. | 41.26 | 23.46 | 41.30 | 18. 0 |
| Basilea Helvetiæ | 47.50 | 30.18 | 47.30 | 28.30 |
| Berolinum March. Brand. | 52.29 | 37.18 | 52.50 | 36.30 |
| Bononia Italiæ | 44.30 | 34.30 | 44.29 | 34.30 |
| Brandenburgū March. Bran. | 53.35 | 36.46 | 52.23 | 36.28 |
| Brema Saxon. Infer. | 53.10 | 31.46 | 53.12 | 31.15 |
| Bruslau Vratislavia Silesiæ. | 51.18 | 40. 0 | 51.10 | 39. 0 |
| Bruxellæ Brabantiæ | 51.48 | 27.12 | 50.48 | 27. 0 |
| Coblenz, Confluentia G. Inf. | 50.22 | 30.24 | 50.25 | 27.30 |
| Cöln, Colonia Agrip. G. Inf. | 50.52 | 30. 0 | 50.56 | 29. 0 |
| Compostella Hispan. | 42.56 | 12.21 | 42.30 | 10.30 |
| Copenhagen, Hafnia Dan. | 55.20 | 35.42 | 55.43 | 36.45 |
| Constantinopolis | 42.56 | 54.36 | 43. 5 | 55.30 |
| Constantia Sveciæ | 47.41 | 31.58 | 47.30 | 32.30 |
| Cracovia Poloniæ | 50.10 | 42.32 | 50.12 | 46. 0 |
| Dantiscum Prussiæ | 54.22 | 42.28 | 54.44 | 44.15 |
| Dresda Misniæ | 51. 6 | 37.10 | 51. 0 | 23.45 |
| Edimburgum Scotiæ | 56. 1 | 19.33 | 51.26 | 37.15 |
| Elbinga Prussiæ | 54.12 | 43.18 | 53.55 | 45.10 |
| Erfurdia Turingiæ | 51. 6 | 34.36 | 51. 7 | 34.40 |

| Nomina Locorum. | Ex R. P. Scherer S. J. & Mezzavacca. | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|
| | Lar. | Long. | Lar. | Long. |
| Ferraria Italix | 44.49 | 34.45 | 44.18 | 36. 0 |
| Florentia Hetrurix | 43.41 | 34.31 | 43.27 | 35.30 |
| Francofurtum ad Mœnum | 49.28 | 33.50 | 50. 4 | 30.30 |
| Francofurtum ad Oderam | 52. 9 | 38.12 | 52.30 | 39.30 |
| Friburgum Helvetix | 46.50 | 30.29 | 47.45 | 28.12 |
| Geldria Belgii | 50.33 | 29. 2 | 52.20 | 27.40 |
| Gent, Gandavum Flandrix | 51. 6 | 26.38 | 51.15 | 25.30 |
| Genua Italix | 44.33 | 32.14 | 44.27 | 31. 0 |
| Gratum Styrix | 47. 2 | 39.38 | 47.22 | 40. 0 |
| Hamburgum Holfatix | 53.42 | 33. 4 | 53.44 | 31.30 |
| Heidelberga Palat. Infer. | 49.22 | 31.30 | 49.20 | 32. 0 |
| Ingolstadium Bavarix | 48.40 | 34.23 | 48.38 | 34.30 |
| Lauretum Italix | 43.42 | 37. 6 | 43. 0 | 37. 0 |
| Leon, Legio Castillix | 42.56 | 16.32 | 42.15 | 21.10 |
| Livorno, Liburnus Italix | 43.10 | 33.32 | 42.10 | 34.30 |
| Lisabona Portugallix | 38.40 | 12. 0 | 39.38 | 9.10 |
| Lipsia Misnix | 51.19 | 36. 4 | 51.17 | 35. 0 |
| Londinum Anglix | 51.32 | 22.30 | 51.32 | 20.30 |
| Lovanium, Lœven Brabant | 50.50 | 27.35 | 50.50 | 26.45 |
| Lugdunum Gallix, Lion | 45.46 | 27.20 | 45.40 | 24. 0 |
| Lugdunū Batavorū Leyden | 52.12 | 27.25 | 52. 7 | 27.30 |
| Madritum Hispanix | 40.46 | 18.20 | 40.45 | 22.30 |
| Magdeburgum Saxonix | 52. 9 | 35.32 | 52.10 | 35.15 |
| Majorca Insula | 39.35 | 25.10 | 39.35 | 18.25 |
| Mantua Italix | 45.11 | 33.48 | 44.35 | 34.30 |
| Marfilia Gallix | 43.17 | 28.40 | 42.30 | 26. 0 |
| Mediolanum Italix | 45.14 | 32.10 | 44.50 | 30.30 |
| Messina Sicilix | 38.21 | 38.56 | 39. 0 | 42.45 |
| Mez, Metæ Lotbaringix | 49.10 | 29. 9 | 49.12 | 27.30 |
| Moguntia Franconiæ | 50. 4 | 31. 0 | 50. 0 | 30. 0 |
| Monachium Bavarix | 48. 0 | 34.32 | 48. 0 | 32.45 |

| Nomina Locorum | Ex R. P. Scherer S. J. & Mezzavacca. | | | |
|------------------------------|---|--------|--------|--------|
| | Lat | Long. | Lat | Long. |
| Münster, Monaster. Westph. | 52. 1 | 21. 1 | 51. 54 | 31. 10 |
| Mutina Modena Italiae | 44. 39 | 34. 6 | 44. 38 | 33. 56 |
| Namurcum in Belgio | 50. 26 | 27. 50 | 50. 30 | 24. 20 |
| Neapolis Italiae | 41. 5 | 38. 22 | 41. 0 | 40. 0 |
| Neoburgum Danubii | 48. 41 | 34. 17 | 48. 42 | 31. 45 |
| Norimberga Franconiae | 50. 4 | 31. 19 | 49. 24 | 34. 0 |
| Orleans, Aurelia Galliae | 47. 54 | 23. 47 | 47. 15 | 22. 20 |
| Ostenta, Flandriae | 51. 9 | 25. 41 | 51. 20 | 24. 15 |
| Pampelona Hispaniae | 43. 0 | 20. 52 | 42. 50 | 15. 0 |
| Paris, Lutetia Parisiorum | 48. 50 | 24. 30 | 48. 30 | 24. 0 |
| Parma Italiae | 44. 44 | 32. 26 | 43. 30 | 32. 30 |
| Passavium Austr. Super. | 48. 34 | 36. 32 | 48. 28 | 34. 0 |
| Paravium Italiae | 45. 30 | 34. 50 | 45. 10 | 35. 0 |
| Pesaro, Pisaurum Italiae | 44. 7 | 36. 5 | 43. 51 | 36. 30 |
| Piacenza, Placentia Italiae | 44. 52 | 32. 45 | 44. 0 | 31. 50 |
| Praga Bohemiae | 50. 5 | 37. 27 | 50. 6 | 36. 30 |
| Regensburg, Ratisb. Bav. | 48. 59 | 35. 0 | 49. 0 | 30. 0 |
| Remis Galliae | 49. 13 | 26. 44 | 48. 45 | 22. 15 |
| Roma Italiae | 42. 0 | 36. 18 | 42. 0 | 38. 30 |
| Rostochium Saxon. Infer. | 54. 10 | 35. 40 | 54. 5 | 36. 30 |
| Salisburgum | 47. 41 | 36. 20 | 47. 47 | 37. 50 |
| Salmantica Hispaniae | 40. 56 | 16. 18 | 41. 15 | 15. 0 |
| Siracusa Siciliae | 37. 3 | 38. 22 | 37. 15 | 41. 30 |
| Spira Imperialis Palat. Inf. | 49. 12 | 31. 10 | 49. 20 | 30. 40 |
| Stettinum Pomeraniae | 53. 30 | 37. 58 | 54. 0 | 37. 40 |
| Strasburg, Argentorac. Als. | 48. 31 | 30. 23 | 48. 30 | 29. 50 |
| Stulveissenb. Alba Reg. H. | 47. 18 | 41. 50 | 46. 48 | 42. 50 |
| Tolentinum Italiae | 43. 26 | 36. 22 | 43. 6 | 36. 40 |
| Tolosa Hispaniae | 43. 27 | 20. 4 | 43. 30 | 20. 0 |
| Tridentum Tyrolis | 46. 16 | 34. 0 | 45. 20 | 31. 40 |
| Trier, Treviri Germ. Inf. | 49. 50 | 29. 26 | 49. 55 | 27. 40 |
| Tubinga Sveciae | 48. 34 | 31. 50 | 48. 38 | 29. 40 |

| Nomina Locorum. | Ex R. P. Scherer S. J. & Mezzavacca. | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|
| | Lat. | Long. | Lat. | Long. |
| Turin-Taurinū Pedemon. | 44.50 | 30.46 | 44.40 | 29.30 |
| Valentia Hispaniæ | 39.31 | 22. 0 | 39.40 | 20. 0 |
| Venetia Italiæ | 45.27 | 35.10 | 45.20 | 35. 0 |
| Verona Italiæ | 45.33 | 33.57 | 44.50 | 34. 0 |
| Vicenna Austriæ | 48.22 | 40. 0 | 48.25 | 40. 0 |
| Ulma Sæviæ | 48.20 | 32.35 | 48.25 | 30.30 |
| Urbinum Italiæ | 43.53 | 35.54 | 43. 0 | 35.20 |
| Wittemberga Saxoniz | 51.48 | 36.36 | 51.54 | 35.45 |
| Wormatia Palat. Inf. | 49.41 | 31.10 | 49.44 | 28.30 |
| Würzburg, Herbip. Franc. | 49.45 | 32.45 | 49.58 | 30.30 |
| Zürch, Tigurum Helvetiz | 47.23 | 31.30 | 46.48 | 26.36 |

In tanta Authorum, præsertim circa Longitudines Locorum discrepantia, ex duorum insignium Virorum Tabulis magno studio confectis, præsentem excerptimus. Qui verò meliora se invenisse credit, eisdem sal-
vâ pace utatur.

Tabu.

*Tabula XX. quarundam Stellarum
insigniorum.*

| Nomina Stellarum. | Ascensio | Declina- | M |
|--------------------------|-----------|------------|----|
| | Recta. | natio | |
| | Gr. M. S. | Gr. M. S. | tu |
| Andromedæ caput | 358.14. 8 | 27.27.26.B | |
| Andromedæ cingulum | 13.11.20 | 34. 2.40.B | |
| Andromedæ pes Austrinus | 26.21.51 | 40.52.30.B | |
| Aquarii os piscis | 340.11. 0 | 31. 8.10.A | |
| Aquilæ Lucida | 294. 2.47 | 8. 1.20.B | |
| Aurigæ capella | 73.35.56 | 45.40. 0.B | |
| Aurigæ humerus dexter | 84.27.42 | 44.51.30.B | |
| Bootis Arcturus | 210.33. 2 | 20.48. 2 B | |
| Canis major, Sirius | 97.57. 6 | 16.18. 6.A | |
| Canicula, Procyon | 110.54.33 | 5.59.12 B | |
| Ceti mandibula lucida | 41.38. 7 | 2 53.50.B | |
| Ceti cauda Australis | 7. 5. 8 | 19.35 44.A | |
| Coronæ borealis lucida | 230.39. 0 | 25 45.20 B | |
| Cygni cauda | 307.47.17 | 44.14.52.B | |
| Geminorum Castoris caput | 108.50.46 | 32.30.26.B | |
| Pollucis caput | 111.43.36 | 28.43. 2.1 | |
| Geminorum pes lucidus | 95. 3.32 | 16.37 32.1 | |
| Hydræ cor | 138.12.22 | 7.21.30.1 | |
| Leonis cor | 148. 4.15 | 13.25.16.1 | |
| Leonis cauda | 175.25.34 | 16.14. 4.1 | |
| Leonis lucida Juba | 150.48.47 | 21.21. 0. | |
| Leonis lucida lumborum | 164.32.20 | 22. 7.44.1 | |
| Libræ lanx Borealis | 225.15.26 | 8.14.46. | |
| Libræ lanx Australis | 218.38.12 | 14.45.18. | |
| Lyræ lucida | 276.39.32 | 38.32.16. | |
| Orionis humerus dexter | 84.43. 4 | 7.18.20. | |
| Orionis humerus sinister | 77.16.40 | 6. 3. 2. | |
| Orionis pes Rigel | 75. 2 50 | 8.33.42. | |

| Nomina Stellarum. | Ascensio | Declina- | Ma- gni- tudo |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | Recta. Gr. M. S. | tio Gr. M. S. | |
| Orionis 1. Balthei | 79. 9. 48 | 0. 32. 50. A. | 2 |
| 2. Balthei | 80. 12. 54 | 1. 25. 46. A. | 2 |
| 3. Balthei | 81. 18. 25 | 2. 8. 20. A. | 2 |
| Pegasi crus Scheat | 342. 20. 36 | 26. 28. 38. B. | 2 |
| Pegasi Markab | 342. 28. 10 | 13. 35. 58. B. | 2 |
| Pegasi Algenib. | 359 27. 25 | 13. 32. 56. B. | 2 |
| Persei lucidum Iatus | 45. 32. 18 | 48. 44 54. B | 2 |
| Scorpii cor, Antares | 242. 47. 28 | 25. 39. 54. A. | 1 |
| Scorpii frons Borealis | 236. 58. 15 | 18. 53. 36 A. | 2 |
| Serpentis lucida colli | 232. 24. 0 | 7. 24. 36. B. | 2 |
| Tauri Aldebara | 64. 41. 35 | 15. 52. 10 B | 1 |
| Tauri cornu Boreum | 76. 51. 18 | 28. 19. 2. B. | 2 |
| Virginis spica | 197. 22. 55 | 9. 33. 30. B. | 1 |
| Ursæ majoris Dubhe | 161. 17. 5 | 63. 22. 2. B. | 2 |
| Lateris Lucida | 160. 52. 20 | 57. 59. 2 B | 2 |
| Post. coxæ Lucida | 174. 23. 34 | 55. 23. 42 B. | 2 |
| Ursæ majoris 1. Gaudæ | 190. 7. 56. | 57 36. 58. B. | 2 |
| 2. Gaudæ | 197. 55. 2. | 56 30. 52. B. | 2 |
| 3. in extremo caudæ | 203. 53. 50. | 50. 50. 56 B. | 2 |
| Ursæ min. ult. caud. Polaris | 9. 52. 10. | 87. 42. 5. B. | 2 |
| Ursæ minor, lucida hume- ri, olim Cynosura | 222. 39. 20 | 75. 37. 30. B | 2 |

TA.

TABULA

*Sinuum & Logarithmorum
per quinta quæque Minuta deducta,
& in gratiam se aliquantulum in istis exer-
cere volentium hîc
apposita.*

| Gr. | Min. | Sinus | Tang. | Log. Sin. | L. Tang. |
|-----|------|-------|-------|-----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 145 | 145 | 716269 | 716269 |
| | 10 | 290 | 290 | 746372 | 746372 |
| | 15 | 436 | 436 | 763981 | 763982 |
| | 20 | 581 | 581 | 776475 | 776476 |
| | 25 | 727 | 727 | 786166 | 786167 |
| | 30 | 872 | 872 | 794084 | 794085 |
| | 35 | 1018 | 1018 | 800778 | 800780 |
| | 40 | 1163 | 1163 | 806577 | 806580 |
| | 45 | 1308 | 1309 | 811692 | 811696 |
| | 50 | 1454 | 1454 | 816268 | 816272 |
| | 55 | 1599 | 1600 | 820407 | 820412 |
| 1 | 60 | 1745 | 1745 | 824185 | 824192 |
| | 5 | 1890 | 1891 | 827661 | 827669 |
| | 10 | 2036 | 2036 | 830879 | 830888 |
| | 15 | 2181 | 2182 | 833875 | 833885 |
| | 20 | 2326 | 2327 | 836677 | 836689 |
| | 25 | 2472 | 2473 | 839310 | 839323 |
| | 30 | 2617 | 2618 | 841791 | 841806 |
| | 35 | 2763 | 2764 | 844139 | 844156 |
| | 40 | 2908 | 2909 | 846366 | 846384 |
| | 45 | 3053 | 3055 | 848484 | 848505 |
| | 50 | 3199 | 3200 | 850504 | 850526 |
| | 55 | 3344 | 3346 | 852434 | 852458 |
| 2 | 60 | 3489 | 3492 | 854281 | 854308 |
| | 5 | 3635 | 3637 | 856054 | 856082 |
| | 10 | 3780 | 3783 | 857756 | 857787 |
| | 15 | 3925 | 3929 | 859394 | 859428 |
| | 20 | 4071 | 4074 | 860973 | 861009 |
| | 25 | 4216 | 4220 | 862496 | 862535 |
| | 30 | 4361 | 4366 | 863967 | 864009 |

| Gr. | Min. | Sinus | Tang. | Log.Sin. | L. Tang. |
|-----|------|--------|--------|----------|----------|
| 89 | 60 | 100000 | Infin. | 1000000 | Infin. |
| 88 | 55 | 99999 | 687548 | 999999 | 1283730 |
| | 50 | 99999 | 343773 | 999999 | 1253627 |
| | 45 | 99999 | 229181 | 999999 | 1236017 |
| | 40 | 99998 | 171885 | 999999 | 1223523 |
| | 35 | 99997 | 137507 | 999998 | 1213832 |
| | 30 | 99996 | 114588 | 999998 | 1205916 |
| | 25 | 99994 | 982179 | 999997 | 1199219 |
| | 20 | 99993 | 859397 | 999997 | 1193419 |
| | 15 | 99991 | 763900 | 999996 | 1188303 |
| | 10 | 99989 | 687500 | 999995 | 1183727 |
| | 5 | 99987 | 624991 | 999994 | 1179587 |
| | 0 | 99984 | 572899 | 999993 | 1175807 |
| | 55 | 99982 | 528821 | 999992 | 1172330 |
| | 50 | 99979 | 491038 | 999991 | 1169111 |
| | 45 | 99976 | 458293 | 999989 | 1166114 |
| | 40 | 99972 | 429640 | 999988 | 1163310 |
| | 35 | 99969 | 404358 | 999986 | 1160676 |
| | 30 | 99965 | 381884 | 999985 | 1158193 |
| | 25 | 99961 | 361775 | 999983 | 1155843 |
| | 20 | 99957 | 343677 | 999981 | 1153615 |
| | 15 | 99953 | 327302 | 999979 | 1151494 |
| | 10 | 99948 | 312415 | 999977 | 1149473 |
| | 5 | 99944 | 298822 | 999975 | 1147541 |
| | 0 | 99939 | 286362 | 999973 | 1145691 |
| 87 | 55 | 99933 | 274898 | 999971 | 1143917 |
| | 50 | 99928 | 264316 | 999968 | 1142212 |
| | 45 | 99922 | 254517 | 999966 | 1140571 |
| | 40 | 99917 | 245417 | 999963 | 1138990 |
| | 35 | 99911 | 236945 | 999961 | 1137464 |
| | 30 | 99904 | 229037 | 999958 | 1135990 |

| Gr. | Min. | Sinus | Tang. | Log.Sin. | L. Tang. |
|-----|------|-------|-------|----------|----------|
| | 30 | 4361 | 4566 | 863967 | 864009 |
| | 35 | 4507 | 4511 | 865391 | 865435 |
| | 40 | 4652 | 4657 | 866768 | 866815 |
| | 45 | 4797 | 4803 | 868104 | 868154 |
| | 50 | 4943 | 4949 | 869399 | 869452 |
| | 55 | 5088 | 5094 | 870657 | 870713 |
| 3 | 60 | 5233 | 5240 | 871880 | 871939 |
| | 5 | 5378 | 5386 | 873068 | 873131 |
| | 10 | 5524 | 5532 | 874225 | 874292 |
| | 15 | 5669 | 5678 | 875352 | 875422 |
| | 20 | 5814 | 5824 | 876451 | 876524 |
| | 25 | 5959 | 5970 | 877522 | 877599 |
| | 30 | 6104 | 6116 | 878567 | 878648 |
| | 35 | 6250 | 6262 | 879588 | 879673 |
| | 40 | 6395 | 6408 | 880585 | 880674 |
| | 45 | 6540 | 6554 | 881559 | 881652 |
| | 50 | 6685 | 6700 | 882512 | 882610 |
| | 55 | 6830 | 6846 | 883445 | 883547 |
| 4 | 60 | 6975 | 6992 | 884358 | 884464 |
| | 5 | 7120 | 7138 | 885252 | 885362 |
| | 10 | 7265 | 7285 | 886128 | 886243 |
| | 15 | 7410 | 7431 | 886986 | 887106 |
| | 20 | 7555 | 7577 | 887828 | 887952 |
| | 25 | 7700 | 7723 | 888654 | 888783 |
| | 30 | 7845 | 7870 | 889464 | 889598 |
| | 35 | 7990 | 8016 | 890259 | 890398 |
| | 40 | 8135 | 8162 | 891040 | 891184 |
| | 45 | 8280 | 8309 | 891807 | 891956 |
| | 50 | 8425 | 8455 | 892560 | 892715 |
| | 55 | 8570 | 8602 | 893301 | 893461 |
| 5 | 60 | 8715 | 8748 | 894029 | 894195 |

| Gr. | Min. | Sinus | Tang. | L.Sin. | L. Tang. |
|-----|------|-------|-------|--------|----------|
|-----|------|-------|-------|--------|----------|

| | | | | | |
|--|----|-------|--------|--------|---------|
| | 30 | 99904 | 229037 | 999998 | 1135990 |
|--|----|-------|--------|--------|---------|

86

| | | | | |
|----|-------|--------|--------|---------|
| 25 | 99898 | 221639 | 999955 | 1134564 |
| 20 | 99881 | 214704 | 999952 | 1133184 |
| 15 | 99884 | 208188 | 999949 | 1131845 |
| 10 | 99877 | 202055 | 999946 | 1130547 |
| 5 | 99870 | 196272 | 999943 | 1129286 |
| 0 | 99862 | 190811 | 999940 | 1128060 |
| 55 | 99855 | 185644 | 999937 | 1126868 |
| 50 | 99847 | 180449 | 999933 | 1125707 |
| 45 | 99839 | 176105 | 999930 | 1124577 |
| 40 | 99830 | 171693 | 999926 | 1123475 |
| 35 | 99822 | 167496 | 999922 | 1122400 |
| 30 | 99813 | 163498 | 999918 | 1121351 |

85

| | | | | |
|----|-------|--------|--------|---------|
| 25 | 99804 | 159686 | 999915 | 1120326 |
| 20 | 99795 | 156047 | 999911 | 1119325 |
| 15 | 99785 | 152570 | 999906 | 1118347 |
| 10 | 99776 | 149244 | 999902 | 1117389 |
| 5 | 99766 | 146059 | 999898 | 1116452 |
| 0 | 99756 | 143006 | 999894 | 1115535 |
| 55 | 99746 | 140078 | 999889 | 1114637 |
| 50 | 99735 | 137267 | 999885 | 1113756 |
| 45 | 99725 | 134566 | 999880 | 1112893 |
| 40 | 99714 | 131968 | 999875 | 1112047 |
| 35 | 99703 | 129469 | 999870 | 1111216 |
| 30 | 99691 | 127062 | 999865 | 1110401 |

84

| | | | | |
|----|-------|--------|--------|---------|
| 25 | 99680 | 124742 | 999860 | 1109601 |
| 20 | 99668 | 122505 | 999855 | 1108815 |
| 15 | 99656 | 120346 | 999850 | 1108043 |
| 10 | 99644 | 118261 | 999845 | 1107284 |
| 5 | 99632 | 116247 | 999839 | 1106538 |
| 0 | 99619 | 114300 | 999834 | 1105804 |

Mm 2

| G. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L.Tang. |
|----|----|-------|-------|---------|---------|
| 5 | 0 | 8715 | 8748 | 894029 | 894195 |
| 6 | 5 | 8860 | 8895 | 894745 | 894916 |
| | 10 | 9005 | 9042 | 895449 | 895626 |
| | 15 | 9150 | 9188 | 896142 | 896325 |
| | 20 | 9294 | 9335 | 896824 | 897013 |
| | 25 | 9439 | 9482 | 897496 | 897690 |
| | 30 | 9584 | 9628 | 898157 | 898357 |
| | 35 | 9729 | 9775 | 898808 | 899014 |
| | 40 | 9874 | 9922 | 899449 | 899662 |
| | 45 | 10018 | 10069 | 900081 | 900300 |
| | 50 | 10163 | 10216 | 900704 | 900929 |
| | 55 | 10308 | 10363 | 901318 | 901550 |
| | 60 | 10452 | 10510 | 901923 | 902162 |
| 7 | 5 | 10597 | 10657 | 902520 | 902765 |
| | 10 | 10742 | 10804 | 903108 | 903360 |
| | 15 | 10886 | 10951 | 903689 | 903948 |
| | 20 | 11031 | 11098 | 904262 | 904528 |
| | 25 | 11175 | 11246 | 904827 | 905100 |
| | 30 | 11320 | 11393 | 905385 | 905665 |
| | 35 | 11464 | 11540 | 905936 | 906224 |
| | 40 | 11609 | 11688 | 906480 | 906775 |
| | 45 | 11753 | 11835 | 907017 | 907319 |
| | 50 | 11898 | 11983 | 907547 | 907857 |
| | 55 | 12042 | 12133 | 908071 | 908389 |
| | 60 | 12186 | 12278 | 908589 | 908914 |
| | 5 | 12331 | 12426 | 909100 | 909433 |
| | 10 | 12475 | 12573 | 909606 | 909946 |
| | 15 | 12619 | 12721 | 910105 | 910454 |
| | 20 | 12764 | 12869 | 910599 | 910955 |
| | 25 | 12908 | 13017 | 911087 | 911452 |
| | 30 | 13052 | 13165 | 911569 | 911942 |

| G. | Min. | Sinus | Tang. | Log.Sin. | L. Tang. |
|----|------|-------|--------|----------|----------|
| 84 | 60 | 99619 | 114300 | 999834 | 1105804 |
| | 55 | 99606 | 112417 | 999828 | 1105083 |
| | 50 | 99593 | 110594 | 999823 | 1104373 |
| | 45 | 99580 | 108829 | 999817 | 1103674 |
| | 40 | 99567 | 107119 | 999811 | 1102986 |
| | 35 | 99553 | 105461 | 999805 | 1102309 |
| | 30 | 99539 | 103853 | 999799 | 1101642 |
| | 25 | 99525 | 102294 | 999793 | 1100985 |
| | 20 | 99511 | 100780 | 999787 | 1100337 |
| | 15 | 99496 | 993100 | 999780 | 1099699 |
| | 10 | 99482 | 978817 | 999774 | 1099070 |
| | 5 | 99467 | 964934 | 999768 | 1098449 |
| 83 | 0 | 99452 | 951436 | 999761 | 1097837 |
| | 55 | 99436 | 938306 | 999754 | 1097234 |
| | 50 | 99421 | 925530 | 999747 | 1096639 |
| | 45 | 99405 | 913093 | 999741 | 1096051 |
| | 40 | 99389 | 900982 | 999734 | 1095471 |
| | 35 | 99373 | 889185 | 999727 | 1094899 |
| | 30 | 99357 | 877688 | 999719 | 1094334 |
| | 25 | 99340 | 866482 | 999712 | 1093775 |
| | 20 | 99323 | 855554 | 999705 | 1093224 |
| | 15 | 99306 | 844895 | 999697 | 1092680 |
| | 10 | 99289 | 834495 | 999690 | 1092142 |
| | 5 | 99272 | 824344 | 999682 | 1091610 |
| 82 | 0 | 99254 | 814434 | 999675 | 1091085 |
| | 55 | 99236 | 804756 | 999667 | 1090566 |
| | 50 | 99218 | 795302 | 999659 | 1090053 |
| | 45 | 99200 | 786064 | 999651 | 1089545 |
| | 40 | 99182 | 777035 | 999643 | 1089044 |
| | 35 | 99163 | 768207 | 999635 | 1088547 |
| | 30 | 99144 | 759575 | 999626 | 1088057 |

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|-------|---------|----------|
| | 30 | 13052 | 13165 | 911569 | 911942 |
| 8 | 35 | 13196 | 13313 | 912046 | 912428 |
| | 40 | 13340 | 13461 | 912518 | 912908 |
| | 45 | 13485 | 13609 | 912985 | 913383 |
| | 50 | 13629 | 13757 | 913447 | 913854 |
| | 55 | 13773 | 13905 | 913903 | 914319 |
| | 60 | 13917 | 14054 | 914355 | 914780 |
| | 5 | 14061 | 14202 | 914802 | 915236 |
| | 10 | 14205 | 14350 | 915245 | 915687 |
| | 15 | 14349 | 14499 | 915682 | 916134 |
| | 20 | 14493 | 14647 | 916116 | 916577 |
| 9 | 25 | 14637 | 14796 | 916545 | 917015 |
| | 30 | 14780 | 14945 | 916970 | 917449 |
| | 35 | 14924 | 15093 | 917390 | 917879 |
| | 40 | 15068 | 15242 | 917807 | 918305 |
| | 45 | 15212 | 15391 | 918219 | 918728 |
| | 50 | 15356 | 15540 | 918628 | 919146 |
| | 55 | 15499 | 15689 | 919032 | 919560 |
| | 60 | 15643 | 15838 | 919433 | 919971 |
| | 5 | 15787 | 15987 | 919830 | 920378 |
| | 10 | 15930 | 16136 | 920223 | 920781 |
| 10 | 15 | 16074 | 16286 | 920613 | 921181 |
| | 20 | 16217 | 16435 | 920999 | 921577 |
| | 25 | 16361 | 16584 | 921381 | 921970 |
| | 30 | 16504 | 16734 | 921760 | 922360 |
| | 35 | 16648 | 16883 | 922136 | 922747 |
| | 40 | 16791 | 17033 | 922509 | 923130 |
| | 45 | 16934 | 17183 | 922878 | 923510 |
| | 50 | 17078 | 17332 | 923244 | 923887 |
| | 55 | 17221 | 17482 | 923607 | 924261 |
| | 60 | 17364 | 17632 | 923967 | 924631 |

| Gr.) | Min. | Sinus | Tang. | Log.Sin. | L.Tang. |
|------|------|-------|--------|----------|---------|
| | 30 | 99144 | 749575 | 999626 | 1088057 |
| 81 | 25 | 99125 | 751131 | 999618 | 1087571 |
| | 20 | 99106 | 742870 | 999610 | 1087091 |
| | 15 | 99086 | 734786 | 999601 | 1086616 |
| | 10 | 99066 | 726872 | 999592 | 1086145 |
| | 5 | 99046 | 719124 | 999584 | 1085680 |
| | 0 | 99026 | 711536 | 999575 | 1085219 |
| | 55 | 99006 | 704104 | 999566 | 1084763 |
| | 50 | 98985 | 696823 | 999557 | 1084312 |
| | 45 | 98965 | 689687 | 999548 | 1083865 |
| | 40 | 98944 | 682694 | 999539 | 1083422 |
| 80 | 35 | 98922 | 675838 | 999529 | 1082984 |
| | 30 | 98901 | 669115 | 999520 | 1082550 |
| | 25 | 98879 | 662522 | 999510 | 1082120 |
| | 20 | 98858 | 656055 | 999501 | 1081694 |
| | 15 | 98836 | 649710 | 999491 | 1081271 |
| | 10 | 98813 | 643484 | 999481 | 1080853 |
| | 5 | 98791 | 637373 | 999471 | 1080439 |
| | 0 | 98768 | 631375 | 999461 | 1080028 |
| | 55 | 98745 | 625485 | 999451 | 1079621 |
| | 50 | 98722 | 619702 | 999441 | 1079218 |
| 79 | 45 | 98699 | 614023 | 999431 | 1078818 |
| | 40 | 98676 | 608443 | 999421 | 1078422 |
| | 35 | 98652 | 602962 | 999410 | 1078029 |
| | 30 | 98628 | 597576 | 999400 | 1077639 |
| | 25 | 98604 | 592283 | 999389 | 1077252 |
| | 20 | 98580 | 587080 | 999378 | 1076869 |
| | 15 | 98555 | 581965 | 999368 | 1076489 |
| | 10 | 98530 | 576936 | 999357 | 1076112 |
| | 5 | 98505 | 571991 | 999346 | 1075738 |
| | 0 | 98480 | 567128 | 999335 | 1075368 |

| Gr. Min. | | Sinus | Tang. | Log. Sin. | L. Tang. |
|----------|----|-------|-------|-----------|----------|
| 101 | 0 | 17364 | 17632 | 923967 | 924631 |
| | 5 | 17508 | 17782 | 924323 | 924999 |
| | 10 | 17651 | 17932 | 924677 | 925364 |
| | 15 | 17794 | 18082 | 925028 | 925726 |
| | 20 | 17937 | 18233 | 925376 | 926086 |
| | 25 | 18080 | 18383 | 925721 | 926442 |
| | 30 | 18223 | 18533 | 926063 | 926796 |
| | 35 | 18366 | 18684 | 926402 | 927147 |
| | 40 | 18509 | 18834 | 926739 | 927496 |
| | 45 | 18652 | 18985 | 927073 | 927842 |
| | 50 | 18795 | 19136 | 927404 | 928185 |
| | 55 | 18938 | 19287 | 927733 | 928526 |
| I1 | 60 | 19080 | 19438 | 928059 | 928865 |
| | 5 | 19223 | 19589 | 928383 | 929201 |
| | 10 | 19366 | 19740 | 928704 | 929534 |
| | 15 | 19509 | 19891 | 929023 | 929866 |
| | 20 | 19651 | 20042 | 929339 | 930195 |
| | 25 | 19794 | 20193 | 929653 | 930521 |
| | 30 | 19936 | 20345 | 929965 | 930846 |
| | 35 | 20079 | 20496 | 930274 | 931168 |
| | 40 | 20221 | 20648 | 930581 | 931488 |
| | 45 | 20364 | 20800 | 930886 | 931806 |
| | 50 | 20506 | 20951 | 931189 | 932122 |
| | 55 | 20648 | 21103 | 931489 | 932435 |
| I2 | 60 | 20791 | 21255 | 931787 | 932747 |
| | 5 | 20933 | 21407 | 932084 | 933057 |
| | 10 | 21075 | 21559 | 932378 | 933364 |
| | 15 | 21217 | 21712 | 932669 | 933670 |
| | 20 | 21359 | 21864 | 932959 | 933973 |
| | 25 | 21501 | 22016 | 933247 | 934275 |
| | 30 | 21643 | 22169 | 933533 | 934575 |

| G. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|----|----|-------|--------|---------|----------|
| 79 | 60 | 98480 | 567128 | 999335 | 1075368 |
| | 55 | 98455 | 562344 | 999323 | 1075000 |
| | 50 | 98429 | 557637 | 999312 | 1074635 |
| | 45 | 98404 | 553007 | 999301 | 1074273 |
| | 40 | 98378 | 548450 | 999289 | 1073913 |
| | 35 | 98351 | 543965 | 999278 | 1073557 |
| | 30 | 98325 | 539551 | 999266 | 1073203 |
| | 25 | 98298 | 535206 | 999254 | 1072852 |
| | 20 | 98272 | 530927 | 999243 | 1072503 |
| | 15 | 98245 | 526715 | 999231 | 1072157 |
| | 10 | 98217 | 522566 | 999219 | 1071814 |
| 78 | 5 | 98190 | 518480 | 999206 | 1071473 |
| | 0 | 98162 | 514455 | 999194 | 1071134 |
| | 55 | 98134 | 510490 | 999182 | 1070798 |
| | 50 | 98106 | 506583 | 999169 | 1070465 |
| | 45 | 98078 | 502733 | 999157 | 1070133 |
| | 40 | 98050 | 498940 | 999144 | 1069804 |
| | 35 | 98021 | 495201 | 999132 | 1069478 |
| | 30 | 97992 | 491515 | 999119 | 1069153 |
| | 25 | 97963 | 487882 | 999106 | 1068831 |
| | 20 | 97934 | 484300 | 999093 | 1068511 |
| | 15 | 97904 | 480768 | 999080 | 1068193 |
| | 10 | 97874 | 477285 | 999067 | 1067877 |
| | 5 | 97844 | 473850 | 999053 | 1067564 |
| 77 | 0 | 97814 | 470463 | 999040 | 1067252 |
| | 55 | 97784 | 467121 | 999026 | 1066942 |
| | 50 | 97753 | 463824 | 999013 | 1066635 |
| | 45 | 97723 | 460572 | 998999 | 1066329 |
| | 40 | 97692 | 457362 | 998985 | 1066026 |
| | 35 | 97660 | 454196 | 998972 | 1065724 |
| | 30 | 97629 | 451070 | 998958 | 1065424 |

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|-------|---------|----------|
| | 30 | 21643 | 22169 | 933533 | 93457 |
| 13 | 35 | 21785 | 22322 | 933817 | 934873 |
| | 40 | 21927 | 22474 | 934099 | 935169 |
| | 45 | 22069 | 22627 | 934379 | 935464 |
| | 50 | 22211 | 22780 | 934657 | 935756 |
| | 55 | 22353 | 22933 | 934934 | 936047 |
| | 60 | 22495 | 23086 | 935208 | 936336 |
| | 5 | 22636 | 23240 | 935481 | 936623 |
| | 10 | 22778 | 23393 | 935752 | 936909 |
| | 15 | 22920 | 23546 | 936021 | 937193 |
| | 20 | 23061 | 23700 | 936288 | 937475 |
| 14 | 25 | 23203 | 23854 | 936554 | 937756 |
| | 30 | 23344 | 24007 | 936818 | 938035 |
| | 35 | 23485 | 24161 | 937080 | 938312 |
| | 40 | 23627 | 24315 | 937341 | 938588 |
| | 45 | 23768 | 24469 | 937600 | 938863 |
| | 50 | 23909 | 24624 | 937857 | 939135 |
| | 55 | 24051 | 24778 | 938113 | 939407 |
| | 60 | 24192 | 24932 | 938367 | 939677 |
| | 5 | 24333 | 25087 | 938620 | 939945 |
| | 10 | 24474 | 25242 | 938871 | 940212 |
| 15 | 15 | 24615 | 25396 | 939120 | 940477 |
| | 20 | 24756 | 25551 | 939368 | 940741 |
| | 25 | 24897 | 25706 | 939614 | 941004 |
| | 30 | 25038 | 25861 | 939859 | 941265 |
| | 35 | 25178 | 26016 | 940103 | 941525 |
| | 40 | 25319 | 26172 | 940345 | 941784 |
| | 45 | 25460 | 26327 | 940586 | 942041 |
| | 50 | 25600 | 26483 | 940825 | 942297 |
| | 55 | 25741 | 26639 | 941063 | 942551 |
| | 60 | 25881 | 26794 | 941299 | 942805 |

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|--------|---------|----------|
| | 30 | 27629 | 451070 | 228258 | 1065424 |
| 76 | 25 | 27598 | 447986 | 228244 | 1065126 |
| | 20 | 27566 | 444941 | 228229 | 1064830 |
| | 15 | 27534 | 441936 | 228215 | 1064535 |
| | 10 | 27502 | 438969 | 228201 | 1064243 |
| | 5 | 27469 | 436040 | 228186 | 1063952 |
| | 0 | 27437 | 433147 | 228172 | 1063663 |
| | 55 | 27404 | 430291 | 228157 | 1063376 |
| | 50 | 27371 | 427470 | 228143 | 1063090 |
| | 45 | 27337 | 424684 | 228128 | 1062806 |
| | 40 | 27304 | 421933 | 228113 | 1062524 |
| 75 | 35 | 27270 | 419215 | 228098 | 1062243 |
| | 30 | 27236 | 416529 | 228083 | 1061964 |
| | 25 | 27202 | 413877 | 228067 | 1061687 |
| | 20 | 27168 | 411256 | 228052 | 1061411 |
| | 15 | 27134 | 408666 | 228037 | 1061136 |
| | 10 | 27099 | 406107 | 228021 | 1060864 |
| | 5 | 27064 | 403577 | 228006 | 1060592 |
| | 0 | 27029 | 401078 | 227990 | 1060322 |
| | 55 | 26994 | 398607 | 227974 | 1060054 |
| | 50 | 26958 | 396165 | 227958 | 1059787 |
| 74 | 45 | 26923 | 393750 | 227942 | 1059522 |
| | 40 | 26887 | 391364 | 227926 | 1059258 |
| | 35 | 26851 | 389004 | 227910 | 1058995 |
| | 30 | 26814 | 386671 | 227894 | 1058734 |
| | 25 | 26778 | 384364 | 227877 | 1058474 |
| | 20 | 26741 | 382082 | 227861 | 1058215 |
| | 15 | 26704 | 379826 | 227844 | 1057958 |
| | 10 | 26667 | 377595 | 227828 | 1057702 |
| | 5 | 26630 | 375388 | 227811 | 1057448 |
| | 0 | 26592 | 373205 | 227794 | 1057194 |

| Gr.] | M.] | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|------|-----|-------|-------|---------|----------|
| 15 | 0 | 25881 | 26794 | 941299 | 942805 |
| | 5 | 26022 | 26950 | 941534 | 943057 |
| | 10 | 26162 | 27106 | 941768 | 943308 |
| | 15 | 26303 | 27263 | 942000 | 943557 |
| | 20 | 26443 | 27419 | 942231 | 943805 |
| | 25 | 26583 | 27575 | 942461 | 944052 |
| | 30 | 26723 | 27732 | 942689 | 944298 |
| | 35 | 26863 | 27889 | 942917 | 944543 |
| | 40 | 27004 | 28045 | 943142 | 944787 |
| | 45 | 27144 | 28202 | 943367 | 945029 |
| | 50 | 27284 | 28359 | 943590 | 945270 |
| | 55 | 27423 | 28517 | 943812 | 945510 |
| 16 | 60 | 27563 | 28674 | 944033 | 945749 |
| | 5 | 27703 | 28832 | 944253 | 945987 |
| | 10 | 27843 | 28989 | 944471 | 946224 |
| | 15 | 27982 | 29147 | 944689 | 946459 |
| | 20 | 28122 | 29305 | 944905 | 946694 |
| | 25 | 28262 | 29463 | 945120 | 946928 |
| | 30 | 28401 | 29621 | 945334 | 947160 |
| | 35 | 28540 | 29779 | 945546 | 947391 |
| | 40 | 28680 | 29938 | 945758 | 947622 |
| | 45 | 28819 | 30096 | 945968 | 947851 |
| | 50 | 28958 | 30255 | 946178 | 948080 |
| | 55 | 29098 | 30414 | 946386 | 948307 |
| 17 | 60 | 29237 | 30573 | 946593 | 948533 |
| | 5 | 29376 | 30732 | 946799 | 948759 |
| | 10 | 29515 | 30891 | 947004 | 948983 |
| | 15 | 29654 | 31050 | 947208 | 949207 |
| | 20 | 29793 | 31210 | 947411 | 949429 |
| | 25 | 29931 | 31370 | 947613 | 949651 |
| | 30 | 30070 | 31529 | 947814 | 949872 |

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|--------|---------|----------|
| 74 | 60 | 96592 | 373205 | 998494 | 1057194 |
| | 55 | 96554 | 371045 | 998477 | 1056942 |
| | 50 | 96516 | 368909 | 998460 | 1056691 |
| | 45 | 96478 | 366795 | 998443 | 1056442 |
| | 40 | 96440 | 364704 | 998425 | 1056194 |
| | 35 | 96401 | 362635 | 998408 | 1055947 |
| | 30 | 96363 | 360588 | 998391 | 1055701 |
| | 25 | 96324 | 358562 | 998373 | 1055456 |
| | 20 | 96284 | 356557 | 998355 | 1055212 |
| | 15 | 96245 | 354573 | 998338 | 1054970 |
| | 10 | 96205 | 352609 | 998320 | 1054729 |
| | 5 | 96166 | 350665 | 998302 | 1054489 |
| 73 | 0 | 96126 | 348741 | 998284 | 1054250 |
| | 55 | 96085 | 346836 | 998266 | 1054012 |
| | 50 | 96045 | 344951 | 998247 | 1053775 |
| | 45 | 96004 | 343084 | 998229 | 1053540 |
| | 40 | 95964 | 341236 | 998210 | 1053305 |
| | 35 | 95923 | 339406 | 998192 | 1053071 |
| | 30 | 95881 | 337594 | 998173 | 1052839 |
| | 25 | 95840 | 335800 | 998154 | 1052608 |
| | 20 | 95798 | 334023 | 998136 | 1052377 |
| | 15 | 95757 | 332263 | 998117 | 1052148 |
| | 10 | 95715 | 330520 | 998098 | 1051919 |
| | 5 | 95672 | 328794 | 998078 | 1051692 |
| 72 | 0 | 95630 | 327085 | 998059 | 1051466 |
| | 55 | 95587 | 325391 | 998040 | 1051240 |
| | 50 | 95545 | 323714 | 998020 | 1051016 |
| | 45 | 95501 | 322052 | 998001 | 1050792 |
| | 40 | 95458 | 320406 | 997981 | 1050570 |
| | 35 | 95415 | 318775 | 997961 | 1050348 |
| | 30 | 95371 | 317159 | 997941 | 1050127 |

| G. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|----|----|-------|-------|---------|----------|
| | 30 | 30070 | 31529 | 947814 | 949872 |
| 18 | 35 | 30209 | 31689 | 948014 | 950092 |
| | 40 | 30347 | 31849 | 948212 | 950310 |
| | 45 | 30486 | 32010 | 948410 | 950528 |
| | 50 | 30624 | 32170 | 948607 | 950746 |
| | 55 | 30763 | 32331 | 948803 | 950962 |
| | 60 | 30901 | 32491 | 948998 | 951177 |
| | 5 | 31039 | 32652 | 949192 | 951392 |
| | 10 | 31178 | 32813 | 949385 | 951605 |
| | 15 | 31316 | 32975 | 949577 | 951818 |
| | 20 | 31454 | 33136 | 949768 | 952030 |
| 19 | 25 | 31592 | 33297 | 949958 | 952241 |
| | 30 | 31730 | 33459 | 950147 | 952451 |
| | 35 | 31868 | 33621 | 950335 | 952661 |
| | 40 | 32006 | 33783 | 950523 | 952870 |
| | 45 | 32143 | 33945 | 950709 | 953078 |
| | 50 | 32281 | 34107 | 950896 | 953285 |
| | 55 | 32419 | 34270 | 951080 | 953491 |
| | 60 | 32556 | 34432 | 951264 | 953697 |
| | 5 | 32694 | 34595 | 951447 | 953902 |
| | 10 | 32831 | 34758 | 951629 | 954106 |
| 20 | 15 | 32969 | 34921 | 951810 | 954309 |
| | 20 | 33106 | 35084 | 951991 | 954511 |
| | 25 | 33243 | 35248 | 952170 | 954713 |
| | 30 | 33380 | 35411 | 952349 | 954914 |
| | 35 | 33517 | 35575 | 952527 | 955115 |
| | 40 | 33654 | 35739 | 952704 | 955314 |
| | 45 | 33791 | 35903 | 952880 | 955513 |
| | 50 | 33928 | 36067 | 953056 | 955712 |
| | 55 | 34065 | 36232 | 953231 | 955909 |
| | 60 | 34202 | 36397 | 953405 | 956106 |

Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang.

| 30 | 95371 | 317159 | 997941 | 1050127

| | | | | | |
|----|----|-------|--------|--------|---------|
| 71 | 25 | 95327 | 315558 | 997921 | 1049907 |
| | 20 | 95283 | 313971 | 997901 | 1049687 |
| | 15 | 95239 | 312399 | 997881 | 1049471 |
| | 10 | 95195 | 310842 | 997861 | 1049253 |
| | 5 | 95150 | 309298 | 997841 | 1049037 |
| | 0 | 95105 | 307768 | 997820 | 1048822 |
| | 55 | 95060 | 306252 | 997800 | 1048607 |
| | 50 | 95015 | 304749 | 997779 | 1048394 |
| | 45 | 94969 | 303259 | 997758 | 1048181 |
| | 40 | 94924 | 301783 | 997737 | 1047969 |
| 70 | 35 | 94878 | 300319 | 997716 | 1047758 |
| | 30 | 94832 | 298868 | 997695 | 1047548 |
| | 25 | 94786 | 297430 | 997674 | 1047338 |
| | 20 | 94739 | 296004 | 997653 | 1047129 |
| | 15 | 94693 | 294590 | 997631 | 1046921 |
| | 10 | 94646 | 293188 | 997610 | 1046714 |
| | 5 | 94599 | 291799 | 997588 | 1046508 |
| | 0 | 94551 | 290421 | 997567 | 1046302 |
| | 55 | 94504 | 289054 | 997545 | 1046098 |
| | 50 | 94456 | 287699 | 997523 | 1045893 |
| 69 | 45 | 94408 | 286356 | 997501 | 1045690 |
| | 40 | 94360 | 285023 | 997479 | 1045488 |
| | 35 | 94312 | 283701 | 997456 | 1045286 |
| | 30 | 94264 | 282391 | 997434 | 1045085 |
| | 25 | 94215 | 281091 | 997412 | 1044884 |
| | 20 | 94166 | 279801 | 997389 | 1044685 |
| | 15 | 94117 | 278523 | 997367 | 1044486 |
| | 10 | 94068 | 277254 | 997344 | 1044287 |
| | 5 | 94018 | 275996 | 997321 | 1044090 |
| | 0 | 93969 | 274747 | 997298 | 1043893 |

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|-------|---------|----------|
| 20 | 0 | 34202 | 36397 | 953475 | 956106 |
| | 5 | 34338 | 36561 | 953578 | 956302 |
| | 10 | 34475 | 36726 | 953750 | 956498 |
| | 15 | 34611 | 36891 | 953922 | 956695 |
| | 20 | 34748 | 37057 | 954093 | 956887 |
| | 25 | 34884 | 37222 | 954263 | 957080 |
| | 30 | 35020 | 37388 | 954432 | 957273 |
| | 35 | 35156 | 37554 | 954601 | 957466 |
| | 40 | 35293 | 37720 | 954768 | 957657 |
| | 45 | 35429 | 37886 | 954936 | 957848 |
| | 50 | 35565 | 38053 | 955102 | 958038 |
| | 55 | 35700 | 38219 | 955268 | 958228 |
| 21 | 60 | 35836 | 38386 | 955432 | 958417 |
| | 5 | 35972 | 38553 | 955597 | 958606 |
| | 10 | 36108 | 38720 | 955760 | 958794 |
| | 15 | 36243 | 38887 | 955923 | 958981 |
| | 20 | 36379 | 39055 | 956085 | 959168 |
| | 25 | 36514 | 39223 | 956246 | 959354 |
| | 30 | 36650 | 39391 | 956407 | 959539 |
| | 35 | 36785 | 39559 | 956567 | 959724 |
| | 40 | 36920 | 39727 | 956726 | 959909 |
| | 45 | 37055 | 39895 | 956885 | 960092 |
| | 50 | 37190 | 40064 | 957043 | 960276 |
| | 55 | 37325 | 40233 | 957200 | 960458 |
| 22 | 60 | 37460 | 40402 | 957357 | 960640 |
| | 5 | 37595 | 40571 | 957513 | 960822 |
| | 10 | 37730 | 40741 | 957668 | 961003 |
| | 15 | 37864 | 40911 | 957823 | 961184 |
| | 20 | 37999 | 41080 | 957977 | 961364 |
| | 25 | 38133 | 41251 | 958131 | 961543 |
| | 30 | 38268 | 41421 | 958283 | 961722 |

| G. | Min. | Sinus | Tang. | Log.Sin. | L. Tang. |
|----|------|-------|--------|----------|----------|
| 69 | 60 | 93969 | 274747 | 997298 | 1043893 |
| | 55 | 93919 | 273509 | 997275 | 1043697 |
| | 50 | 93869 | 272280 | 997252 | 1043501 |
| | 45 | 93819 | 271061 | 997229 | 1043306 |
| | 40 | 93768 | 269852 | 997205 | 1043112 |
| | 35 | 93718 | 268652 | 997182 | 1042919 |
| | 30 | 93667 | 267462 | 997158 | 1042726 |
| | 25 | 93616 | 266280 | 997135 | 1042533 |
| | 20 | 93564 | 265108 | 997111 | 1042342 |
| | 15 | 93513 | 263945 | 997087 | 1042152 |
| | 10 | 93461 | 262791 | 997063 | 1041961 |
| | 5 | 93410 | 261645 | 997039 | 1041771 |
| 68 | 0 | 93358 | 260508 | 997015 | 1041582 |
| | 55 | 93305 | 259380 | 996990 | 1041393 |
| | 50 | 93253 | 258260 | 996966 | 1041205 |
| | 45 | 93200 | 257149 | 996941 | 1041018 |
| | 40 | 93147 | 256046 | 996917 | 1040831 |
| | 35 | 93094 | 254951 | 996892 | 1040645 |
| | 30 | 93041 | 253864 | 996867 | 1040460 |
| | 25 | 92988 | 252785 | 996842 | 1040275 |
| | 20 | 92934 | 251715 | 996817 | 1040090 |
| | 15 | 92880 | 250651 | 996792 | 1039907 |
| | 10 | 92826 | 249596 | 996767 | 1039723 |
| | 5 | 92772 | 248548 | 996742 | 1039541 |
| 67 | 0 | 92718 | 247508 | 996716 | 1039359 |
| | 55 | 92663 | 246475 | 996691 | 1039177 |
| | 50 | 92609 | 245450 | 996665 | 1038996 |
| | 45 | 92554 | 244432 | 996639 | 1038815 |
| | 40 | 92498 | 243421 | 996613 | 1038635 |
| | 35 | 92443 | 242418 | 996587 | 1038456 |
| | 30 | 92387 | 241421 | 996561 | 1038277 |

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|-------|---------|----------|
| | 30 | 38268 | 41421 | 958283 | 961722 |
| | 35 | 38402 | 41591 | 958436 | 961900 |
| | 40 | 38536 | 41762 | 958587 | 962078 |
| | 45 | 38671 | 41933 | 958738 | 962256 |
| | 50 | 38805 | 42104 | 958888 | 962432 |
| | 55 | 38939 | 42275 | 959038 | 962609 |
| 23 | 60 | 39073 | 42447 | 959187 | 962785 |
| | 5 | 39206 | 42619 | 959336 | 962960 |
| | 10 | 39340 | 42791 | 959484 | 963135 |
| | 15 | 39474 | 42963 | 959631 | 963309 |
| | 20 | 39607 | 43135 | 959778 | 963483 |
| | 25 | 39741 | 43308 | 959924 | 963657 |
| | 30 | 39874 | 43481 | 960069 | 963830 |
| | 35 | 40008 | 43654 | 960214 | 964002 |
| | 40 | 40141 | 43827 | 960359 | 964174 |
| | 45 | 40274 | 44001 | 960503 | 964346 |
| | 50 | 40407 | 44174 | 960646 | 964517 |
| | 55 | 40540 | 44348 | 960789 | 964688 |
| 24 | 60 | 40673 | 44522 | 960931 | 964858 |
| | 5 | 40806 | 44697 | 961072 | 965028 |
| | 10 | 40939 | 44871 | 961213 | 965197 |
| | 15 | 41071 | 45046 | 961354 | 965366 |
| | 20 | 41204 | 45221 | 961494 | 965534 |
| | 25 | 41336 | 45397 | 961633 | 965702 |
| | 30 | 41469 | 45572 | 961772 | 965870 |
| | 35 | 41601 | 45748 | 961911 | 966037 |
| | 40 | 41733 | 45924 | 962048 | 966204 |
| | 45 | 41865 | 46100 | 962186 | 966370 |
| | 50 | 41998 | 46277 | 962322 | 966536 |
| | 55 | 42129 | 46453 | 962459 | 966702 |
| 25 | 60 | 42261 | 46630 | 962594 | 966867 |

| Gr. [M.] Sinus | | Tang. | | L. Sin. L. Tang. | |
|----------------|----|-------|--------|--------------------|---------|
| 30 | | 92387 | 241421 | 996561 | 1038077 |
| 66 | 25 | 92332 | 240431 | 996535 | 1038099 |
| | 20 | 92276 | 239448 | 996508 | 1037921 |
| | 15 | 92220 | 238472 | 996482 | 1037743 |
| | 10 | 92163 | 237503 | 996456 | 1037567 |
| | 5 | 92107 | 236541 | 996429 | 1037390 |
| | 0 | 92050 | 235585 | 996402 | 1037214 |
| | 55 | 91993 | 234635 | 996375 | 1037039 |
| | 50 | 91936 | 233692 | 996348 | 1036864 |
| | 45 | 91879 | 232756 | 996321 | 1036690 |
| | 40 | 91821 | 231826 | 996294 | 1036516 |
| 65 | 35 | 91763 | 230902 | 996267 | 1036342 |
| | 30 | 91706 | 229984 | 996239 | 1036169 |
| | 25 | 91647 | 229072 | 996212 | 1035997 |
| | 20 | 91589 | 228166 | 996184 | 1035825 |
| | 15 | 91531 | 227267 | 996156 | 1035653 |
| | 10 | 91472 | 226373 | 996129 | 1035482 |
| | 5 | 91413 | 225485 | 996101 | 1035311 |
| | 0 | 91354 | 224603 | 996073 | 1035141 |
| | 55 | 91295 | 223727 | 996044 | 1034971 |
| | 50 | 91235 | 222856 | 996016 | 1034802 |
| 64 | 45 | 91176 | 221991 | 995988 | 1034633 |
| | 40 | 91116 | 221132 | 995959 | 1034465 |
| | 35 | 91056 | 220278 | 995931 | 1034297 |
| | 30 | 90996 | 219429 | 995902 | 1034129 |
| | 25 | 90935 | 218586 | 995873 | 1033962 |
| | 20 | 90875 | 217749 | 995844 | 1033795 |
| | 15 | 90814 | 216916 | 995815 | 1033629 |
| | 10 | 90753 | 216089 | 995786 | 1033463 |
| | 5 | 90692 | 215267 | 995756 | 1033297 |
| | 0 | 90630 | 214450 | 995727 | 1033132 |

| G. M. | | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|---------|----|-------|-------|---------|----------|
| 25 | 0 | 42261 | 46630 | 962594 | 966867 |
| | 5 | 42393 | 46807 | 962730 | 967031 |
| | 10 | 42525 | 46985 | 962864 | 967196 |
| | 15 | 42659 | 47163 | 962998 | 967360 |
| | 20 | 42788 | 47340 | 963132 | 967523 |
| | 25 | 42919 | 47519 | 963265 | 967686 |
| | 30 | 43051 | 47697 | 963398 | 967849 |
| | 35 | 43182 | 47876 | 963530 | 968011 |
| | 40 | 43313 | 48055 | 963662 | 968173 |
| | 45 | 43444 | 48234 | 963793 | 968335 |
| | 50 | 43575 | 48413 | 963924 | 968496 |
| | 55 | 43706 | 48593 | 964054 | 968657 |
| 26 | 60 | 43837 | 48773 | 964184 | 968818 |
| | 5 | 43967 | 48953 | 964313 | 968978 |
| | 10 | 44098 | 49133 | 964442 | 969138 |
| | 15 | 44228 | 49314 | 964570 | 969297 |
| | 20 | 44359 | 49495 | 964698 | 969456 |
| | 25 | 44489 | 49676 | 964825 | 969615 |
| | 30 | 44619 | 49858 | 964952 | 969773 |
| | 35 | 44749 | 50039 | 965079 | 969931 |
| | 40 | 44879 | 50221 | 965205 | 970089 |
| | 45 | 45009 | 50404 | 965330 | 970246 |
| | 50 | 45139 | 50586 | 965455 | 970403 |
| | 55 | 45269 | 50769 | 965580 | 970560 |
| 27 | 60 | 45399 | 50952 | 965704 | 970716 |
| | 5 | 45528 | 51135 | 965828 | 970872 |
| | 10 | 45658 | 51319 | 965951 | 971028 |
| | 15 | 45787 | 51503 | 966074 | 971183 |
| | 20 | 45916 | 51687 | 966197 | 971338 |
| | 25 | 46045 | 51871 | 966319 | 971493 |
| | 30 | 46174 | 52056 | 966440 | 971647 |

Gr. | Min | Sinus | Tang. | Log. Sin. | L. Tang.

64 | 60 | 90630 | 214450 | 995727 | 1033132

| | | | | |
|----|-------|--------|--------|---------|
| 55 | 90569 | 213638 | 995698 | 1032968 |
| 50 | 90507 | 212832 | 995668 | 1032803 |
| 45 | 90445 | 212030 | 995638 | 1032639 |
| 40 | 90383 | 211233 | 995608 | 1032476 |
| 35 | 90321 | 210441 | 995578 | 1032313 |
| 30 | 90258 | 209654 | 995548 | 1032150 |

| | | | | |
|----|-------|--------|--------|---------|
| 25 | 90195 | 208872 | 995518 | 1031988 |
| 20 | 90132 | 208094 | 995488 | 1031826 |
| 15 | 90069 | 207321 | 995457 | 1031664 |
| 10 | 90006 | 206553 | 995427 | 1031503 |
| 5 | 89943 | 205789 | 995396 | 1031342 |
| 0 | 89879 | 205030 | 995366 | 1031181 |

| | | | | |
|----|-------|--------|--------|---------|
| 55 | 89815 | 204275 | 995335 | 1031021 |
| 50 | 89751 | 203525 | 995304 | 1030861 |
| 45 | 89687 | 202779 | 995273 | 1030702 |
| 40 | 89622 | 202038 | 995241 | 1030543 |
| 35 | 89558 | 201301 | 995210 | 1030384 |
| 30 | 89493 | 200568 | 995179 | 1030226 |

| | | | | |
|----|-------|--------|--------|---------|
| 25 | 89428 | 199840 | 995147 | 1030068 |
| 20 | 89363 | 199116 | 995115 | 1029910 |
| 15 | 89297 | 198396 | 995084 | 1029753 |
| 10 | 89232 | 197680 | 995052 | 1029596 |
| 5 | 89166 | 196968 | 995020 | 1029439 |
| 0 | 89100 | 196261 | 994988 | 1029283 |

| | | | | |
|----|-------|--------|--------|---------|
| 55 | 89034 | 195557 | 994955 | 1029127 |
| 50 | 88968 | 194857 | 994923 | 1028971 |
| 45 | 88901 | 194162 | 994891 | 1028816 |
| 40 | 88835 | 193470 | 994858 | 1028661 |
| 35 | 88768 | 192782 | 994825 | 1028506 |
| 30 | 88701 | 192098 | 994792 | 1028352 |

Gr. Min. Sinus [Tang. Log. Sin. L. Tang.

30 46174 52056 966440 971647

| | | | | |
|----|-------|-------|--------|--------|
| 35 | 46303 | 52241 | 966561 | 971801 |
| 40 | 46432 | 52426 | 966682 | 971955 |
| 45 | 46561 | 52612 | 966802 | 972108 |
| 50 | 46690 | 52798 | 966922 | 972262 |
| 55 | 46818 | 52984 | 967041 | 972414 |
| 60 | 46947 | 53170 | 967160 | 972567 |
| 5 | 47075 | 53357 | 967279 | 972719 |
| 10 | 47203 | 53544 | 967397 | 972871 |
| 15 | 47331 | 53731 | 967515 | 973023 |
| 20 | 47460 | 53919 | 967632 | 973174 |
| 25 | 47588 | 54107 | 967749 | 973325 |
| 30 | 47715 | 54295 | 967866 | 973476 |
| 35 | 47843 | 54484 | 967982 | 973626 |
| 40 | 47971 | 54672 | 968098 | 973777 |
| 45 | 48098 | 54861 | 968213 | 973927 |
| 50 | 48226 | 55051 | 968328 | 974076 |
| 55 | 48353 | 55240 | 968442 | 974226 |
| 60 | 48480 | 55430 | 968557 | 974375 |
| 5 | 48608 | 55621 | 968670 | 974524 |
| 10 | 48735 | 55811 | 968784 | 974672 |
| 15 | 48862 | 56002 | 968897 | 974820 |
| 20 | 48988 | 56193 | 969009 | 974968 |
| 25 | 49115 | 56385 | 969122 | 975116 |
| 30 | 49242 | 56577 | 969233 | 975264 |
| 35 | 49368 | 56769 | 969345 | 975411 |
| 40 | 49495 | 56961 | 969456 | 975558 |
| 45 | 49621 | 57154 | 969567 | 975705 |
| 50 | 49747 | 57347 | 969677 | 975851 |
| 55 | 49873 | 57541 | 969787 | 975997 |
| 60 | 50000 | 57735 | 969897 | 976143 |

| Gr. | Min | Sinus | Tang. | Log. Sin. | L. Tang. |
|-----|-----|-------|--------|-----------|----------|
| | 30 | 88701 | 192098 | 994792 | 1028352 |
| | 25 | 88633 | 191417 | 994759 | 1028198 |
| | 20 | 88566 | 190741 | 994726 | 1028044 |
| | 15 | 88498 | 190068 | 994693 | 1027891 |
| | 10 | 88430 | 189399 | 994660 | 1027737 |
| 61 | 5 | 88362 | 188734 | 994627 | 1027585 |
| | 0 | 88294 | 188072 | 994593 | 1027432 |
| | 55 | 88226 | 187414 | 994559 | 1027280 |
| | 50 | 88157 | 186760 | 994526 | 1027128 |
| | 45 | 88089 | 186109 | 994492 | 1026976 |
| | 40 | 88020 | 185461 | 994458 | 1026825 |
| | 35 | 87951 | 184817 | 994424 | 1026674 |
| | 30 | 87881 | 184177 | 994389 | 1026523 |
| | 25 | 87812 | 183539 | 994355 | 1026373 |
| | 20 | 87742 | 182906 | 994321 | 1026222 |
| | 15 | 87672 | 182275 | 994286 | 1026072 |
| | 10 | 87602 | 181648 | 994251 | 1025923 |
| 60 | 5 | 87532 | 181025 | 994216 | 1025773 |
| | 0 | 87461 | 180404 | 994181 | 1025624 |
| | 55 | 87391 | 179787 | 994146 | 1025475 |
| | 50 | 87320 | 179173 | 994111 | 1025327 |
| | 45 | 87249 | 178562 | 994076 | 1025179 |
| | 40 | 87178 | 177955 | 994040 | 1025032 |
| | 35 | 87107 | 177350 | 994005 | 1024883 |
| | 30 | 87035 | 176749 | 993969 | 1024735 |
| | 25 | 86963 | 176151 | 993933 | 1024588 |
| | 20 | 86891 | 175555 | 993897 | 1024441 |
| | 15 | 86819 | 174963 | 993861 | 1024294 |
| | 10 | 86747 | 174374 | 993825 | 1024148 |
| | 5 | 86675 | 173788 | 993789 | 1024002 |
| 59 | 0 | 86602 | 173205 | 993753 | 1023856 |

| Gr. | Min. | Sinus | Tang. | Log. Sin. | L. Tang. |
|-----|------|-------|-------|-----------|----------|
| 30 | 0 | 50000 | 57735 | 969827 | 976143 |
| | 5 | 50125 | 57929 | 970006 | 976289 |
| | 10 | 50251 | 58123 | 970115 | 976435 |
| | 15 | 50377 | 58318 | 970223 | 976580 |
| | 20 | 50502 | 58513 | 970331 | 976725 |
| | 25 | 50628 | 58708 | 970439 | 976870 |
| | 30 | 50753 | 58904 | 970546 | 977014 |
| | 35 | 50879 | 59100 | 970653 | 977159 |
| | 40 | 51004 | 59296 | 970760 | 977303 |
| | 45 | 51129 | 59493 | 970866 | 977447 |
| | 50 | 51254 | 59690 | 970972 | 977590 |
| | 55 | 51379 | 59888 | 971078 | 977734 |
| 31 | 60 | 51503 | 60086 | 971183 | 977877 |
| | 5 | 51628 | 60284 | 971288 | 978020 |
| | 10 | 51752 | 60482 | 971393 | 978163 |
| | 15 | 51877 | 60681 | 971497 | 978305 |
| | 20 | 52002 | 60880 | 971601 | 978447 |
| | 25 | 52125 | 61080 | 971705 | 978590 |
| | 30 | 52249 | 61280 | 971808 | 978731 |
| | 35 | 52373 | 61480 | 971911 | 978873 |
| | 40 | 52497 | 61680 | 972013 | 979015 |
| | 45 | 52621 | 61881 | 972116 | 979156 |
| | 50 | 52745 | 62083 | 972218 | 979297 |
| | 55 | 52868 | 62284 | 972319 | 979438 |
| 32 | 60 | 52991 | 62486 | 972420 | 979578 |
| | 5 | 53115 | 62689 | 972521 | 979719 |
| | 10 | 53238 | 62892 | 972622 | 979859 |
| | 15 | 53361 | 63095 | 972722 | 979999 |
| | 20 | 53484 | 63298 | 972822 | 980139 |
| | 25 | 53607 | 63502 | 972922 | 980279 |
| | 30 | 53729 | 63707 | 973021 | 980418 |

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|--------|---------|----------|
| 59 | 60 | 86602 | 173205 | 993753 | 1023856 |
| | 55 | 86539 | 172624 | 993716 | 1023710 |
| | 50 | 86456 | 172047 | 993679 | 1023564 |
| | 45 | 86383 | 171472 | 993643 | 1023419 |
| | 40 | 86310 | 170901 | 993606 | 1023274 |
| | 35 | 86236 | 170332 | 993569 | 1023129 |
| | 30 | 86162 | 169766 | 993532 | 1022985 |
| | 25 | 86089 | 169203 | 993494 | 1022840 |
| | 20 | 86014 | 168642 | 993457 | 1022696 |
| | 15 | 85940 | 168084 | 993419 | 1022552 |
| | 10 | 85866 | 167529 | 993382 | 1022409 |
| | 5 | 85791 | 166977 | 993344 | 1022265 |
| 58 | 0 | 85716 | 166427 | 993306 | 1022122 |
| | 55 | 85641 | 165880 | 993268 | 1021979 |
| | 50 | 85566 | 165336 | 993230 | 1021836 |
| | 45 | 85491 | 164794 | 993192 | 1021694 |
| | 40 | 85415 | 164255 | 993153 | 1021552 |
| | 35 | 85339 | 163719 | 993115 | 1021409 |
| | 30 | 85264 | 163185 | 993076 | 1021268 |
| | 25 | 85187 | 162653 | 993037 | 1021126 |
| | 20 | 85111 | 162124 | 992998 | 1020984 |
| | 15 | 85035 | 161598 | 992959 | 1020843 |
| | 10 | 84958 | 161074 | 992920 | 1020702 |
| | 5 | 84881 | 160552 | 992881 | 1020561 |
| 57 | 0 | 84804 | 160033 | 992842 | 1020421 |
| | 55 | 84727 | 159516 | 992802 | 1020280 |
| | 50 | 84650 | 159002 | 992762 | 1020140 |
| | 45 | 84572 | 158490 | 992723 | 1020000 |
| | 40 | 84495 | 157980 | 992683 | 1019860 |
| | 35 | 84417 | 157473 | 992643 | 1019720 |
| | 30 | 84339 | 156968 | 992602 | 1019581 |

G. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang.

0 | 30 | 53729 | 63707 | 973021 | 980418

01 | 35 | 53852 | 63911 | 973120 | 980558

40 | 53975 | 64116 | 973219 | 980697

45 | 54097 | 64322 | 973317 | 980836

50 | 54219 | 64527 | 973415 | 980974

55 | 54341 | 64734 | 973513 | 981113

33 | 60 | 54463 | 64940 | 973610 | 981251

5 | 54585 | 65147 | 973707 | 981389

10 | 54707 | 65355 | 973804 | 981527

15 | 54829 | 65562 | 973901 | 981665

20 | 54950 | 65771 | 973997 | 981803

25 | 55072 | 65979 | 974093 | 981940

30 | 55193 | 66188 | 974188 | 982078

35 | 55314 | 66397 | 974284 | 982215

40 | 55436 | 66607 | 974379 | 982352

45 | 55557 | 66817 | 974473 | 982489

50 | 55677 | 67028 | 974568 | 982625

55 | 55798 | 67239 | 974662 | 982762

34 | 60 | 55919 | 67450 | 974756 | 982898

5 | 56039 | 67662 | 974849 | 983034

10 | 56160 | 67874 | 974942 | 983170

15 | 56280 | 68087 | 975035 | 983306

20 | 56400 | 68300 | 975128 | 983442

25 | 56520 | 68514 | 975220 | 983578

30 | 56640 | 68728 | 975312 | 983713

35 | 56760 | 68942 | 975404 | 983848

40 | 56880 | 69157 | 975496 | 983983

45 | 56999 | 69372 | 975587 | 984118

50 | 57119 | 69588 | 975678 | 984253

55 | 57238 | 69804 | 975768 | 984388

35 | 60 | 57357 | 70020 | 975859 | 984522

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|--------|---------|----------|
| | 30 | 84339 | 156968 | 992602 | 1019581 |
| | 25 | 84260 | 156465 | 992562 | 1019441 |
| | 20 | 84182 | 155965 | 992522 | 1019302 |
| | 15 | 84103 | 155467 | 992481 | 1019163 |
| | 10 | 84025 | 154971 | 992440 | 1019025 |
| | 5 | 83946 | 154477 | 992400 | 1018886 |
| 56 | 0 | 83867 | 153986 | 992359 | 1018748 |
| | 55 | 83787 | 153497 | 992318 | 1018610 |
| | 50 | 83708 | 153010 | 992276 | 1018472 |
| | 45 | 83628 | 152525 | 992235 | 1018334 |
| | 40 | 83548 | 152042 | 992194 | 1018196 |
| | 35 | 83468 | 151562 | 992152 | 1018059 |
| | 30 | 83388 | 151083 | 992110 | 1017921 |
| | 25 | 83308 | 150607 | 992068 | 1017784 |
| | 20 | 83227 | 150132 | 992026 | 1017647 |
| | 15 | 83146 | 149660 | 991984 | 1017510 |
| | 10 | 83066 | 149190 | 991942 | 1017374 |
| | 5 | 82985 | 148722 | 991899 | 1017237 |
| 55 | 0 | 82903 | 148256 | 991857 | 1017101 |
| | 55 | 82822 | 147791 | 991814 | 1016965 |
| | 50 | 82740 | 147329 | 991771 | 1016829 |
| | 45 | 82658 | 146869 | 991729 | 1016693 |
| | 40 | 82577 | 146411 | 991685 | 1016557 |
| | 35 | 82494 | 145955 | 991642 | 1016421 |
| | 30 | 82412 | 145500 | 991599 | 1016286 |
| | 25 | 82330 | 145048 | 991555 | 1016151 |
| | 20 | 82247 | 144598 | 991512 | 1016016 |
| | 15 | 82164 | 144149 | 991468 | 1015881 |
| | 10 | 82081 | 143702 | 991424 | 1015746 |
| | 5 | 81998 | 143257 | 991380 | 1015611 |
| 54 | 0 | 81915 | 142814 | 991336 | 1015477 |

| G. M. Sinus Tang. L. Sin. L. Tang. | |
|--|--------------------------------------|
| 35 | 0 57357 70020 975859 984522 |
| | 5 57476 70237 975949 984657 |
| | 10 57595 70455 976038 984791 |
| | 15 57714 70673 976128 984925 |
| | 20 57833 70891 976217 985059 |
| | 25 57951 71110 976306 985193 |
| | 30 58070 71329 976395 985326 |
| | 35 58188 71548 976483 985460 |
| | 40 58306 71769 976571 985593 |
| | 45 58424 71989 976659 985727 |
| | 50 58542 72210 976747 985860 |
| | 55 58660 72432 976834 985993 |
| 36 | 60 58778 72654 976921 986126 |
| | 5 58896 72876 977008 986258 |
| | 10 59013 73099 977095 986391 |
| | 15 59130 73323 977181 986524 |
| | 20 59248 73546 977267 986656 |
| | 25 59365 73771 977353 986788 |
| | 30 59482 73996 977438 986920 |
| | 35 59599 74221 977523 987052 |
| | 40 59715 74447 977608 987184 |
| | 45 59832 74673 977693 987316 |
| | 50 59948 74900 977778 987448 |
| | 55 60065 75127 977862 987579 |
| 37 | 60 60181 75355 977946 987711 |
| | 5 60297 75583 978030 987842 |
| | 10 60413 75812 978113 987974 |
| | 15 60529 76041 978196 988105 |
| | 20 60645 76271 978279 988236 |
| | 25 60760 76501 978362 988367 |
| | 30 60876 76732 978444 988498 |

Gr. | Min. | Sinus | Tang. | L.Sin. | L. Tang.

54 | 60 | 81915 | 142814 | 991336 | 1015477

55 | 81831 | 142373 | 991292 | 1015342
 50 | 81748 | 141934 | 991247 | 1015208
 45 | 81664 | 141496 | 991203 | 1015074
 40 | 81580 | 141060 | 991158 | 1014940
 35 | 81495 | 140627 | 991113 | 1014806
 30 | 81411 | 140194 | 991068 | 1014673

25 | 81327 | 139764 | 991023 | 1014539
 20 | 81242 | 139335 | 990978 | 1014406
 15 | 81157 | 138908 | 990932 | 1014272
 10 | 81072 | 138483 | 990887 | 1014139
 5 | 80987 | 138060 | 990841 | 1014006

53 | 0 | 80901 | 137638 | 990795 | 1013873

55 | 80816 | 137218 | 990749 | 1013741
 50 | 80730 | 136799 | 990703 | 1013608
 45 | 80644 | 136382 | 990657 | 1013475
 40 | 80558 | 135967 | 990611 | 1013343
 35 | 80472 | 135554 | 990564 | 1013211
 30 | 80385 | 135142 | 990517 | 1013079

25 | 80299 | 134731 | 990471 | 1012947
 20 | 80212 | 134323 | 990424 | 1012815
 15 | 80125 | 133916 | 990377 | 1012683
 10 | 80038 | 133510 | 990329 | 1012551
 5 | 79951 | 133106 | 990282 | 1012420

52 | 0 | 79863 | 132704 | 990234 | 1012288

55 | 79775 | 132303 | 990187 | 1012157
 50 | 79688 | 131904 | 990139 | 1012025
 45 | 79600 | 131506 | 990091 | 1011894
 40 | 79512 | 131110 | 990043 | 1011763
 35 | 79423 | 130715 | 989995 | 1011632
 30 | 79335 | 130322 | 989946 | 1011501

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|-------|---------|----------|
| | 30 | 60876 | 76732 | 978444 | 988498 |
| | 35 | 60991 | 76964 | 978526 | 988628 |
| | 40 | 61106 | 77195 | 978608 | 988759 |
| | 45 | 61221 | 77428 | 978690 | 988889 |
| | 50 | 61336 | 77661 | 978772 | 989020 |
| | 55 | 61451 | 77894 | 978853 | 989150 |
| 38 | 60 | 61566 | 78128 | 978934 | 989280 |
| | 5 | 61680 | 78363 | 979014 | 989411 |
| | 10 | 61795 | 78598 | 979095 | 989541 |
| | 15 | 61909 | 78833 | 979175 | 989671 |
| | 20 | 62023 | 79069 | 979255 | 989801 |
| | 25 | 62137 | 79306 | 979335 | 989930 |
| | 30 | 62251 | 79543 | 979414 | 990060 |
| | 35 | 62365 | 79781 | 979494 | 990190 |
| | 40 | 62478 | 80019 | 979573 | 990319 |
| | 45 | 62592 | 80258 | 979652 | 990449 |
| | 50 | 62705 | 80497 | 979730 | 990578 |
| | 55 | 62818 | 80737 | 979809 | 990707 |
| 39 | 60 | 62932 | 80978 | 979887 | 990836 |
| | 5 | 63045 | 81219 | 979965 | 990966 |
| | 10 | 63157 | 81461 | 980042 | 991095 |
| | 15 | 63270 | 81703 | 980120 | 991224 |
| | 20 | 63383 | 81946 | 980197 | 991352 |
| | 25 | 63495 | 82189 | 980274 | 991481 |
| | 30 | 63607 | 82433 | 980351 | 991610 |
| | 35 | 63719 | 82678 | 980427 | 991739 |
| | 40 | 63832 | 82923 | 980503 | 991867 |
| | 45 | 63943 | 83169 | 980579 | 991996 |
| | 50 | 64055 | 83415 | 980655 | 992124 |
| | 55 | 64167 | 83662 | 980731 | 992253 |
| 40 | 60 | 64278 | 83909 | 980806 | 992381 |

G. | Min. | Sinus | Tang. | Log.Sin. | L. Tang.

| | | | | | |
|----|----|--------|--------|--------|---------|
| | 30 | 179335 | 130322 | 989946 | 1011501 |
| | 25 | 79246 | 129930 | 989898 | 1011371 |
| | 20 | 79157 | 129540 | 989849 | 1011240 |
| | 15 | 79068 | 129151 | 989800 | 1011110 |
| | 10 | 78979 | 128764 | 989751 | 1010979 |
| | 5 | 78890 | 128378 | 989702 | 1010849 |
| 51 | 0 | 78801 | 127994 | 989653 | 1010719 |
| | 55 | 78711 | 127611 | 989603 | 1010588 |
| | 50 | 78621 | 127229 | 989554 | 1010458 |
| | 45 | 78531 | 126849 | 989504 | 1010328 |
| | 40 | 78441 | 126470 | 989454 | 1010198 |
| | 35 | 78351 | 126093 | 989404 | 1010069 |
| | 30 | 78260 | 125717 | 989354 | 1009939 |
| | 25 | 78170 | 125341 | 989304 | 1009809 |
| | 20 | 78079 | 124969 | 989253 | 1009680 |
| | 15 | 77988 | 124597 | 989203 | 1009550 |
| | 10 | 77897 | 124226 | 989153 | 1009421 |
| | 5 | 77806 | 123857 | 989101 | 1009292 |
| 50 | 0 | 77714 | 123489 | 989050 | 1009163 |
| | 55 | 77622 | 123123 | 988999 | 1009033 |
| | 50 | 77531 | 122757 | 988947 | 1008904 |
| | 45 | 77439 | 122393 | 988896 | 1008775 |
| | 40 | 77347 | 122031 | 988844 | 1008647 |
| | 35 | 77254 | 121669 | 988792 | 1008518 |
| | 30 | 77162 | 121309 | 988740 | 1008389 |
| | 25 | 77069 | 120950 | 988688 | 1008260 |
| | 20 | 76977 | 120593 | 988636 | 1008132 |
| | 15 | 76884 | 120236 | 988583 | 1008003 |
| | 10 | 76791 | 119881 | 988531 | 1007875 |
| | 5 | 76697 | 119527 | 988478 | 1007746 |
| 49 | 0 | 76604 | 119175 | 988425 | 1007618 |

| Gr. | M. | Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang. |
|-----|----|-------|-------|---------|----------|
| 40 | 0 | 64278 | 83909 | 980806 | 992381 |
| | 5 | 64390 | 84158 | 980881 | 992509 |
| | 10 | 64501 | 84406 | 980956 | 992637 |
| | 15 | 64612 | 84656 | 981031 | 992765 |
| | 20 | 64723 | 84906 | 981106 | 992893 |
| | 25 | 64834 | 85156 | 981180 | 993021 |
| | 30 | 64944 | 85408 | 981254 | 993149 |
| | 35 | 65055 | 85659 | 981328 | 993277 |
| | 40 | 65165 | 85912 | 981401 | 993405 |
| | 45 | 65275 | 86165 | 981475 | 993533 |
| | 50 | 65386 | 86419 | 981548 | 993661 |
| | 55 | 65496 | 86673 | 981621 | 993788 |
| 41 | 60 | 65605 | 86928 | 981694 | 993916 |
| | 5 | 65715 | 87184 | 981766 | 994043 |
| | 10 | 65825 | 87440 | 981839 | 994171 |
| | 15 | 65934 | 87697 | 981911 | 994298 |
| | 20 | 66043 | 87955 | 981983 | 994426 |
| | 25 | 66153 | 88213 | 982054 | 994553 |
| | 30 | 66262 | 88472 | 982126 | 994680 |
| | 35 | 66370 | 88732 | 982197 | 994808 |
| | 40 | 66479 | 88992 | 982268 | 994935 |
| | 45 | 66588 | 89253 | 982339 | 995062 |
| | 50 | 66696 | 89515 | 982410 | 995189 |
| | 55 | 66804 | 89777 | 982480 | 995316 |
| 42 | 60 | 66913 | 90040 | 982551 | 995443 |
| | 5 | 67021 | 90304 | 982621 | 995570 |
| | 10 | 67128 | 90568 | 982690 | 995697 |
| | 15 | 67236 | 90833 | 982760 | 995824 |
| | 20 | 67344 | 91099 | 982830 | 995951 |
| | 25 | 67451 | 91365 | 982899 | 996078 |
| | 30 | 67559 | 91633 | 982968 | 996205 |

| Gr. | Min. | Sinus | Tang. | L.Sin. | L. Tang. |
|-----|------|-------|--------|--------|----------|
| 49 | 60 | 76604 | 119175 | 988425 | 1007618 |
| | 55 | 76510 | 118823 | 988372 | 1007490 |
| | 50 | 76417 | 118473 | 988319 | 1007362 |
| | 45 | 76323 | 118124 | 988265 | 1007234 |
| | 40 | 76229 | 117776 | 988212 | 1007106 |
| | 35 | 76134 | 117430 | 988158 | 1006978 |
| | 30 | 76040 | 117084 | 988104 | 1006850 |
| | 25 | 75946 | 116740 | 988050 | 1006722 |
| | 20 | 75851 | 116397 | 987996 | 1006594 |
| | 15 | 75756 | 116055 | 987941 | 1006466 |
| | 10 | 75661 | 115714 | 987887 | 1006338 |
| 48 | 5 | 75566 | 115375 | 987832 | 1006211 |
| | 0 | 75470 | 115036 | 987777 | 1006083 |
| | 55 | 75375 | 114699 | 987723 | 1005956 |
| | 50 | 75279 | 114363 | 987667 | 1005828 |
| | 45 | 75183 | 114028 | 987612 | 1005701 |
| | 40 | 75088 | 113694 | 987557 | 1005573 |
| | 35 | 74991 | 113361 | 987501 | 1005446 |
| | 30 | 74895 | 113029 | 987445 | 1005319 |
| | 25 | 74799 | 112698 | 987389 | 1005191 |
| | 20 | 74702 | 112369 | 987333 | 1005064 |
| | 15 | 74605 | 112040 | 987277 | 1004937 |
| | 10 | 74508 | 111713 | 987220 | 1004810 |
| | 5 | 74411 | 111386 | 987164 | 1004683 |
| 47 | 0 | 74314 | 111061 | 987107 | 1004556 |
| | 55 | 74217 | 110736 | 987050 | 1004429 |
| | 50 | 74119 | 110413 | 986993 | 1004302 |
| | 45 | 74021 | 110091 | 986935 | 1004175 |
| | 40 | 73923 | 109770 | 986878 | 1004048 |
| | 35 | 73825 | 109450 | 986820 | 1003921 |
| | 30 | 73727 | 109130 | 986763 | 1003794 |

| Gr. | Min. | Sinus | Tang. | Log. Sin. | L. Tang. |
|-----|------|-------|--------|-----------|----------|
| | 30 | 67559 | 91633 | 982968 | 996205 |
| 43 | 35 | 67666 | 91901 | 983037 | 996332 |
| | 40 | 67773 | 92169 | 983105 | 996458 |
| | 45 | 67880 | 92439 | 983174 | 996585 |
| | 50 | 67986 | 92709 | 983242 | 996712 |
| | 55 | 68093 | 92979 | 983310 | 996838 |
| | 60 | 68199 | 93251 | 983378 | 996965 |
| | 5 | 68306 | 93523 | 983445 | 997092 |
| | 10 | 68412 | 93796 | 983513 | 997218 |
| | 15 | 68518 | 94070 | 983580 | 997345 |
| | 20 | 68624 | 94345 | 983647 | 997471 |
| 44 | 25 | 68729 | 94620 | 983714 | 997598 |
| | 30 | 68835 | 94896 | 983781 | 997725 |
| | 35 | 68940 | 95173 | 983847 | 997851 |
| | 40 | 69046 | 95450 | 983913 | 997977 |
| | 45 | 69151 | 95729 | 983980 | 998104 |
| | 50 | 69256 | 96008 | 984045 | 998230 |
| | 55 | 69361 | 96288 | 984111 | 998357 |
| | 60 | 69465 | 96568 | 984177 | 998483 |
| | 5 | 69570 | 96850 | 984242 | 998610 |
| | 10 | 69674 | 97132 | 984307 | 998736 |
| | 15 | 69779 | 97415 | 984372 | 998862 |
| | 20 | 69883 | 97699 | 984437 | 998989 |
| | 25 | 69987 | 97984 | 984501 | 999115 |
| | 30 | 70090 | 98269 | 984566 | 999241 |
| | 35 | 70194 | 98556 | 984630 | 999368 |
| | 40 | 70298 | 98843 | 984694 | 999494 |
| | 45 | 70401 | 99131 | 984758 | 999621 |
| | 50 | 70504 | 99419 | 984821 | 999747 |
| | 55 | 70607 | 99709 | 984885 | 999873 |
| | 60 | 70710 | 100000 | 984948 | 1000000 |

Gr. [M.] Sinus | Tang. | L. Sin. | L. Tang.

| 30 | 73727 | 109130 | 986763 | 1003794

| | | | | | |
|----|----|-------|--------|--------|---------|
| | 25 | 73629 | 108812 | 986705 | 1003667 |
| | 20 | 73530 | 108495 | 986646 | 1003541 |
| | 15 | 73432 | 108179 | 986588 | 1003414 |
| | 10 | 73333 | 107864 | 986530 | 1003287 |
| | 5 | 73234 | 107550 | 986471 | 1003161 |
| 40 | 0 | 73135 | 107236 | 986412 | 1003034 |
| | 55 | 73036 | 106924 | 986353 | 1002907 |
| | 50 | 72936 | 106613 | 986294 | 1002781 |
| | 45 | 72837 | 106303 | 986235 | 1002654 |
| | 40 | 72737 | 105993 | 986175 | 1002528 |
| | 35 | 72637 | 105685 | 986116 | 1002401 |
| | 30 | 72537 | 105378 | 986056 | 1002275 |
| | 25 | 72437 | 105071 | 985996 | 1002148 |
| | 20 | 72336 | 104765 | 985935 | 1002022 |
| | 15 | 72236 | 104461 | 985875 | 1001895 |
| | 10 | 72135 | 104157 | 985815 | 1001769 |
| | 5 | 72034 | 103854 | 985754 | 1001642 |
| 45 | 0 | 71933 | 103553 | 985693 | 1001516 |
| | 55 | 71832 | 103252 | 985632 | 1001389 |
| | 50 | 71731 | 102952 | 985571 | 1001263 |
| | 45 | 71630 | 102652 | 985509 | 1001137 |
| | 40 | 71528 | 102354 | 985447 | 1001010 |
| | 35 | 71426 | 102057 | 985386 | 1000884 |
| | 30 | 71325 | 101760 | 985324 | 1000758 |
| | 25 | 71223 | 101465 | 985262 | 1000631 |
| | 20 | 71120 | 101170 | 985199 | 1000505 |
| | 15 | 71018 | 100876 | 985137 | 1000379 |
| | 10 | 70916 | 100583 | 985074 | 1000252 |
| | 5 | 70813 | 100291 | 985011 | 1000126 |
| | 0 | 70710 | 100000 | 984948 | 1000000 |

Logarithmi

*Numerorum Vulgarium usque
ad 1000.*

| N. | Logar. | N. | Logar. | N. | Logar. |
|----|---------|----|---------|-----|---------|
| 1 | 0.00000 | 34 | 1.53147 | 67 | 1.82607 |
| 2 | 0.30103 | 35 | 1.54406 | 68 | 1.83250 |
| 3 | 0.47712 | 36 | 1.55630 | 69 | 1.83884 |
| 4 | 0.60206 | 37 | 1.56820 | 70 | 1.84509 |
| 5 | 0.69897 | 38 | 1.57978 | 71 | 1.85125 |
| 6 | 0.77815 | 39 | 1.59106 | 72 | 1.85733 |
| 7 | 0.84509 | 40 | 1.60206 | 73 | 1.86332 |
| 8 | 0.90309 | 41 | 1.61278 | 74 | 1.86923 |
| 9 | 0.95424 | 42 | 1.62324 | 75 | 1.87506 |
| 10 | 1.00000 | 43 | 1.63346 | 76 | 1.88081 |
| 11 | 1.04139 | 44 | 1.64345 | 77 | 1.88649 |
| 12 | 1.07918 | 45 | 1.65321 | 78 | 1.89209 |
| 13 | 1.11394 | 46 | 1.66275 | 79 | 1.89762 |
| 14 | 1.14612 | 47 | 1.67209 | 80 | 1.90309 |
| 15 | 1.17609 | 48 | 1.68124 | 81 | 1.90848 |
| 16 | 1.20412 | 49 | 1.69019 | 82 | 1.91381 |
| 17 | 1.23044 | 50 | 1.69897 | 83 | 1.91907 |
| 18 | 1.25527 | 51 | 1.70757 | 84 | 1.92427 |
| 19 | 1.27875 | 52 | 1.71600 | 85 | 1.92941 |
| 20 | 1.30103 | 53 | 1.72427 | 86 | 1.93449 |
| 21 | 1.32221 | 54 | 1.73239 | 87 | 1.93951 |
| 22 | 1.34242 | 55 | 1.74036 | 88 | 1.94448 |
| 23 | 1.36172 | 56 | 1.74818 | 89 | 1.94939 |
| 24 | 1.38021 | 57 | 1.75587 | 90 | 1.95424 |
| 25 | 1.39794 | 58 | 1.76342 | 91 | 1.95904 |
| 26 | 1.41497 | 59 | 1.77085 | 92 | 1.96378 |
| 27 | 1.43136 | 60 | 1.77815 | 93 | 1.96848 |
| 28 | 1.44715 | 61 | 1.78532 | 94 | 1.97312 |
| 29 | 1.46239 | 62 | 1.79239 | 95 | 1.97772 |
| 30 | 1.47712 | 63 | 1.79934 | 96 | 1.98227 |
| 31 | 1.49136 | 64 | 1.80618 | 97 | 1.98677 |
| 32 | 1.50515 | 65 | 1.81291 | 98 | 1.99122 |
| 33 | 1.51851 | 66 | 1.81954 | 99 | 1.99563 |
| 34 | 1.53147 | 67 | 1.82607 | 100 | 2.00000 |

| N. | Logar. | N. | Logar. | N. | Logar. |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 101 | 2.00432 | 134 | 2.12710 | 167 | 2.22271 |
| 102 | 2.00860 | 135 | 2.13033 | 168 | 2.22530 |
| 103 | 2.01283 | 136 | 2.13353 | 169 | 2.22788 |
| 104 | 2.01703 | 137 | 2.13672 | 170 | 2.23044 |
| 105 | 2.02118 | 138 | 2.13987 | 171 | 2.23299 |
| 106 | 2.02530 | 139 | 2.14301 | 172 | 2.23552 |
| 107 | 2.02938 | 140 | 2.14612 | 173 | 2.23804 |
| 108 | 2.03342 | 141 | 2.14921 | 174 | 2.24054 |
| 109 | 2.03742 | 142 | 2.15228 | 175 | 2.24303 |
| 110 | 2.04139 | 143 | 2.15533 | 176 | 2.24551 |
| 111 | 2.04532 | 144 | 2.15836 | 177 | 2.24797 |
| 112 | 2.04921 | 145 | 2.16136 | 178 | 2.25042 |
| 113 | 2.05307 | 146 | 2.16435 | 179 | 2.25285 |
| 114 | 2.05690 | 147 | 2.16731 | 180 | 2.25527 |
| 115 | 2.06069 | 148 | 2.17026 | 181 | 2.25767 |
| 116 | 2.06445 | 149 | 2.17318 | 182 | 2.26007 |
| 117 | 2.06818 | 150 | 2.17609 | 183 | 2.26245 |
| 118 | 2.07188 | 151 | 2.17897 | 184 | 2.26481 |
| 119 | 2.07554 | 152 | 2.18184 | 185 | 2.26717 |
| 120 | 2.07918 | 153 | 2.18469 | 186 | 2.26951 |
| 121 | 2.08278 | 154 | 2.18752 | 187 | 2.27184 |
| 122 | 2.08635 | 155 | 2.19033 | 188 | 2.27415 |
| 123 | 2.08990 | 156 | 2.19312 | 189 | 2.27646 |
| 124 | 2.09342 | 157 | 2.19589 | 190 | 2.27875 |
| 125 | 2.09691 | 158 | 2.19865 | 191 | 2.28103 |
| 126 | 2.10037 | 159 | 2.20139 | 192 | 2.28330 |
| 127 | 2.10380 | 160 | 2.20412 | 193 | 2.28555 |
| 128 | 2.10721 | 161 | 2.20682 | 194 | 2.28780 |
| 129 | 2.11058 | 162 | 2.20951 | 195 | 2.29003 |
| 130 | 2.11394 | 163 | 2.21218 | 196 | 2.29225 |
| 131 | 2.11727 | 164 | 2.21484 | 197 | 2.29446 |
| 132 | 2.12057 | 165 | 2.21748 | 198 | 2.29666 |
| 133 | 2.12385 | 166 | 2.22010 | 199 | 2.29885 |
| 134 | 2.12710 | 167 | 2.22271 | 200 | 2.30103 |

| N. | Logar. | N. | Logar. | N. | Logar. |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 201 | 2.30319 | 234 | 2.36921 | 267 | 2.42651 |
| 202 | 2.30535 | 235 | 2.37106 | 268 | 2.42813 |
| 203 | 2.30749 | 236 | 2.37291 | 269 | 2.42975 |
| 204 | 2.30963 | 237 | 2.37474 | 270 | 2.43136 |
| 205 | 2.31175 | 238 | 2.37657 | 271 | 2.43296 |
| 206 | 2.31386 | 239 | 2.37839 | 272 | 2.43456 |
| 207 | 2.31597 | 240 | 2.38021 | 273 | 2.43616 |
| 208 | 2.31806 | 241 | 2.38201 | 274 | 2.43775 |
| 209 | 2.32014 | 242 | 2.38381 | 275 | 2.43933 |
| 210 | 2.32221 | 243 | 2.38560 | 276 | 2.44090 |
| 211 | 2.32428 | 244 | 2.38738 | 277 | 2.44247 |
| 212 | 2.32633 | 245 | 2.38916 | 278 | 2.44404 |
| 213 | 2.32837 | 246 | 2.39093 | 279 | 2.44560 |
| 214 | 2.33041 | 247 | 2.39269 | 280 | 2.44715 |
| 215 | 2.33243 | 248 | 2.39445 | 281 | 2.44870 |
| 216 | 2.33445 | 249 | 2.39619 | 282 | 2.45024 |
| 217 | 2.33645 | 250 | 2.39794 | 283 | 2.45178 |
| 218 | 2.33845 | 251 | 2.39967 | 284 | 2.45331 |
| 219 | 2.34044 | 252 | 2.40140 | 285 | 2.45484 |
| 220 | 2.34242 | 253 | 2.40312 | 286 | 2.45636 |
| 221 | 2.34439 | 254 | 2.40483 | 287 | 2.45788 |
| 222 | 2.34635 | 255 | 2.40654 | 288 | 2.45939 |
| 223 | 2.34830 | 256 | 2.40824 | 289 | 2.46089 |
| 224 | 2.35024 | 257 | 2.40993 | 290 | 2.46239 |
| 225 | 2.35218 | 258 | 2.41161 | 291 | 2.46389 |
| 226 | 2.35410 | 259 | 2.41329 | 292 | 2.46538 |
| 227 | 2.35602 | 260 | 2.41497 | 293 | 2.46686 |
| 228 | 2.35793 | 261 | 2.41664 | 294 | 2.46834 |
| 229 | 2.35983 | 262 | 2.41830 | 295 | 2.46982 |
| 230 | 2.36172 | 263 | 2.41995 | 296 | 2.47129 |
| 231 | 2.36361 | 264 | 2.42160 | 297 | 2.47275 |
| 232 | 2.36548 | 265 | 2.42324 | 298 | 2.47421 |
| 233 | 2.36735 | 266 | 2.42488 | 299 | 2.47567 |
| 234 | 2.36921 | 267 | 2.42651 | 300 | 2.47712 |

| N. | Logar. | N. | Logar. | N. | Logar. |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 301 | 2.47856 | 334 | 2.52374 | 367 | 2.56466 |
| 302 | 2.48000 | 335 | 2.52504 | 368 | 2.56584 |
| 303 | 2.48144 | 336 | 2.52633 | 369 | 2.56702 |
| 304 | 2.48287 | 337 | 2.52762 | 370 | 2.56820 |
| 305 | 2.48429 | 338 | 2.52891 | 371 | 2.56937 |
| 306 | 2.48572 | 339 | 2.53019 | 372 | 2.57054 |
| 307 | 2.48713 | 340 | 2.53147 | 373 | 2.57170 |
| 308 | 2.48855 | 341 | 2.53275 | 374 | 2.57287 |
| 309 | 2.48995 | 342 | 2.53402 | 375 | 2.57403 |
| 310 | 2.49136 | 343 | 2.53529 | 376 | 2.57518 |
| 311 | 2.49276 | 344 | 2.53655 | 377 | 2.57634 |
| 312 | 2.49415 | 345 | 2.53781 | 378 | 2.57749 |
| 313 | 2.49554 | 346 | 2.53907 | 379 | 2.57863 |
| 314 | 2.49692 | 347 | 2.54032 | 380 | 2.57978 |
| 315 | 2.49831 | 348 | 2.54157 | 381 | 2.58092 |
| 316 | 2.49968 | 349 | 2.54282 | 382 | 2.58206 |
| 317 | 2.50105 | 350 | 2.54406 | 383 | 2.58319 |
| 318 | 2.50242 | 351 | 2.54530 | 384 | 2.58433 |
| 319 | 2.50379 | 352 | 2.54654 | 385 | 2.58546 |
| 320 | 2.50515 | 353 | 2.54777 | 386 | 2.58658 |
| 321 | 2.50650 | 354 | 2.54900 | 387 | 2.58771 |
| 322 | 2.50785 | 355 | 2.55022 | 388 | 2.58883 |
| 323 | 2.50920 | 356 | 2.55145 | 389 | 2.58994 |
| 324 | 2.51054 | 357 | 2.55266 | 390 | 2.59106 |
| 325 | 2.51188 | 358 | 2.55388 | 391 | 2.59217 |
| 326 | 2.51321 | 359 | 2.55509 | 392 | 2.59328 |
| 327 | 2.51454 | 360 | 2.55630 | 393 | 2.59439 |
| 328 | 2.51587 | 361 | 2.55750 | 394 | 2.59549 |
| 329 | 2.51719 | 362 | 2.55870 | 395 | 2.59659 |
| 330 | 2.51851 | 363 | 2.55990 | 396 | 2.59769 |
| 331 | 2.51982 | 364 | 2.56110 | 397 | 2.59879 |
| 332 | 2.52113 | 365 | 2.56229 | 398 | 2.59988 |
| 333 | 2.52244 | 366 | 2.56348 | 399 | 2.60097 |
| 334 | 2.52374 | 367 | 2.56466 | 400 | 2.60206 |

N. Logar.

| | |
|-----|---------|
| 401 | 2.60314 |
| 402 | 2.60422 |
| 403 | 2.60530 |
| 404 | 2.60638 |
| 405 | 2.60745 |
| 406 | 2.60852 |
| 407 | 2.60959 |
| 308 | 2.61066 |
| 309 | 2.61172 |
| 410 | 2.61278 |
| 411 | 2.61384 |
| 412 | 2.61489 |
| 413 | 2.61595 |
| 414 | 2.61700 |
| 415 | 2.61804 |
| 416 | 2.61909 |
| 417 | 2.62013 |
| 418 | 2.62117 |
| 419 | 2.62221 |
| 420 | 2.62324 |
| 421 | 2.62428 |
| 422 | 2.62531 |
| 423 | 2.62634 |
| 424 | 2.62736 |
| 425 | 2.62838 |
| 426 | 2.62940 |
| 427 | 2.63042 |
| 424 | 2.63144 |
| 429 | 2.63245 |
| 430 | 2.63346 |
| 431 | 2.63447 |
| 432 | 2.63548 |
| 433 | 2.63648 |
| 434 | 2.63748 |

N. Logar.

| | |
|-----|---------|
| 434 | 2.63748 |
| 435 | 2.63848 |
| 436 | 2.63948 |
| 437 | 2.64048 |
| 438 | 2.64147 |
| 439 | 2.64246 |
| 440 | 2.64345 |
| 441 | 2.64443 |
| 442 | 2.64542 |
| 443 | 2.64640 |
| 444 | 2.64738 |
| 445 | 2.64836 |
| 446 | 2.64933 |
| 447 | 2.65030 |
| 448 | 2.65127 |
| 449 | 2.65224 |
| 450 | 2.65321 |
| 451 | 2.65417 |
| 452 | 2.65513 |
| 453 | 2.65609 |
| 454 | 2.65705 |
| 455 | 2.65801 |
| 456 | 2.65896 |
| 457 | 2.65991 |
| 458 | 2.66086 |
| 459 | 2.66181 |
| 460 | 2.66275 |
| 461 | 2.66370 |
| 462 | 2.66464 |
| 463 | 2.66558 |
| 464 | 2.66651 |
| 465 | 2.66745 |
| 466 | 2.66838 |
| 467 | 2.66931 |

N. Logar.

| | |
|-----|---------|
| 467 | 2.66931 |
| 468 | 2.67024 |
| 469 | 2.67117 |
| 470 | 2.67209 |
| 471 | 2.67302 |
| 472 | 2.67394 |
| 473 | 2.67486 |
| 474 | 2.67577 |
| 475 | 2.67669 |
| 476 | 2.67760 |
| 477 | 2.67851 |
| 478 | 2.67942 |
| 479 | 2.68033 |
| 480 | 2.68124 |
| 481 | 2.68214 |
| 482 | 2.68304 |
| 483 | 2.68394 |
| 484 | 2.68484 |
| 485 | 2.68574 |
| 486 | 2.68663 |
| 487 | 2.68752 |
| 488 | 2.68841 |
| 489 | 2.68930 |
| 490 | 2.69019 |
| 491 | 2.69108 |
| 492 | 2.69196 |
| 493 | 2.69284 |
| 494 | 2.69372 |
| 495 | 2.69460 |
| 496 | 2.69548 |
| 497 | 2.69635 |
| 498 | 2.69722 |
| 499 | 2.69810 |
| 500 | 2.69897 |

| N. | Logar. | N. | Logar. | N. | Logar. |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 501 | 2.69983 | 534 | 2.72754 | 567 | 2.75358 |
| 502 | 2.70070 | 535 | 2.72835 | 568 | 2.75434 |
| 503 | 2.70156 | 536 | 2.72916 | 569 | 2.75511 |
| 504 | 2.70243 | 537 | 2.72997 | 570 | 2.75587 |
| 505 | 2.70329 | 538 | 2.73078 | 571 | 2.75663 |
| 506 | 2.70415 | 539 | 2.73158 | 572 | 2.75739 |
| 507 | 2.70500 | 540 | 2.73239 | 573 | 2.75815 |
| 508 | 2.70586 | 541 | 2.73319 | 574 | 2.75891 |
| 509 | 2.70671 | 542 | 2.73399 | 575 | 2.75966 |
| 510 | 2.70757 | 543 | 2.73479 | 576 | 2.76042 |
| 511 | 2.70842 | 544 | 2.73559 | 577 | 2.76117 |
| 512 | 2.70927 | 545 | 2.73639 | 578 | 2.76192 |
| 513 | 2.71011 | 546 | 2.73719 | 579 | 2.76267 |
| 514 | 2.71096 | 547 | 2.73798 | 580 | 2.76342 |
| 515 | 2.71180 | 548 | 2.73878 | 581 | 2.76417 |
| 516 | 2.71264 | 549 | 2.73957 | 582 | 2.76492 |
| 517 | 2.71349 | 550 | 2.74036 | 583 | 2.76566 |
| 518 | 2.71432 | 551 | 2.74115 | 584 | 2.76641 |
| 519 | 2.71516 | 552 | 2.74193 | 585 | 2.76715 |
| 520 | 2.71600 | 553 | 2.74272 | 586 | 2.76789 |
| 521 | 2.71683 | 554 | 2.74350 | 587 | 2.76863 |
| 522 | 2.71767 | 555 | 2.74429 | 588 | 2.76937 |
| 523 | 2.71850 | 556 | 2.74507 | 589 | 2.77011 |
| 524 | 2.71933 | 557 | 2.74585 | 590 | 2.77085 |
| 525 | 2.72015 | 558 | 2.74663 | 591 | 2.77158 |
| 526 | 2.72098 | 559 | 2.74741 | 592 | 2.77232 |
| 527 | 2.72181 | 560 | 2.74818 | 593 | 2.77305 |
| 528 | 2.72263 | 561 | 2.74896 | 594 | 2.77378 |
| 529 | 2.72345 | 562 | 2.74973 | 595 | 2.77451 |
| 530 | 2.72427 | 563 | 2.75050 | 596 | 2.77524 |
| 531 | 2.72509 | 564 | 2.75127 | 597 | 2.77597 |
| 532 | 2.72591 | 565 | 2.75204 | 598 | 2.77670 |
| 533 | 2.72672 | 566 | 2.75281 | 599 | 2.77742 |
| 534 | 2.72754 | 567 | 2.75358 | 600 | 2.77815 |

| N. | Logar. | N. | Logar. | N. | Logar. |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 601 | 2.77887 | 634 | 2.80208 | 667 | 2.82411 |
| 602 | 2.77959 | 635 | 2.80277 | 668 | 2.82477 |
| 603 | 2.78031 | 636 | 2.80345 | 669 | 2.82544 |
| 604 | 2.78103 | 637 | 2.80413 | 670 | 2.82609 |
| 605 | 2.78175 | 638 | 2.80482 | 671 | 2.82677 |
| 606 | 2.78247 | 639 | 2.80550 | 672 | 2.82733 |
| 607 | 2.78318 | 640 | 2.80618 | 673 | 2.82800 |
| 608 | 2.78390 | 641 | 2.80685 | 674 | 2.82866 |
| 609 | 2.78461 | 642 | 2.80753 | 675 | 2.82931 |
| 610 | 2.78532 | 643 | 2.80821 | 676 | 2.82997 |
| 611 | 2.78604 | 644 | 2.80888 | 677 | 2.83059 |
| 612 | 2.78675 | 645 | 2.80955 | 678 | 2.83122 |
| 613 | 2.78746 | 646 | 2.81023 | 679 | 2.83188 |
| 614 | 2.78816 | 647 | 2.81090 | 680 | 2.83250 |
| 615 | 2.78887 | 648 | 2.81157 | 681 | 2.83314 |
| 616 | 2.78958 | 649 | 2.81224 | 682 | 2.83377 |
| 617 | 2.79028 | 650 | 2.81291 | 683 | 2.83442 |
| 618 | 2.79098 | 651 | 2.81358 | 684 | 2.83505 |
| 619 | 2.79169 | 652 | 2.81424 | 685 | 2.83569 |
| 620 | 2.79239 | 653 | 2.81491 | 686 | 2.83632 |
| 621 | 2.79309 | 654 | 2.81557 | 687 | 2.83695 |
| 622 | 2.79379 | 655 | 2.81624 | 688 | 2.83758 |
| 623 | 2.79448 | 656 | 2.81690 | 689 | 2.83821 |
| 624 | 2.79518 | 657 | 2.81756 | 690 | 2.83884 |
| 625 | 2.79588 | 658 | 2.81822 | 691 | 2.83947 |
| 626 | 2.79657 | 659 | 2.81888 | 692 | 2.84010 |
| 627 | 2.79726 | 660 | 2.81954 | 693 | 2.84073 |
| 628 | 2.79795 | 661 | 2.82020 | 694 | 2.84135 |
| 629 | 2.79865 | 662 | 2.82085 | 695 | 2.84198 |
| 630 | 2.79934 | 663 | 2.82151 | 696 | 2.84260 |
| 631 | 2.80002 | 664 | 2.82216 | 697 | 2.84323 |
| 632 | 2.80071 | 665 | 2.82282 | 698 | 2.84385 |
| 633 | 2.80140 | 666 | 2.82347 | 699 | 2.84447 |
| 634 | 2.80208 | 667 | 2.82412 | 700 | 2.84509 |

| N. | Logar. |
|-----|---------|
| 701 | 2.84571 |
| 702 | 2.84633 |
| 703 | 2.84695 |
| 704 | 2.84757 |
| 705 | 2.84818 |
| 706 | 2.84880 |
| 707 | 2.84941 |
| 708 | 2.85003 |
| 709 | 2.85064 |
| 710 | 2.85125 |
| 711 | 2.85186 |
| 712 | 2.85248 |
| 713 | 2.85308 |
| 714 | 2.85369 |
| 715 | 2.85430 |
| 716 | 2.85491 |
| 717 | 2.85551 |
| 718 | 2.85612 |
| 719 | 2.85672 |
| 720 | 2.85733 |
| 721 | 2.85793 |
| 722 | 2.85853 |
| 723 | 2.85913 |
| 724 | 2.85973 |
| 725 | 2.86033 |
| 726 | 2.86093 |
| 727 | 2.86153 |
| 728 | 2.86213 |
| 729 | 2.86272 |
| 730 | 2.86332 |
| 731 | 2.86391 |
| 732 | 2.86451 |
| 733 | 2.86510 |
| 734 | 2.86569 |

| N. | Logar. |
|-----|---------|
| 734 | 2.86569 |
| 735 | 2.86628 |
| 736 | 2.86687 |
| 737 | 2.86746 |
| 738 | 2.86805 |
| 739 | 2.86864 |
| 740 | 2.86923 |
| 741 | 2.86981 |
| 742 | 2.87040 |
| 743 | 2.87098 |
| 744 | 2.87157 |
| 745 | 2.87215 |
| 746 | 2.87273 |
| 747 | 2.87332 |
| 748 | 2.87390 |
| 749 | 2.87448 |
| 750 | 2.87506 |
| 751 | 2.87563 |
| 752 | 2.87621 |
| 753 | 2.87679 |
| 754 | 2.87737 |
| 755 | 2.87794 |
| 756 | 2.87852 |
| 757 | 2.87909 |
| 758 | 2.87966 |
| 759 | 2.88024 |
| 760 | 2.88081 |
| 761 | 2.88138 |
| 762 | 2.88195 |
| 763 | 2.88252 |
| 764 | 2.88309 |
| 765 | 2.88366 |
| 766 | 2.88422 |
| 767 | 2.88479 |

| N. | Logar. |
|-----|---------|
| 767 | 2.88479 |
| 768 | 2.88536 |
| 769 | 2.88592 |
| 770 | 2.88649 |
| 771 | 2.88705 |
| 772 | 2.88761 |
| 773 | 2.88817 |
| 774 | 2.88874 |
| 775 | 2.88930 |
| 776 | 2.88986 |
| 777 | 2.89042 |
| 778 | 2.89097 |
| 779 | 2.89153 |
| 780 | 2.89209 |
| 781 | 2.89265 |
| 782 | 2.89320 |
| 783 | 2.89376 |
| 784 | 2.89431 |
| 785 | 2.89486 |
| 786 | 2.89542 |
| 787 | 2.89597 |
| 788 | 2.89652 |
| 789 | 2.89707 |
| 790 | 2.89762 |
| 791 | 2.89817 |
| 792 | 2.89872 |
| 793 | 2.89927 |
| 794 | 2.89982 |
| 795 | 2.90036 |
| 796 | 2.90091 |
| 797 | 2.90145 |
| 798 | 2.90200 |
| 799 | 2.90254 |
| 800 | 2.90309 |

N. | Logar.

| | |
|-----|---------|
| 801 | 2.90363 |
| 802 | 2.90417 |
| 803 | 2.90471 |
| 804 | 2.90525 |
| 805 | 2.90579 |
| 806 | 2.90633 |
| 807 | 2.90687 |
| 808 | 2.90741 |
| 809 | 2.90794 |
| 810 | 2.90848 |
| 811 | 2.90902 |
| 812 | 2.90955 |
| 813 | 2.91009 |
| 814 | 2.91062 |
| 815 | 2.91115 |
| 816 | 2.91169 |
| 817 | 2.91222 |
| 818 | 2.91275 |
| 819 | 2.91328 |
| 820 | 2.91381 |
| 821 | 2.91434 |
| 822 | 2.91487 |
| 823 | 2.91539 |
| 824 | 2.91592 |
| 825 | 2.91645 |
| 826 | 2.91698 |
| 827 | 2.91750 |
| 828 | 2.91803 |
| 829 | 2.91855 |
| 830 | 2.91907 |
| 831 | 2.91960 |
| 832 | 2.92012 |
| 833 | 2.92064 |
| 834 | 2.92116 |

N. | Logar.

| | |
|-----|---------|
| 834 | 2.92116 |
| 835 | 2.92168 |
| 836 | 2.92220 |
| 837 | 2.92272 |
| 838 | 2.92324 |
| 839 | 2.92376 |
| 840 | 2.92427 |
| 841 | 2.92479 |
| 842 | 2.92531 |
| 843 | 2.92582 |
| 844 | 2.92634 |
| 845 | 2.92685 |
| 846 | 2.92737 |
| 847 | 2.92788 |
| 848 | 2.92839 |
| 849 | 2.92890 |
| 850 | 2.92941 |
| 851 | 2.92992 |
| 852 | 2.93043 |
| 853 | 2.93094 |
| 854 | 2.93145 |
| 855 | 2.93196 |
| 856 | 2.93247 |
| 857 | 2.93298 |
| 858 | 2.93348 |
| 859 | 2.93399 |
| 860 | 2.93449 |
| 861 | 2.93500 |
| 862 | 2.93550 |
| 863 | 2.93601 |
| 864 | 2.93651 |
| 865 | 2.93701 |
| 866 | 2.93751 |
| 867 | 2.93801 |

N. | Logar.

| | |
|-----|---------|
| 867 | 2.93801 |
| 868 | 2.93851 |
| 869 | 2.93901 |
| 870 | 2.93951 |
| 871 | 2.94001 |
| 872 | 2.94051 |
| 873 | 2.94101 |
| 874 | 2.94151 |
| 875 | 2.94200 |
| 876 | 2.94250 |
| 877 | 2.94299 |
| 878 | 2.94349 |
| 879 | 2.94398 |
| 880 | 2.94448 |
| 881 | 2.94497 |
| 882 | 2.94546 |
| 883 | 2.94596 |
| 884 | 2.94645 |
| 885 | 2.94694 |
| 886 | 2.94743 |
| 887 | 2.94792 |
| 888 | 2.94841 |
| 889 | 2.94890 |
| 890 | 2.94939 |
| 891 | 2.94987 |
| 892 | 2.95036 |
| 893 | 2.95085 |
| 894 | 2.95133 |
| 895 | 2.95182 |
| 896 | 2.95230 |
| 897 | 2.95279 |
| 898 | 2.95327 |
| 899 | 2.95375 |
| 900 | 2.95424 |

| N. | Logar. | N. | Logar. | N. | Logar. |
|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| 901 | 2.95472 | 934 | 2.97034 | 967 | 2.98542 |
| 902 | 2.95520 | 935 | 2.97081 | 968 | 2.98587 |
| 903 | 2.95568 | 936 | 2.97127 | 969 | 2.98632 |
| 904 | 2.95616 | 937 | 2.97173 | 970 | 2.98677 |
| 905 | 2.95664 | 938 | 2.97220 | 971 | 2.98721 |
| 906 | 2.95712 | 939 | 2.97266 | 972 | 2.98766 |
| 907 | 2.95760 | 940 | 2.97312 | 973 | 2.98811 |
| 908 | 2.95808 | 941 | 2.97358 | 974 | 2.98855 |
| 909 | 2.95856 | 942 | 2.97405 | 975 | 2.98900 |
| 910 | 2.95904 | 943 | 2.97451 | 976 | 2.98944 |
| 911 | 2.95951 | 944 | 2.97497 | 977 | 2.98989 |
| 912 | 2.95999 | 945 | 2.97543 | 978 | 2.99033 |
| 913 | 2.96047 | 946 | 2.97589 | 979 | 2.99078 |
| 914 | 2.96094 | 947 | 2.97635 | 980 | 2.99122 |
| 915 | 2.96142 | 948 | 2.97680 | 981 | 2.99166 |
| 916 | 2.96189 | 949 | 2.97726 | 982 | 2.99211 |
| 917 | 2.96236 | 950 | 2.97772 | 983 | 2.99255 |
| 918 | 2.96284 | 951 | 2.97818 | 984 | 2.99299 |
| 919 | 2.96331 | 952 | 2.97863 | 985 | 2.99343 |
| 920 | 2.96378 | 953 | 2.97909 | 986 | 2.99387 |
| 921 | 2.96425 | 954 | 2.97954 | 987 | 2.99431 |
| 922 | 2.96473 | 955 | 2.98000 | 988 | 2.99475 |
| 923 | 2.96520 | 956 | 2.98045 | 989 | 2.99519 |
| 924 | 2.96567 | 957 | 2.98091 | 990 | 2.99563 |
| 925 | 2.96614 | 958 | 2.98136 | 991 | 2.99607 |
| 926 | 2.96661 | 959 | 2.98181 | 992 | 2.99651 |
| 927 | 2.96707 | 960 | 2.98227 | 993 | 2.99694 |
| 928 | 2.96754 | 961 | 2.98272 | 994 | 2.99738 |
| 929 | 2.96801 | 962 | 2.98317 | 995 | 2.99782 |
| 930 | 2.96848 | 963 | 2.98362 | 996 | 2.99825 |
| 931 | 2.96894 | 964 | 2.98407 | 997 | 2.99869 |
| 932 | 2.96941 | 965 | 2.98452 | 998 | 2.99913 |
| 933 | 2.96988 | 966 | 2.98497 | 999 | 2.99956 |
| 934 | 2.97034 | 967 | 2.98542 | 1000 | 3.00000 |

INDEX.

A.

Aeris 3. Regiones. fol. 20. Earum extensio. ibid.
& seqq.

Æquator, ejusque Usus. f. 109. & seqq.

Ætate differre possunt eadem horâ nati. f. 8. due-
curiose circa hoc quæstiones. ibid.

Almucantarath, seu Altitudinum Circuli, co-
rumque utilitas. f. 144. & seqq.

Altitudinem ☉. currentem Quadrante metiri.
f. 223. Item Logarithmicè & per Planispharium
invenire. 343. usque ad 353. 373.

Altitudinem ☉ Meridianam indagare. fol. 226.
& 227. Item Maximam & Minimam. 226.

Altitudinis Meridianæ utriusque Dimidium sta-
nuere f. 340.

Altitudinem ☉ H. 6. f. 336. & seqq. in Cir-
culo Verticali. 338. in Æquinoctio reperire.
339.

Alt. Medii Cœli detegere. f. 375.

Alt. Styli invenire. f. 427.

Altitudinem Poli indagare f. 227. & seqq. Item
300. usque ad 314. & per specialem Operationem
usque ad 326.

Amphiscii. f. 153.

Amplitudinem Ortivam Maximam. f. 281. &
currentem assignare. 282. & seqq.

Angulum Gradus Culminantis Eclipticæ inve-
nire

nire. f. 376. 380. & 389. Angulum Eclipticæ cum Circulo Verticali investigare. 283. & seq.
 Angulos Trianguli Rectilinei reperire. f. 491. 492. Item Trianguli Sphærici Rectanguli. 459. 462. 466. 467. 468. & Trianguli Sphærici Obliquanguli. 471. 475. 480. 481. 483. 484.

Annus Astronomicus incipit initio V. & quare? f. 115.

Antipodes, eorumque accidentia. f. 160.

Item Antoci. f. 159.

Ascensio Recta ☉ quæ? f. 137. quomodo invenitur, ubi etiam de Differentia Ascensionali. 273. & seq.

Ascensionem Rectam Stellæ indagare. f. 252.

Arcum Semidurnum mensurare f. 272

Axis mundi quid? fol. 85. Axi Terræ Axes omnium Corporum cælestium immobiliter congruunt. ibid

Azimuth. f. 141. 364. & seqq. & 426.

B.

Bissextilis Annus quis sit, dicto citius enuntiare. f. 217.

C.

Centrum Mundi & omnium gravium est Terra. f. 71. Exhalationum item Terrestrium, sicut Lunarium Luna, ac reliquorum Planetarum reliquus Planeta. 24.

Centrum Magnitudinis & gravitatis quid? f. 73. de eo varia notatu digna, ibid. usque ad 80.

Climata

Index.

Climata quid, & quot sint. f. [139.](#) & seq. in quo-
to Climate sit Locus, edicere. [246.](#)

Cælum est triplex. f. [27.](#) Sidereum est unicum,
ratione tamen distinctum in [7.](#) Cælos Planetarum,
& Octavum Fixarum. ibid. insuper ad explican-
dos Siderum motus, varios concipimus, si non
Orbes, saltem Circulos. [28.](#)

Coluri duo, eorūque officia. f. [130.](#)

*Cometarum origo, varietas, duratio, motus,
significatio, aliæq; proprietates insinuantur.* f.
[65.](#) & seqq.

Crepuscula. f. [109](#) [248.](#)

Crura seu Latera Trianguli Rectilinei invenire.
f. [487.](#) [490.](#) [497.](#) Item Trianguli Sphærici
Rectanguli. [457.](#) [460.](#) [462.](#) [463.](#) [464.](#)
[469.](#) & Trianguli Sphærici Obliquanguli.
[472.](#) [473.](#) [476.](#) [477.](#) [479.](#)

D.

Declinationem ☉ invenire. f. [230.](#) & [284.](#) usque
ad [298.](#) Maximam [269.](#) usque ad [300.](#) item
[382.](#)

Declinationem muri per Planisph. explorare. f.
[426.](#)

Depressionem ☉ infra Horiz. reperire. f. [353.](#)

*Diem Festum, aut Natalem quot hebdomadibus
abhinc distet, vel in quam diem hebdomadæ inci-
dat, memoriter edicere.* f. [219.](#) & seq.

Diem Longissimum scire. f. [246.](#)

*Sinum Dimidii utriusque Alt. Meridianæ explo-
rare.* f. [340.](#) & seq.

Index.

- Judaica seu Inæqualis determinare. [236](#). & seq.
- Horas Orationis veteres distinguere. f. [240](#).
- Horas in gradus convertere. f. [248](#).
- Horæ Astronomicæ. f. [232](#). unde reperiantur. [251](#).
- Horam Noctis ex stellis colligere. f. [254](#) & seqq.
- Horam Ortûs stellæ scire. f. [261](#).
- Horam Ortûs & Occasus ☉ invenire. f. [271](#).
- Horam Diei indagare. f. [355](#). usque ad [364](#). ex Distantia Arcûs à Substylari. [440](#).
- Horarum omnium à Substylari Distantiam invenire. f. [430](#). & c. item Arcus earundem mensurare pro Horizontalibus. [431](#). & pro Verticalibus. [432](#).
- Horam, quâ ☉ incipit vel desinit illuminare murum, indagare. f. [437](#).
- Horam convenientem cuicunque Verticali, & quomodocunque distanti à Linea Substylari indicare. f. [438](#). item Arcui quomodocunque distanti à Linea Meridiana. [439](#).
- Horizon, ejusq; officia. f. [104](#). & seqq.
- Horizontale ope Planisphærij describere. f. [432](#). item Verticale tam declinans, quàm non declinans. [434](#).
- Horologium Universale construere. f. [9](#). & seqq.
- Horologium in quocunq; Plano describere observatis 3. umbræ punctis. f. [441](#). usque ad [446](#).
- Hypotenusam Trianguli Rectilinei determinare. f. [489](#). [494](#). Item Trianguli Sphærici. [459](#). [461](#). [465](#). [467](#).
- P P 2 Ignis

Index.

I.

Ignis sedes principalis est in Centro Mundi. f. 13.

Infernus in Centro Terræ. f. 12. quot homines capiat. ibid.

Jovis qualitas, magnitudo, Distantia à ☉ & Terra, ejus Comites & Fasciæ, Periodus. f. 39. & seqq.

L.

Latitudo Planetarum quid & quanta? f. 116. & seqq.

Latitudo & Longitudo Astronomica est diversa à Geographica. f. 117.

Latitudinem alicujus Locī invenire. f. 454.

Logarithmorum natura. f. 184.

Longitudo stellarum quid? f. 116.

Longitudinum ac Latitudinum Circuli. f. 145.

Luna præsertim in Oppos. & Conjunct. cum ☉ multum contribuit tam ad motum Maris generalem. f. 18. quàm ad Æstum illius. 19. & seq. Alia ad eandem pertinentia per longum videbis. 52 & seqq.

Lunæ Ortum & Occasum investigare. f. 392. ex Planetisphærio. 394. Horam Ortûs ☽ post ☿ & Occasûs post ♄. 394. Ascensionem Rectam illius. 397. usque ad 403. ejusdem Declinationē. 403. usque ad 409. Latitudinem ipsius. 409. usque ad 414. Lat. maximam. 414. Dist. illius à prox. Nodo. 415. Longitudinem ejusdem. 416. usque ad 421. Distantiam illius à Meridie. 421. & ex hac Distantiam ☉ à Mer. indagare. 423.

M.

Magnetis varia mira, utilia & curiosa. f. 87. usque ad 100.

Ma

Index.

Mare in Toto Orbe est unicum. f. 15. à Regionibus tamen, quas alluit, diversa sortitur nomina, ibid. Unde dicatur Rubrum, Mortuum, Asphalticum 16. colorem mirè variat, ibid. Unde fit salsum. 17. Motûs illius generalis ab Oriente in Occidentem causa. ibid. Quid sit, & quâ fiat Æstus, seu Fluxus & Refluxus Maris. 18. & seqq.

Martis Qualitates, Magnitudo, Maculæ, Periodus & Distantia à ☉ & Terra. f. 43. & seq.

Mensuræ ac Milliaria diversa. f. 33. & seq.

Mercurii proprietates, magnitudo, distantia, & Periodus. f. 50. & seqq.

Meridianus, ejusque officia. f. 117. & seqq. usque ad 123.

Meridianæ Lineæ inventio & utilitas. f. 123. & seqq. usque ad 130. & 425. & seqq.

Meridiem, & reliquas partes Mundi invenire ex Arboribus. f. 151. & seqq.

Montes in Geocosmo se habent, sicut ossium compactura in Microcosmo. f. 14. & seq.

N.

Nonagesimum gradum reperire. f. 262 & seq. & 386. ejus à Medio Cœlo distantiam. 264. & seqq. & 385. Solis Distantiam à Nonagesimo. 267. Altitudinem Nonagesimi. 372. & 374.

P.

Paralleli ☉. f. 134. & seqq. transeuntes per initia Signorum vocantur Arcus Signorum. 138.

Paralleli Stellarum qui dicantur. f. 139.

Penduli seu Perpendiculari natura, & utilitates. f. 80. usque ad 85.

Pericæci f. 158.

Per.

Index.

Perpendicularem in Obliquangulo Rectilineo assignare. f. 495.

Planetæ sunt septem. f. 31. eorum Regimen quavis hora cognoscere. 149.

Planisphærij structura & partes. f. 161. & seqq. ejus usus & utilitas. 211. & per totum.

Polares Circuli, eorumque officia. f. 133. & seq.

Polus Arcticus & Antarcticus quid ? f. 100. de eo scitu digna. ibid. & seqq.

Positionum seu Domorum Cœlestium Circuli f. 145. & seqq.

Progressionum vis raris exemplis declaratur. f. 189. & seqq.

Quadrantis usus. f. 223. & seq. cautelæ adhibenda. 225.

S.

Saturni qualitates, magnitudo & distantia à ☉ & Terra. f. 37. & seqq. ejus Satellites quinque. 39. Periodus. ibid.

Secans. f. 181. & seqq.

Signa Zodiaci. f. 113. diem ingressus ☉ in singula Signa, & gradum Signi quovis die determinare. 214. & seqq. quis gradus incidat in Calendas computare. 218. dato gradu Signi, etiam diem Mensis elicere. 221. Gradum signi determinare. 231.

Sinus. f. 175. & seqq.

Sol, præsertim in ♈ & ♉ cum ♃ est causa motus Marini. f. 18. & seqq.

Solis Periodus, anomalía, Distantia à Terra, magnitudo, maculæ, velocitas motus illius, & mora in hæmisphærio Boreali. f. 45. & seqq. So-

Index.

- Solis Distantiam à Nonagesimo supputare. f. 267.
 ejus Distantiam in Ortum ab H. 6. 269. ab
 Æquin. prox. 278. & seqq. Horam Ortus
 ejusdem. 271
- Sphæra Mundi quid? f. 7. quid Sphæra Cœlestis?
 25. est corruptibilis. ibid. & fluida. 27. ejus Cir-
 culi, qui? 103. & seqq. per totum.
- Sphæra triplex. f. 106. eam in Planisphærio ex-
 hibere. 247.
- Stellarum Motus est duplex, nim. Motus Primus
 ab Oriente in Occidentem, qui est omnibus commu-
 nis, & Motus Secundus seu Proprius ab Occasu
 versus Ortum. f. 28. & seq. aliæ dicuntur Fixæ,
 aliæ Errantes, seu Planetæ. 30. Fixas Antiqui
 numerârunt 1022. RR.^{es} agnoscunt innumerabi-
 les. ibid. eorum Periodus. 31. Fixarum magni-
 tudo, distantia tam à ☉ quàm Terra, ac Velo-
 citas motus earundem. 58. & seqq.
- Stellæ alicujus Ascensionem Rectam indagare.
 f. 252. ejus Distantiam à Meridie præter. 253.
 ex hac Horam Noctis colligere. 254. ipsam Stel-
 lam detegere. 257. & seqq. Horam Ortus ipsius
 indicare. 261.
- Substylaris Lineæ Distantiam à Meridiana inve-
 nire. f. 428. horam per quam transit 429. distan-
 tiam omnium horarum à Substylari. 430. Ex
 Substylari in quocunque Plano invenire Lineam
 Horizontalem, Meridianam, item Inclinationem,
 Declinationem, & Altitudinē styli. 446.
- Styli Altitudinē metiri. f. 427. 435. 436. & 446.
- Systema Ptolemaicum, Copernicanum, & Tysonicum
 explicantur. fol. 61. & seqq. T.

Index.

T.

Tabulæ Sinuum & Logarithmorum usus. f. 192.
& seqq.

Tangens. f. 180. & seqq.

Terra in medio Mundi. f. 7. **rotunda.** *ibid.* in **Centro**
ejusdem Infernus. 12. **Terra diversâ rerum Pan-**
spermia, ac intra se abditis receptaculis reliquorum
Elementorum instructa. 13. **Terra unâ cum Aqua**
unum Globum Terraqueû constituit. 15. **Terram**
dimittendi modus. 32. **respectu Cæli est punctum.** 73.

Terræ motus unde. f. 72.

Trepidationis motus an detur. f. 72.

Trianguli Sphærici, Rectanguli Angulos repe-
rire. f. 458. 459. 462. 466. & seqq. **Obliquan-**
guli. 471. 475. 480. 481. 483. & 484. **Re-**
lictinei. 491. & seqq.

Rectanguli Sphærici Crura seu Latera inrenire
457 460. 462. & seqq. 469. **Obliquanguli**
Crura 472. 473. 476. 477. 479. **Rectilinei.**
Crura 487. 490. 497. **Perpendicularem.** 495.

Hypotenusâ. 459. 461. 465. 467. 489. 494.

Tropici, eorumque officia. 132. & seqq.

V.

Veneris qualitates, Phases, Periodus, Magnitudo, Di-
stantia, &c. f. 48. & seqq.

Verticales Circuli, eorumque officia. f. 141. & seqq.

Vigiliæ Noctis Antiquorum. f. 240.

Z.

Zodiacus, ejus divisio & munia. f. 112. & seqq.

Zonarum divisio & accidentia. f. 149. & seqq.

F I N I S.





